



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 26.11.2020
Αριθμ. πρωτ: 12467/324839

| | | |
|---------------|--------------------------|-------------------------------------|
| Ταχ. Δ/νση: | Λ. Συγγρού 150 | Προς: Syngenta Hellas AEBE |
| Ταχ. Κώδικας: | 176 71 - ΑΘΗΝΑ | Λεωφ. Ανθούσας |
| Πληροφορίες: | Κ. Μητσοπούλου | 15349 Ανθούσα Αττικής |
| Τηλέφωνο: | 210 92 87 165 | |
| e-mail: | kmitsopoulou@minagric.gr | e-mail: Georgia.Diakou@syngenta.com |

ΘΕΜΑ: «Διεύρυνση της με αριθμό 14630 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) AFFIRM Opti 9.5 WG (emamectin benzoate 0.95% β/β) ως προς το φάσμα δράσης (διεύρυνση σε ήσσονος σημασίας χρήσεις) και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 51 αυτού.
2. Το Νόμο 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
4. Τη με αριθμό 10088/115732/26-9-2013 απόφαση (ΦΕΚ Β'/2587) σχετικά με την «Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσονος σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσονος σημασίας».
5. Την Κατευθυντήρια Οδηγία SANCO 7525/VI/95 Rev. 10.3 (13.06.2017) σχετικά με την παρέκταση και τις απαιτήσεις για τον καθορισμό των ΑΟΚ «ανώτατα όρια καταλοίπων».
6. Το ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α' 45).
7. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
8. Την με αριθ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β' 4612/19.10.2020).
9. Τη με αριθμό πρωτ. 13430/130879/06.12.2017 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 14630 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) AFFIRM Opti 9.5 WG (emamectin benzoate 0.95% β/β), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
10. Τη με αριθ. πρωτ. 12467/324839/20.11.2020 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

A Διευρύνουμε την με αριθμό 14630 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) AFFIRM Opti 9.5 WG (emamectin benzoate 0.95% β/β), που χορηγήθηκε με την Υπ. Αριθ. 13430/130879/06.12.2017 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς το φάσμα (δράσης διεύρυνση σε ήσσονος σημασίας χρήσεις) και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Συγκεκριμένα τα σημεία 5 και 13 διαμορφώνονται ως εξής:

| 5 Φάσμα δράσης | | | | | | |
|---|---|--------------------|---------------------------|------------------------------|---|--|
| Πεδίο Εφαρμογής | Στόχος | Δόσεις σκευάσματος | | | Τρόπος και χρόνος εφαρμογής | Μεγ. αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργ. περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών (σε ημέρες) |
| | | γρ./ στρ. (max) | γρ./ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού | Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/ στρ. | | |
| Μηλοειδή: Μηλιά (MABSD), Αχλαδιά (PYUSS), Μουσμουλιά (ΕΙΟJA), Κυδωνιά (CYDOB) | Καρπόκαφα <i>Cydia pomonella</i> (CARPPO) <i>Grapholita molesta</i> (LASPMO) <i>Cydia spp.</i> (CYDISP) Φυλλοδέτες <i>Adoxophyes sp.</i> (ADXPSP) <i>Pandemis sp.</i> (PANDSP) <i>Argyrotaenia Ijungiana</i> (ARGTPU) <i>Archips sp.</i> (ARCHSP) <i>Spilonota sp.</i> (SPLOSP) Φυλλορύκτες <i>Leucoptera scitella</i> (LEUCSC) <i>Lithocolletis blancardella</i> (LITHBL) <u>Χρήσεις ήσσονος σημασίας:</u> Καφέ Βρωμούσα <i>Halymorphia halys*</i> (HALYHA) | 200 | 150 | 50-130 | Ψεκασμός Φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής. Για τη καρπόκαφα έναρξη των ψεκασμών με την εκκόλαψη των ωών ή στο μέγιστο των πτήσεων χρησιμοποιώντας τις παγίδες παρακολούθησης. Για τους φυλλοδέτες: για τις διαχειμάζουσες προνύμφες ψεκάστε με την επανέναρξη της τροφικής δραστηριότητας μετά την άνθηση και για τις θερινές γενεές ξεκινήστε τους | 3/ 7-10 |

| | | | | | | |
|-------------------|---|---------|-----|--------|---|---------|
| | Δροσόφιλα <i>Drosophila suzukii*</i> (DROSSU) | | | | ψεκασμούς στην εκκόλαψη των ωών ή στο μέγιστο των πτήσεων χρησιμοποιώντας τις παγίδες παρακολούθησης. Για τους φυλλορύκτες ξεκινήστε τους ψεκασμούς με την εμφάνιση των πρώτων στοών. Από την έναρξη της ανάπτυξης του καρπού, μετά την άνθιση, έως την ωρίμανση των καρπών για κατανάλωση (BBCH 71-89) | |
| Ροδακινιά (PRNPS) | Ανάρσια <i>Anarsia lineatella</i> (ANARLI) Καρπόκαψα <i>Grapholita molesta</i> (LASPMO), <i>Cydia sp.</i> (CYDISP) <u>Χρήσεις ήσσονος σημασίας:</u> Καφέ Βρωμούσα <i>Halymorpha halys*</i> (HALYHA) Δροσόφιλα <i>Drosophila suzukii*</i> (DROSSU) | 200-225 | 150 | 50-150 | Ψεκασμός Φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής. Έναρξη των ψεκασμών στην εκκόλαψη των ωών ή στο μέγιστο των πτήσεων χρησιμοποιώντας τις παγίδες παρακολούθησης Από την έναρξη της ανάπτυξης του καρπού, μετά την άνθιση, έως την ωρίμανση των καρπών | 3/ 7-10 |

| | | | | | για κατανάλωση (BBCH 71-89) | |
|-----------------------|--|-----|-----|--------|--|---------|
| Δαμασκηλιά (PRNDO) | Καρπόκαψα <i>Cydia funebrana</i> (LASPFU) <u>Χρήσεις ήσσονος σημασίας:</u> Καφέ Βρωμούσα <i>Halymorpha halys*</i> (HALYHA) Δροσόφιλα <i>Drosophila</i> <i>suzukii*</i> (DROSSU) | 250 | 200 | 50-125 | Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής. Έναρξη των ψεκασμών με το στην εκκόλαψη των ωών ή στο μέγιστο των πτήσεων χρησιμοποιώ- ντας τις παγίδες παρακολού- θησης Από την έναρξη της ανάπτυξης του καρπού, μετά την άνθιση, έως την ωρίμανση των καρπών για κατανάλωση (BBCH 71-89) | 3/ 7-10 |
| Καρυδιά (IUGRE) | Καρπόκαψα <i>Cydia pomonella</i> (CARPPO) <u>Χρήση ήσσονος σημασίας:</u> Δροσόφιλα <i>Drosophila</i> <i>suzukii*</i> (DROSSU) | 200 | 150 | 50-150 | Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής. Από την έναρξη της ανάπτυξης του καρπού, μετά την άνθιση, έως την ωρίμανση των καρπών για κατανάλωση (BBCH 71-89) | 3/ 7 |
| Καστανιά (CSNSA) | Καρπόκαψα <i>Cydia sp.</i> (<i>Cydia splendana</i> (LASPSL) <i>Cydia</i> <i>fagiglandana</i> (LASPGR) | 200 | 150 | 50-150 | Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής. Από την έναρξη της | 3/ 7 |

| | | | | | | |
|---|--|-----|-----|--------|--|------|
| | <p><i>Pammene fasciana</i> (PAMMFA))</p> <p><u>Χρήσεις ήσσονος σημασίας:</u> <i>Drosophila suzukii</i>* (DROSSU)</p> <p>Βαλάνινος <i>Curculio elephas</i>* (CURCEL)</p> <p>Σφήκα της καστανιάς <i>Dryocosmus kuriphilus</i>* (DRYCKU)</p> | | | | ανάπτυξης του καρπού, μετά την άνθιση, έως την ωρίμανση των καρπών για κατανάλωση (BBCH 71-89) | |
| <p>Φουντουκιά** (CYLAV)</p> <p>(καλλιέργεια ήσσονος σημασίας)</p> | <p>Καρπόκαψα <i>Cydia pomonella</i> (CARPPO)</p> <p>Δροσόφιλα <i>Drosophila suzukii</i> (DROSSU)</p> <p>Βαλάνινος <i>Curculio elephas</i> (CURCEL)</p> | 200 | 150 | 50-150 | Ψεκασμός Φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής. Από την έναρξη της ανάπτυξης του καρπού, μετά την άνθιση, έως την ωρίμανση των καρπών για κατανάλωση (BBCH 71-89) | 3/ 7 |
| <p>Αμυγδαλιά** (PRNDU)</p> <p>(καλλιέργεια ήσσονος σημασίας)</p> | <p>Καρπόκαψα <i>Cydia pomonella</i> (CARPPO)</p> <p>Δροσόφιλα <i>Drosophila suzukii</i> (DROSSU)</p> <p>Ευρύτομο <i>Eurytoma amygdali</i> (EURTAM)</p> <p>Ανθονόμος <i>Anthonomus</i></p> | 200 | 150 | 50-150 | Ψεκασμός Φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής. Από την έναρξη της ανάπτυξης του καρπού, μετά την άνθιση, έως την ωρίμανση των καρπών για κατανάλωση (BBCH 71-89) | 3/ 7 |

| | | | | | | |
|--|---|-----|-----|--------|---|------|
| | <i>amygdali</i> (ANTHAM) | | | | | |
| Φιστικιά** (PIAVE) (καλλιέργεια ήσσοнос σημασίας) | Ψύλλα της φιστικιάς <i>Agonoscena</i> <i>pistaciae</i> (AGONPI) Ευρύτομο της φιστικιάς <i>Eurytoma</i> <i>plotnikovi</i> (EURTPL) Σκώρος <i>Stathmopoda</i> <i>guerini</i> (STATGU) Καφέ Βρωμούσα <i>Halyomorpha</i> <i>halys</i> (HALYHA) Υλεζίνος <i>Chaetoptelius</i> <i>vestitus</i> (CHTTVE) | 200 | 150 | 50-150 | Ψεκασμός Φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής. Από την έναρξη της ανάπτυξης του καρπού, μετά την άνθιση, έως την ωρίμανση των καρπών για κατανάλωση (BBCH 71-89) | 3/ 7 |
| <p>Παρατηρήσεις:</p> <p>-Ανεξάρτητα από τους όγκους νερού που χρησιμοποιούνται, να τηρείτε τις δόσεις ανά στρέμμα για κάθε καλλιέργεια.</p> <p>*«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα:</p> <ul style="list-style-type: none"> • στην καφέ βρωμούσα για τις καλλιέργειες μηλιάς, αχλαδιάς, μουσμουλιάς, κυδωνιάς, δαμασκηλιάς και ροδακινιάς • στη δροσόφιλα για τις καλλιέργειες μηλιάς, αχλαδιάς, μουσμουλιάς, κυδωνιάς, ροδακινιάς, δαμασκηλιάς, καρυδιάς και καστανιάς • στο βαλάνινο και στη σφήκα της καστανιάς για την καλλιέργεια της καστανιάς <p>Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα από την εφαρμογή του σκευάσματος».</p> <p>**«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες της φουντουκιάς, της αμυγδαλιάς και της φιστικιάς από τη χρήση του σκευάσματος. Για την χρήση του σκευάσματος στις καλλιέργειες αυτές ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του».</p> <p>Η χρήση στην κερασιά, στην βερικοκιά και στην ακτινιδιά θα χορηγηθεί όταν και εάν καθοριστούν στον κανονισμό 396/2005 MRLs σύμφωνα με την παρακάτω ΟΓΠ. Ο κάτοχος της έγκρισης υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα την αρμόδια αρχή.</p> | | | | | | |
| Κερασιά (PRNAV) | Φυλλοδέτες <i>Archips sp.</i> (ARCHSP) | 200 | 150 | 50-150 | Ψεκασμός Φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής BBCH 71-89 | 3/ 7 |

| | | | | | | |
|----------------------|--|---------|-----|--------|---|------|
| Ακτινιδιά (ATIDE) | Εούλια <i>Argyrotaenia ljungiana</i> (ARGTPU) | 200 | 200 | 50-150 | Ψεκασμός Φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής BBCH 71-89 | 3/ 7 |
| Βερικοκιά (PRNAR) | Ανάρσια <i>Anarsia lineatella</i> (ANARLI) Καρπόκαψα <i>Grapholita molesta</i> (LASPMO) | 200-225 | 150 | 50-150 | Ψεκασμός Φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής. Έναρξη των ψεκασμών με το πρώτο άνοιγμα των αυγών ή στο μέγιστο των πτήσεων χρησιμοποιώντας τις παγίδες παρακολούθησης BBCH 71-89 | 3/ 7 |

Παρατηρήσεις:

1. Τελευταία επέμβαση πριν την συγκομιδή:

Κερασιά, βερικοκιά και ακτινιδιά: 7 μέρες

2. Με την έγκριση της ακτινιδιάς θα προστεθεί η ακόλουθη φράση στο Σημείο 11:

Spe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας από τα επιφανειακά ύδατα: 15 μέτρων ή 10 μέτρων σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50% ή 5 μέτρων σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 75% για την καλλιέργεια της ακτινιδιάς.

Spe3: Για να προστατέψετε τα αρθρόποδα μη στόχους να αφήσετε μία απέκαστη ζώνη προστασίας: 10 μέτρων σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50% ή 5 μέτρων σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 75% για την καλλιέργεια της ακτινιδιάς

13 Προστασία των καταναλωτών

| Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις | Φυτικά προϊόντα | Ημέρες |
|--|--|--------|
| | Μηλιά, Αχλαδιά, Μουσμουλιά, Κυδωνιά, Δαμασκηλιά, Καρυδιά, Καστανιά, Αμυγδαλιά, Φουντουκιά, Φιστικιά | 7 |
| | Ροδακινιά | 14 |

B Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό πρωτ. 13430/130879/06.12.2017 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ