



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 10.12.2020
Αριθμ. πρωτ: 13397/343518

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Κ. Μητσοπούλου

Τηλέφωνο: 210 92 87 165
e-mail: kmitsopoulou@minagric.gr

Προς: W. NEUDORFF GmbH KG, Γαλλία
(διά της υπεύθυνης επικοινωνίας,
εταιρείας Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και
ΣΙΑ Ε.Ε. – «AGRIBIZ»
Ξενίας 1, 115 27 – Αθήνα)
e-mail: a.toutoutzidakis@agribiz.gr

ΘΕΜΑ: «Διεύρυνση της με αριθμό 14685 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) ERGON-NI (paraffin oil 83% β/ο, CAS 8042-47-5) ως προς το φάσμα δράσης (διεύρυνση σε ήσσοнос σημασίας χρήσεις), τις δηλώσεις προφύλαξης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 51 αυτού.
2. Το Νόμο 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
4. Τη με αριθμό 10088/115732/26-9-2013 απόφαση (ΦΕΚ Β'/2587) σχετικά με την «Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσοнос σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσοнос σημασίας».
5. Την Κατευθυντήρια Οδηγία SANCO 7525/VI/95 Rev. 10.3 (13.06.2017) σχετικά με την παρέκταση και τις απαιτήσεις για τον καθορισμό των ΑΟΚ «ανώτατα όρια καταλοίπων».
6. Το ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α' 45).
7. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
8. Τη με αριθ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β' 4612/19.10.2020).
9. Τη με αριθ. πρωτ. 11759/157750 π.ε./06.02.2019 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 14685 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) ERGON-NI (paraffin oil 83% β/ο, CAS 8042-47-5).

10. Τις με αριθ. πρωτ. 13044/334666/30.11.2020 και 13397/343518/08.12.2020 αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

A Διευρύνουμε την με αριθμό 14685 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) ERGON-NI (paraffin oil 83% β/ο, CAS 8042-47-5), που χορηγήθηκε με την Υπ. Αριθ. 11759/157750 π.ε./06.02.2019 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως προς το φάσμα (δράσης διεύρυνση σε ήσσονος σημασίας χρήσεις), τις δηλώσεις προφύλαξης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Συγκεκριμένα τα σημεία **5**, **11** και **13** διαμορφώνονται ως εξής:

5 Φάσμα δράσης		Δόσεις σκευάσματος			Χρόνος εφαρμογής	Μέγ. αριθμός εφαρμ/ ανά καλλ. περίοδο Μεσοδιάστ. Εφαρμογών σε ημέρες
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	κ.εκ. σκευάσματος /100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα/ στρ.)	κ.εκ. σκευάσματος / στρ		
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ Λεμονιά CIDLI, Μανταρινιά (Κλημεντίνες) CIDRE, Πορτοκαλιά CISDI	Κόκκινη ψώρα (<i>Aonidiella aurantii</i>) AONDAU Παρλατόρια (<i>Parlatoria pergandei</i>) PARLPE και άλλες ψώρες	1000-1500	100-220	1000-2240	Εφαρμογές πριν την αλλαγή χρώματος των καρπών. (BBCH 00-81)	1 – 2 />60
	Αλευρώδεις (<i>Dialeurodes citri</i>) DIALCI, (<i>Aleurothrixus floccosus</i>) ALTHFL	1000-1500	50-220	500-2240	Εφαρμογή πριν την αλλαγή χρώματος των καρπών (BBCH 00-81) ή μία φθινοπωρινή.	1 – 2 />60
ΜΗΛΟΕΙΔΗ: Μηλιά MABSD, Αχλαδιά PYUCO	Ψώρα Σαν-Ζοζέ (<i>Quadraspidiotus perniciosus</i>) QUADPE και άλλες ψώρες	750-1000	80-100	600-1000	Εφαρμογή πριν την αλλαγή χρώματος των καρπών. (BBCH 00-81)	1
	Κόκκινος τετράνυχος (<i>Panonychus ulmi</i>) METTUL	750-1000	125-150	940-1500	Εφαρμογή πριν την άνθηση. (BBCH 54-56)	
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ Βερικοκιά PRNAR Κερασιά PRNAV	Ψώρα Σαν-Ζοζέ και άλλες ψώρες (<i>Quadraspidiotus perniciosus</i>) QUADPE	750-1000	80-100	600-1000	Εφαρμογή πριν την αλλαγή χρώματος των καρπών. (BBCH 00-81)	1

Ροδακινιά PRNPS Δαμασκηινιά PRNDO	Κόκκινος και κίτρινος τετράνυχος (<i>Panonychus ulmi</i>) METTUL	750-1000	125	940-1250	Εφαρμογή πριν την άνθηση. (BBCH 51-53)	
Ελιά (OLVEU)	<u>Χρήσεις Ήσσονος Σημασίας:</u> Παρλατόρια (<i>Parlatoria oleae*</i> - PARLOL) Λεκάνιο (<i>Saissetia oleae*</i> - SAISOL) Πολλίνια (<i>Pollinia pollini*</i> - POLNPO) Άσπρη ψώρα (<i>Aspidiotus nerii*</i> - ASPDNE) Μυτιλόμορφη ψώρα (<i>Lepidosaphes ulmi*</i> -LEPSUL) Ψώρες (<i>Leucaspis riccae*</i> - LEUARI) (<i>Chrysomphalus dictyospermi*</i> - CHRYDI) Ακάρεα (<i>Eriophyes vitis*</i> - ERPHVI) (<i>Tegolophus hassani*</i> -TEGLSP) (<i>Oxycenus maxwelli*</i> - OXYNMA) (<i>Eotetranychus carpini*</i> -EOTECA)	750-1000	80-150	600-1500	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής, από την πτώση των πετάλων έως τους μικρούς καρπούς (BBCH 67-79)	1
Ακτινιδιά* (ATIDE) Χρήση Ήσσονος Σημασίας	Ψώρα Σαν Ζοζέ (<i>Quadraspidiotus perniciosus</i>) QUADPE Βαμβακάδα ή Διάσπις (<i>Pseudaulacaspis pentagona</i>) PSEAPE) Μετκάλφα (<i>Metcalfa pruinosa</i>) METFPR) Βαμβακάδα (<i>Eurhyllura sp.</i>)- EUPHSP) Κίτρινος Τετράνυχος	750-1000	80-150	600-1500	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής, πριν την άνθηση και μετά τη συγκομιδή (BBCH 50-90)	1

	(<i>Tetranychus urticae</i>) TETRUR) Κόκκινος Τετράνυχος (<i>Metatetranychus ulmi</i>) METTUL)					
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :						
<ol style="list-style-type: none"> 1. Το εύρος των δόσεων και ο όγκος ψεκαστικού υγρού είναι ανάλογα με το ύψος των φυτών και την ένταση της προσβολής. 2. Στα εσπεριδοειδή η συνιστώμενη δόση θα πρέπει να συνδυαστεί με το κατάλληλο όγκο ψεκαστικού υγρού ώστε να μην υπερβαίνεται η μέγιστη δόση/στρ. 3. Κατά τη χρήση του ERGON-NI τα δένδρα πρέπει να είναι ποτισμένα. Ποτίζουμε μία εβδομάδα πριν από τον ψεκασμό. 4. Αποφύγετε τον ψεκασμό όταν τα φυτά είναι στρεσαρισμένα, σε περιόδους έντονης ξηρασίας, υπερβολικής υγρασίας και όταν υπάρχει παγετός. 5. Να μην γίνεται εφαρμογή με το σκεύασμα, την περίοδο της ανθοφορίας ή όταν η θερμοκρασία ξεπερνάει τους 32°C γιατί μπορεί να εμφανιστούν προβλήματα φυτοτοξικότητας. 6. Να μην γίνεται εφαρμογή με το σκεύασμα επί 30 ημέρες πριν ή μετά την εφαρμογή θείου ή θειασβεστίου. 7. Να μην προηγείται ή έπεται εφαρμογή σκευασμάτων με δ.ο. captan, folpet και dithianon σε διάστημα τουλάχιστον 1 εβδομάδας. <p>*«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες ελιά και ακτινιδιά από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος»</p>						

11

ΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.
P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείται αυτό το προϊόν.
P202: Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφυλάξεως.
P501: Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία

Sr1: Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. (Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα/ Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω του συστήματος αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.)

Sr3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας από τα επιφανειακά ύδατα:

10 μέτρων σε εσπεριδοειδή και σε όψιμες εφαρμογές σε μηλοειδή, πυρηνόκαρπα, **ελιά και ακτινιδιά.**

-20 μέτρων σε πρώιμες εφαρμογές σε μηλοειδή, πυρηνόκαρπα, **ελιά και ακτινιδιά.**

13

Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ Λεμονιά, Μανταρινιά (Κλημεντίνες) Πορτοκαλιά	Καθορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του σκευάσματος
ΜΗΛΟΕΙΔΗ: Μηλιά, Αχλαδιά	Καθορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του σκευάσματος
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ Βερικοκιά Κερασιά Ροδακινιά Δαμασκηνιά	Καθορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του σκευάσματος
Ελιά Ακτινιδιά	Καθορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του σκευάσματος

B

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό πρωτ. 11759/157750 π.ε./06.02.2019 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ