



## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 28.12.2020  
Αριθ. πρωτ: 11808/312592

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
TELEFAX: 210 9212090  
Πληροφορίες: Δ. Καραμάνου  
Τηλέφωνο: 210 9287228  
e-mail: [dkaramanou@minagric.gr](mailto:dkaramanou@minagric.gr)

Προς: BASF Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Β.Ε.Ε.  
Παραδείσου 2 & Κηφισίας, ,  
151 25, Μαρούσι  
e-mail: [dimitris.theodosiou@basf.com](mailto:dimitris.theodosiou@basf.com)

**ΘΕΜΑ:** «Τροποποίηση της με αριθ. 60935 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) LONSELOR 30 SC (δ.ο. fluxarγγοxαd 30 % β/ο), ως προς την επωνυμία του κατόχου, του υπεύθυνου για την διάθεση στην αγορά και των εργοστασίων συσκευασίας του σκευάσματος, τις οδηγίες χρήσης του σκευάσματος, την κατηγορία και τρόπο δράσης, το φάσμα δράσης, τις ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί, τα εικονογράμματα κινδύνου, τις δηλώσεις επικινδυνότητας, τις δηλώσεις προφύλαξης του σκευάσματος, τις πρώτες βοήθειες και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή»

## ΑΠΟΦΑΣΗ

## Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον υπ' αρ 1107/2009 (L 309/24.11.2009) Κανονισμό (ΕΚ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 45 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012 για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.
4. Το με αριθμό έγκρισης 60636 προϊόν αναφοράς, SERCADIS (με αρ. πρωτ. 7933/76610/13.07.2017) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Το ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α'45).
6. Το ν. 4622/2019 (Α'133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
7. Την με αριθ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β'4612/19-10-20).

8. Τη με αριθ. πρωτ.11808/312592/09.11.2020 αίτηση της εταιρείας BASF Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Β.Ε.Ε..

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- Ι. Τροποποιούμε τη με αριθ. **60935** άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος **(μυκητοκτόνο) LONSELOR 30 SC (δ.ο. fluxapyroxad 30 % β/ο)**, η οποία χορηγήθηκε την υπ. αριθ. πρωτ. 13831/330246π.ε./06.02.2020 Ο.Ε., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως προς την επωνυμία του κατόχου, του υπεύθυνου για την διάθεση στην αγορά και των εργοστασίων συσκευασίας του σκευάσματος, τις οδηγίες χρήσης του σκευάσματος, την κατηγορία και τρόπο δράσης, το φάσμα δράσης, τις ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί, τα εικονογράμματα κινδύνου, τις δηλώσεις επικινδυνότητας, τις δηλώσεις προφύλαξης του σκευάσματος, τις πρώτες βοήθειες και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή.

Η άδεια διάθεσης στην αγορά του σκευάσματος διαμορφώνεται ως εξής:

#### 1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

60935

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

06.02.2020

1.1.β Ημερομηνία λήξης

31.12.2023

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

1.2.α Εμπορικό όνομα:

LONSELOR 30 SC

1.2.β Μορφή:

Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)

1.3 Δραστική ουσία

Δραστική ουσία 1

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO:

Fluxapyroxad

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

98% (β/β) min

Χημική ομάδα:

Καρβοξαμικά

Παρασκευαστής:

BASF SE,  
Carl-Bosch-Strasse 38,  
67056 Ludwigshafen, Γερμανία

Εργοστάσια παρασκευής της δ.ο.:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

BASF SE,  
Carl-Bosch-Strasse 38,  
67056 Ludwigshafen, Γερμανία

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας fluxarygoxad, όπως αυτές κατατέθηκαν με το με αριθ. πρωτ. 7229/80058/28-6-2013 έγγραφο της ενδιαφερόμενης εταιρείας για το πανομοιότυπο προϊόν SERCADIS 30 SC και προσδιορίζονται στο part C της σχετικής έκθεσης αξιολόγησης της εισηγήτριας χώρας Γαλλίας, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.

#### 1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας

BASF Ελλάς **Μονοπρόσωπη** Α.Β.Ε.Ε.  
Παραδείσου 2 & Κηφισίας,  
151 25, Μαρούσι  
Τηλ.: 210 6860100  
Fax: 210 6860200  
E-mail: dimitris.theodosiou@basf.com

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Ο Κάτοχος της άδειας

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά

BASF Ελλάς **Μονοπρόσωπη** Α.Β.Ε.Ε.  
Παραδείσου 2 & Κηφισίας,  
151 25, Μαρούσι  
Τηλ.: 210 6860100  
Fax: 210 6860200  
E-mail: dimitris.theodosiou@basf.com

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

BASF SE,  
Carl-Bosch-Strasse 38,  
67056 Ludwigshafen, Γερμανία

δ) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1. BASF Espanola S.A.  
Carretera Nacional 340, km 1156, 43006 Tarragona,  
Ισπανία
2. BASF Agri-Production S.A.S.  
Zone Industrielle Lyon Nord B.P. 73  
Rue Jacquard, F-69727 Genay Cedex, Γαλλία

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

- 1) BASF Espanola S.L.  
Carretera Nacional 340, km 1156  
43006 Tarragona, Ισπανία
- 2) BASF Agri-Production S.A.S.  
Rue Jacquard  
Z.I. Lyon Nord - B.P. 73  
F-69727 Genay Cedex, Γαλλία
- 3) BASF Ελλάς **Μονοπρόσωπη** ΑΒΒΕ,  
ΒΙΠΕΘ, Σίνδος

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία: fluxarγoxad 30 % β/ο  
Βοηθητικές ουσίες: 72,9% β/β

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος, όπως αυτή κατατέθηκε με το με αριθ. πρωτ. 7229/80058/28-6-2013 έγγραφο της ενδιαφερόμενης εταιρείας για το πανομοιότυπο προϊόν SERCADIS 30 SC και προσδιορίζεται στο part C της σχετικής έκθεσης αξιολόγησης της εισηγήτριας χώρας Γαλλίας, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

## 2 Συσσκευασίες

| A/A | Είδος  | Μέγεθος              | Υλικό                                  |
|-----|--------|----------------------|--|
| 1   | Φιάλη  | 15 κ.εκ. έως 1 λίτρο | Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE) |
| 2   | Δοχείο | 3 έως 10 λίτρα       | Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE) |

## 3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

Τρόπος εφαρμογής:

1. Ψεκασμός καλύψεως της φυλλικής επιφάνειας

**2. Επένδυση πατατόσπορου, με εξαιρετικά μικρού όγκου ψεκασμό (ULV). Η επένδυση πραγματοποιείται με ειδικό εξοπλισμό, σε ραουλόδρομο (τροχιόδρομος κύλισης) με θάλαμο ψεκασμού (τύπου MAFEX).**

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίζουμε το βυτίο μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέτουμε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος υπό συνεχή ανάδευση. Συμπληρώνουμε το βυτίο με νερό και συνεχίζουμε την ανάδευση σε όλη την διάρκεια του ψεκασμού.

**Στην περίπτωση του πατατόσπορου χρησιμοποιείται αδιάλυτο ή διαλυμένο μέχρι τη δημιουργία 1 L ψεκαστικού διαλύματος για την επένδυση 1 τόνου κονδύλων.**

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Συστήνεται ο καθαρισμός του ψεκαστήρα με νερό

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Προϊόν: Καύση σε εγκεκριμένη για το σκοπό αυτό μονάδα, η οποία διαθέτει κατάλληλο κλίβανο αποτέφρωσης.

Συνιστώμενη θερμοκρασία αποτέφρωσης : 1100 °C για 2 sec.

Συσκευασίες: Οι άδειες συσκευασίες να ξεπλένονται 3 φορές και το νερό του ξεπλύματος να προστίθεται στο ψεκαστικό διάλυμα. Το πλύσιμο υπό πίεση της άδειας συσκευασίας δίνει καλύτερα αποτελέσματα. Οι συγκεκριμένες συσκευασίες να μην ξαναχρησιμοποιούνται και να απορρίπτονται σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς και την καλύτερη διαθέσιμη πρακτική.

Συνδυαστικότητα: -

**4** Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Μυκητοκτόνο για την αντιμετώπιση μυκητολογικών ασθενειών σε αμπέλι, μηλοειδή, πυρηνόκαρπα, **ακρόδρυα και πατάτα** με προστατευτική και θεραπευτική δράση και μεγάλης διάρκειας αποτελεσματικότητα. Το fluxarogoxad ανήκει στην ομάδα των καρβοξαμιδικών μυκητοκτόνων και δρα σε βιοχημικό επίπεδο ως παρεμποδιστής της αναπνευστικής αλυσίδας στο σύμπλοκο II (παρεμποδιστής του ενζυμικού συμπλόκου της αφυδρογονάσης του ηλεκτρικού οξέος - SDHI, κατάταξη FRAC C2). Παρεμποδίζει την βλάστηση των σπορίων, την επιμήκυνση του βλαστικού σωλήνα, την ανάπτυξη του μυκηλίου και τη σποριογένεση.

| <b>5</b> Φάσμα δράσης                             |  |                    |                                  |   |  |
|---|--|--------------------|----------------------------------|---|--|
| Πεδίο Εφαρμογής                                   | Στόχος   | Δόσεις σκευάσματος |                                  | Τρόπος και χρόνος εφαρμογής   | Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο |
|   |  | κ.εκ./στρέμμα      | Όγκος ψεκ. υγρού λιτρα / στρέμμα |   |  |
| Αμπέλι - VITVI (Επιτραπέζιο Οινοποιήσιμο Σταφίδα) | Ωίδιο ( <i>Erysiphe necator-UNCINE</i> )   | 15                 | 20-120                           | Εφαρμογές από το στάδιο έκπτυξης των φύλλων και έως ότου οι ράγες αποκτήσουν το τυπικό για την ποικιλία χρώμα. (BBCH 11-83) | 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10-21 ημέρες             |
| Μηλιά- MABSD, Αχλαδιά- PYUCO                      | Φουζικλάδιο ( <i>Venturia inaequalis-VENTIN, Venturia pyrina-VENTPI</i> ), Στεμφύλιο ( <i>Stemphylium sp.-STEMSP</i> ) | 25-30              | 20-120                           | Εφαρμογές από το στάδιο της πράσινης κορυφής έως την αρχή της ωρίμανσης των καρπών (BBCH 53-81)                             | 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-10 ημέρες              |
|   | Ωίδιο ( <i>Podosphaera leucotricha-PODOLE</i> )  | 15                 | 20-120                           | Εφαρμογές από το στάδιο της πράσινης κορυφής έως την αρχή της ωρίμανσης των καρπών (BBCH 53-81)                             | 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10-14 ημέρες             |
| Ροδακινιά- PRNPS, Βερικοκιά- PRNAR                | Ωίδιο ( <i>Sphaerotheca pannosa - SPHRPA</i> )   | 15                 | 50-150                           | Εφαρμογές από το φούσκωμα των ανθοφόρων οφθαλμών έως και την πλήρη ωρίμανση των καρπών. (BBCH 51-85)                        | 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10-14 ημέρες             |
| Αμυγδαλιά <sup>(1)</sup> PRNDU                    | Φαιά σήψη ( <i>Monilinia laxa-</i>   | 30                 | 100-120                          | Εφαρμογές από την άνθηση και  | 3 εφαρμογές με                                       |

|  |   |   |  |  |   |
|--|---|---|--|--|---|
| (χρήση ήσσονος σημασίας)   | MONILA,<br><i>Monilinia fructicola</i> -<br>MONIFC)           |   |  | μέχρι την ωρίμανση των καρπών.<br><b>(BBCH 60-85)</b>  | μεσοδιάστημα<br>7-14 ημέρες             |
| Φιστικιά <sup>(1)</sup><br>ΡΙΑΒΕ<br><br>(χρήση ήσσονος σημασίας) | Καμαροσπόριο<br>( <i>Botryosphaeria dothidea</i> -<br>BOTSDO) | 30  | 100-120  | Εφαρμογές από την άνθηση και μέχρι την ωρίμανση των καρπών.<br><br><b>(BBCH 60-85)</b>   | 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-14 ημέρες |
| Πατάτα<br>(κόνδυλοι για φύτευση)<br>SOLTU                        | Ριζοκτόνια<br>( <i>Rhizoctonia solani</i> -<br>RHIZSO)        | 20<br>κ.εκ./100<br>κιλά<br>πατατόσ<br>πορου | Αδιάλυτο ή έως 1 λίτρο ψεκαστικού διαλύματος/ 1000 κιλά κονδύλων | Εφαρμογή απ' ευθείας στον πατατόσπορο πριν τη φύτευση με εξαιρετικά μικρού όγκου ψεκασμό (ULV). <sup>2</sup><br><b>(BBCH 00)</b> | 1 εφαρμογή                              |

## Παρατηρήσεις:

- Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες Αμυγδαλιάς και Φιστικιάς από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις ήσσονος σημασίας, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος. Η χρήση του σκευάσματος στις καλλιέργειες αυτές γίνεται με ευθύνη του χρήστη.
- Ο ψεκασμός αυτός πραγματοποιείται πάνω σε ραουλόδρομο (τροχιόδρομος κύλισης) με θάλαμο ψεκασμού, τύπου MAFEX.

**6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Το σκεύασμα είναι άχρωμο. Κατά τη χρήση του πριν τη φύτευση, ο χρήστης πρέπει υποχρεωτικά να εξασφαλίσει ότι κανένας κόνδυλος που έχει ψεκαστεί με το σκεύασμα, δεν υπάρχει περίπτωση να βρεθεί κατά λάθος προς κατανάλωση. Οι επενδεδυμένοι κόνδυλοι, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για ζωοτροφή.

Η εφαρμογή σε πατατόσπορο να πραγματοποιείται :

- μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο.
- κατά προτίμηση λίγο πριν τη φύτευση και χωρίς να υπερβεί το στάδιο των λευκών φύτρων. Η διαδικασία του ψεκασμού που χρησιμοποιείται πρέπει να επιτρέπει καλή διανομή του προϊόντος στο σύνολο των καθαρών κονδύλων.

Διαχείριση ανθεκτικότητας:

Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική ουσία fluxapyroxad, η οποία ανήκει στην ομάδα 7 κατά FRAC

Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας συνιστάται:

- η εναλλαγή με μυκητοκτόνα που δεν ανήκουν σε αυτή την ομάδα.
- στην Φιστικιά και την Αμυγδαλιά να μην εφαρμόζεται το σκεύασμα σε περισσότερες από 2 συνεχόμενες εφαρμογές.

**7.** Χρονικό διάστημα ασφαλείας

μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας
- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν



- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

Μην εισέρχεστε στην ψεκασμένη περιοχή, πριν στεγνώσει το ψεκαστικό διάλυμα στα φύλλα της καλλιέργειας. Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν κατάλληλη ενδυμασία εργασίας (μακρύ παντελόνι, μακρυμάνικη μπλούζα και ανθεκτικά υποδήματα) και γάντια εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής αμέσως μετά τον ψεκασμό.

**8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Δεν προκαλεί φυτοτοξικότητα στις εγκεκριμένες χρήσεις και δόσεις εφαρμογής.

**9** Εικονογράμματα Κινδύνου:

GHS07



GHS09

ΠΡΟΣΟΧΗ

**10** Δηλώσεις επικινδυνότητας:

**H317: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.**

**H362: Μπορεί να βλάψει τα βρέφη που τρέφονται με μητρικό γάλα.**

H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

EUH208: Περιέχει 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one και 2-methylisothiazol-3(2H)-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

11

Δηλώσεις  
Προφύλαξης:

P102+P405: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.  
P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.  
P201: Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.  
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο  
**P260: Μην αναπνέετε σταγονίδια.**  
**P263: Αποφεύγετε την επαφή στη διάρκεια της εγκυμοσύνης και της γαλουχίας.**  
**P264: Πλυθείτε σχολαστικά μετά το χειρισμό.**  
**P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.**

**Να φοράτε γάντια, ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία και μπότες κατά την ανάμιξη/φόρτωση, την εφαρμογή και κατά το χειρισμό του επενδεδυμένου πατατόσπορου.**

SP1: Μην μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα/ Να αποφευχθεί η μόλυνση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.

12

Πρώτες βοήθειες –  
Αντίδοτο

P308 + P313 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό Αφαιρέστε άμεσα τα μολυσμένα ρούχα.

Σε περίπτωση εισπνοής: Κρατήστε τον ασθενή ήρεμο, μεταφέρετε τον στον καθαρό αέρα, ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: ξεπλύνετε καλά με νερό και σαπούνι.

**P333 + P313+P362+P364: Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.**

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα καλά για 15 λεπτά κάτω από τρεχούμενο νερό με τα βλέφαρα ανοιχτά.

Σε περίπτωση κατάποσης: ξεπλύνετε καλά το στόμα και πιείτε 200- 300 ml νερό. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο, εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-77.93.777

13

Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

| Φυτικά προϊόντα        | Ημέρες                                  |
|------------------------|---|
| Αμυγδαλιά, Φιστικιά    | 14                                      |
| Αμπέλι, Μηλιά, Αχλαδιά | 35                                      |
| Ροδακινιά, Βερικοκιά   | 21                                      |
| Πατάτα                 | Δεν ορίζεται λόγω του χρόνου εφαρμογής. |



**14** Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Το σκεύασμα διατηρείται για δύο (2) χρόνια, αν αποθηκευτεί στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο.

**15** **Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης**

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

**16** **Κατάλογος προστατευομένων μελετών**

Στο Παράρτημα ΙΙΙ της Υπ. Απόφασης με αριθ. πρωτ. 7933/76610/13.07.2017 του προϊόντος αναφοράς SERCADIS 30 SC με αριθμό άδειας 60636 καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ, στην διάθεση των ενδιαφερομένων

**17** **Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών**

--

**Β** **Γενικές υποχρεώσεις**

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει τη ΣΕΑ για οποιοδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στη ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό (ΕΕ) 547/2011 και την παρούσα απόφαση
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στη ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στη ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας»  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

**Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ**