



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 12.01.2021
Αριθ. πρωτ: 10763/285820π.ε.

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Δ. Καραμάνου
Τηλέφωνο: 210 92 87 228
e-mail: dkaramanou@minagric.gr

Προς: Nufarm GmbH & Co, KG, Αυστρίας
(δια του υπεύθυνου επικοινωνίας,
της εταιρείας
K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Μ.ΑΒΕΕ
ΒΙ.ΠΕ.Θ., ΣΙΝΔΟΣ – Τ.Κ. 57022
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
email: l.vellis@efthymiadis.gr

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο)
CREDIT XTREME 540SL (δ.ο. glyphosate 54 %β/ο)

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα τα άρθρα 33 και 37.4 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 540/2011 της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών, στον οποίο συμπεριλαμβάνεται και τη δραστική ουσία **glyphosate**.
4. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 2019/724 της Επιτροπής της 10ης Μαΐου 2019 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 686/2012 όσον αφορά τον διορισμό των κρατών μελών-εισηγητών και των κρατών μελών-συνεισηγητών για τις δραστικές ουσίες **γλυφωσάτη**, λ-κυαλοθρίνη, imazamox και rendimethalin και την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 844/2012 όσον αφορά τη δυνατότητα από κοινού ανάληψης του ρόλου του κράτους μέλους-εισηγητή από ομάδα κρατών μελών.
5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 547/2011 της επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
6. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.
8. Την από 11/2019 σχετική Έκθεση Αξιολόγησης της Αρμόδιας Αρχής Αξιολόγησης της Μάλτας και την έγκριση του σκευάσματος Credit Xtreme.
9. Το με αριθμό πρωτ ΕΜΠ2842π.ε./05.01.2021 έγγραφο του ΜΦΙ.
10. Το ν. 2690/1999(Α'45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
11. Το ν. 4622/2019 (Α'133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
12. Την με αριθ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β'4612/19-10-20).
13. Τις με αρ. πρωτ. 2633/47764/12.03.2019, 5522/149027/05.06.2020 και 10763/285820/13.10.2020 αιτήσεις της εταιρείας K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Μ.ΑΒΕΕ ως υπεύθυνη επικοινωνίας της εταιρείας Nufarm GmbH & Co, KG, Αυστρίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

A Χορηγούμε άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με τα άρθρα **33** και **37.4** του Κανονισμού 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **(ζιζανιοκτόνο) CREDIT XTREME 540SL (δ.ο. glyphosate 54 %β/ο)**, της εταιρείας Nufarm GmbH & Co, KG, Αυστρίας, με τα ακόλουθα στοιχεία:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης:

1.1.β Ημερομηνία λήξης:

70409

12.01.2021

15.12.2023

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

1.2.α Εμπορικό όνομα:

1.2.β Μορφή:

Credit Xtreme 540SL

Πυκνό διάλυμα (SL)

1.3 Δραστική ουσία

Δραστική ουσία 1

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO:

Glyphosate

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

95 % (β/β) min

Χημική ομάδα:

Ομάδα φωσφονογλυκινών

Παρασκευαστής :

1. **Nufarm GmbH & Co, KG**
St-Peter Strasse 25, 4021 Linz,
Αυστρία
2. **Bayer Agriculture BVBA**
270 Avenue de Tervueren,
B-1150, Brussels,
Βέλγιο

Εργοστάσια παρασκευής της δ.ο.:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:

1. Jiangsu Good Harvest-Weien Agro Chemical Co., Ltd.

Laogang, Qidong City Jiangsu 226221
Κίνα

2. Bayer Agriculture BVBA.,

Haven 627
Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, Βέλγιο

3. Monsanto do Brasil Ltda.

Av. Carlos Marcondes 1200,
Bairro do Limoeiro, Caixa Postal 941,
Sao Jose dos Campos 12241-900, Βραζιλία

4. Monsanto Zarate plant,

Ruta 12-Km. 83.100.
Zarate 2800, Αργεντινή

5. MONSANTO Co.

Highway 18, River Road,
Luling, LA 70070, ΗΠΑ

6. MONSANTO Co.,

Muscatine Plant 2500,
Wiggins Road, Muscatine, Iowa 5761, ΗΠΑ

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας προσδιορίζονται στην με αριθμό πρωτ. 5522/149027/05.06.2020 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας. είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

Nufarm GmbH & Co, KG

St-Peter Strasse 25, 4021 Linz, Αυστρία
Τηλ: +43 70 6918 2313
Fax: +43 70 6918 2004
E-mail: eric.gibert@nufarm.com

α) Υπεύθυνος επικοινωνίας:

K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Μ.ΑΒΕΕ

ΒΙ.ΠΕ.Θ., ΣΙΝΔΟΣ – Τ.Κ. 57022, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΑΜΕ: 36299/62/Β/96/180
Τηλ.: 2310568656, 2310568771
Fax: 2310798423
E-mail: info@efthymiadis.gr, l.vellis@efthymiadis.gr

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Μ.ΑΒΕΕ

ΒΙ.ΠΕ.Θ., ΣΙΝΔΟΣ – Τ.Κ. 57022, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΑΜΕ: 36299/62/Β/96/180
Τηλ.: 2310568656, 2310568771
Fax: 2310798423
E-mail: info@efthymiadis.gr

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

NUFARM GmbH & Co, KG
St-Peter Strasse 25, 4021 Linz, Αυστρία

δ) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

- Nufarm GmbH & Co, KG**
St-Peter Strasse 25, 4021 Linz, Αυστρία
- Nufarm UK Limited**
Wyke Lane, Wyke, Bradford, West Yorkshire, BD129EJ,
Ηνωμένο Βασίλειο

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος:

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

- Nufarm GmbH & Co, KG**
St-Peter Strasse 25, 4021 Linz, Αυστρία
- Nufarm UK Limited**
Wyke Lane, Wyke, Bradford, West Yorkshire, BD129EJ,
Ηνωμένο Βασίλειο
- K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Μ.ΑΒΕΕ**
ΒΙ.ΠΕ.Θ., ΣΙΝΔΟΣ – Τ.Κ. 57022, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία: glyphosate : 54% β/ο
(υπό μορφή άλατος ισοπροπυλαμίνης 40,08 % β/ο και άλατος Καλίου 29,77 % β/ο)
Βοηθητικές ουσίες: 56.33 % β/β

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως αυτή κατατέθηκε με την με αριθμό πρωτ 5522/149027/05.06.2020 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

2 Συσσκευασίες :			
A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλες	Από 100 κ.εκ. έως και 1 λίτρο	HDPE (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας)
2	Δοχεία	Από 1.5 λίτρα έως και 25 λίτρα	HDPE (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας)
3	Βαρέλι	200 λτ	HDPE (μπλε) (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας)
4	Δεξαμενή	1000 λτ.	HDPE (Schütz) (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας)

3 Οδηγίες χρήσης:**Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.****Τρόπος εφαρμογής:**

-Ομοιόμορφος ψεκασμός του φυλλώματος των ζιζανίων με 10-40 λίτρα νερό ανά στρέμμα και χωρίς να έλθουν σε επαφή τα σταγονίδια του ψεκαστικού διαλύματος με το φύλλωμα, τους τρυφερούς βλαστούς ή τους καρπούς των καλλιεργειών προς αποφυγήν τυχόν συσώρευσης υπολειμμάτων στους καρπούς.

Χρησιμοποιείτε μπεκ τύπου σκούπας και ψεκάστε με πίεση μικρότερη από 2 ατμόσφαιρες (30PSI).

Εφαρμογή με ειδικό σχοινοδιαβρέκτη φερόμενο στο χέρι ή προσαρμοσμένο σε τρακτέρ. Για ζιζάνια υψηλότερα από το ύψος της καλλιέργειας.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και προσθέτουμε αναδεύοντας την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό, αναδεύοντας συνεχώς. Να μη χρησιμοποιείτε ακάθαρτο ή σκληρό νερό για τη διάλυση του φαρμάκου.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:

Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και απορρυπαντικό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Οι φιάλες και τα δοχεία ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα: ---**4** Κατηγορία και τρόπος δράσης:**Ζιζανιοκτόνο.**

Διασυστηματικό, μη εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετησίων και πολυετών (αγρωστωδών, πλατύφυλλων ζιζανίων) και υδροχαρών ζιζανίων.

Απορροφάται από τα φύλλα και τους τρυφερούς βλαστούς των ζιζανίων και παρεμποδίζει το ένζυμο EPSPS αναστέλλοντας τη βιοσύνθεση αρωματικών αμινοξέων.

5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες
		κ.εκ./ στρ.	κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ.		
Όλες οι γραμμικές καλλιέργειες (1) μετά τη συγκομιδή (Αγροί την άνοιξη και το φθινόπωρο)	Ετήσια ζιζάνια (*)	100-400	--	10-40	Ψεκασμός προσπαρτικά των καλλιεργειών για την προετοιμασία του εδάφους	1 εφαρμογή
	Πολυετή ζιζάνια (**)					
	Ετήσια ζιζάνια (*)	100-200	--	10-40	Ψεκασμός των ζιζανίων που έχουν εμφανιστεί στον αγρό, Μετασπαρτικά / Προφυτρωτικά των καλλιεργειών	1 εφαρμογή
Καλαμιές των καλλιεργειών: Σιτηρά: Σιτάρι (TRZDU, TRZAX), Κριθάρι (HORVX), Σίκαλη (SECCE), Βρώμη (AVESA), Σπέλτα (TRZSP) Ελαιοκράμβη (BRSNN) Ηλιάνθος (HELAN) Αραβόσιτος (ZEAMX)	Ετήσια ζιζάνια (*) Πολυετή ζιζάνια (**)	100-400	--	10-40	Ψεκασμός καλαμιών μετά τη συγκομιδή	1 εφαρμογή

<p>Δενδρώδεις καλλιέργειες (2)</p> <p>Εσπεριδοειδή: Πορτοκαλιά (CIDSΙ) Μανταρινιά (CIDRE) Λεμονιά (CIDLI) Γκρεϊπ-φρουτ (CIDPA) Κιτριά (CIDME)</p> <p>Ακρόδρυα: Αμυδαλιά (PRNDU) Φουντουκιά (CYLAV) Καρυδιά (IUGRE) Φιστικιά (PIAVE) Καστανιά (QUEPR) Κουκουναριά (PIUPN)</p> <p>Μηλοειδή: Μηλιά (MABSD) Αχλαδιά (PYUCO) Κυδώνια (CYDOB) Μούσμουλα (MSPGE)</p> <p>Πυρηνόκαρπα: Βερυκοκιά (PRNAR) Ροδακινιά (PRNPS) Κερασιά (PRNAV) Δαμάσκηνα (PRNDO)</p> <p>Ελιές (3) (OLVEU)</p> <p>Ακτινίδιο (ATIDE)</p>	<p>Ετήσια ζιζάνια (*)</p>	<p>100-266</p>	<p>--</p>	<p>10-40</p>	<p>Ψεκασμός μεταφυτρωτικά ως προς τα ζιζάνια κάτω από τα δένδρα ή σε λωρίδες. Άνοιξη- νωρίς το καλοκαίρι.</p>	<p>2 / 28 ημέρες</p>
					<p>Ψεκασμός με ψεκαστήρα πλάτης μεταφυτρωτικά ως προς τα ζιζάνια κάτω από τα δένδρα ή σε λωρίδες. Άνοιξη- νωρίς το καλοκαίρι.</p>	<p>2 / 28 ημέρες</p>
<p>Αμπέλια (VITVI) (Επιτραπέζια και οινοποιήσιμα)</p>	<p>Ετήσια ζιζάνια (*)</p>	<p>100-266</p>	<p>--</p>	<p>10-40</p>	<p>Ψεκασμός μεταφυτρωτικά ως προς τα ζιζάνια (στις γραμμές ή μεταξύ των γραμμών)</p>	<p>2 / 28 ημέρες</p>

					Άνοιξη- νωρίς το καλοκαίρι	
Λιβάδια, γκαζόν (για καταστροφή ή ανανέωση της καλλιέργειας πριν την σπορά).	Ετήσια ζιζάνια (*) Πολυετή ζιζάνια (**)	100-400	--	10-40	Ψεκασμός Κατά την ανάπτυξη της βλάστησης των ζιζανίων και πριν από τη σπορά.	1 εφαρμογή
Ακαλλιέργητες εκτάσεις	Ετήσια ζιζάνια (*) Πολυετή ζιζάνια (**)	100-333	--	10-40	Ψεκασμός Κατά την ανάπτυξη της βλάστησης, (Άνοιξη με Φθινόπωρο)	1 εφαρμογή
Φυτόρια δενδρυλλίων (δασικών, ανθοκομικών, κωνοφόρων)	Ετήσια ζιζάνια (*) Πολυετή ζιζάνια (**)	500		20	Ψεκασμός κατά την περίοδο ανάπτυξης των ζιζανίων . Οι εφαρμογές γίνονται μεταξύ των γραμμών με χρήση προστατευτικών καλυμμάτων (καλυπτρών) (Μάιος- Σεπτέμβριος)	1 εφαρμογή
	Ετήσια ζιζάνια (*)	200	--		Ψεκασμός κατά την περίοδο που σταματά η ανάπτυξη των ζιζανίων (Σεπτέμβριος- Νοέμβριος)	
	Ετήσια ζιζάνια (*) Πολυετή ζιζάνια (**)	665		--	Ψεκασμός με ειδικό σχοινοδιαβρέκτη φερόμενο στο χέρι ή προσαρμοσμένο σε τρακτέρ. Για ζιζάνια υψηλότερα από το ύψος της καλλιέργειας-κατά την περίοδο ανάπτυξης των ζιζανίων (Μάιο- Σεπτέμβριο)	1 εφαρμογή ανά μεμονωμένο φυτό/ζιζάνιο
Κατά μήκος	Ετήσια	267		--	Κοντά την περίοδο	1 εφαρμογή

αρδευτικών και στραγγιστικών καναλιών (6)	ζιζάνια (*)				βλάστησης των ζιζανίων	
<p>Παρατηρήσεις:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Οι χρήσεις για <u>όλες τις καλλιέργειες</u> αφορούν για την προετοιμασία του εδάφους ή για χρήση μετασπαρτικά / προφυτρωτικά στις γραμμικές καλλιέργειες συμπεριλαμβάνοντας: κονδυλώδη και βολβώδη λαχανικά, λαχανικά με στέλεχος, όσπρια, ελαιούχα φυτά (βαμβάκι, ηλίανθο, ελαιοκράμβη), πατάτας, σιτηρών και τεύτλων. Το ΡΗΙ καλύπτεται από το χρόνο μεταξύ της εφαρμογής και της συγκομιδής. 2. Στις <u>δενδρώδεις καλλιέργειες και στα αμπέλια</u> ο ψεκασμός των ζιζανίων πρέπει να είναι κατευθυνόμενος αποφεύγοντας επαφή των σταγονιδίων του ψεκαστικού διαλύματος με φύλλωμα, τρυφερούς βλαστούς, παραφυάδες και μη επουλωμένες πληγές κλαδέματος. Ο ψεκασμός επιτρέπεται μόνο σε εγκατεστημένους οπωρώνες ή αμπελώνες από το τρίτο (3ο) έτος από την φύτευσή τους και μετά, ανάλογα με την ανάπτυξη των φυτών. 3. Για τις <u>επιτραπέζιες ελιές</u> επιτρέπεται η συλλογή τους μόνο από το δένδρο. 4. Δεν επιτρέπεται η εφαρμογή στις πεσμένες στο έδαφος ελιές. 5. Να μη συλλέγονται ελιές από το έδαφος προκειμένου να αποφευχθούν υπολείμματα. 6. Η εφαρμογή <u>κατά μήκος των αρδευτικών και στραγγιστικών καναλιών</u> να γίνεται όταν δεν υπάρχει νερό στα στραγγιστικά κανάλια. Απαιτείται διάστημα 7 ημερών μετά την εφαρμογή για το γέμισμα των καναλιών. 7. Για την <u>αγριάδα</u>, η εφαρμογή να γίνεται όταν έχει ύψος 15 – 30 εκατοστά 8. Για τη <u>φτέρη</u> η εφαρμογή να γίνεται μετά το ξεδίπλωμα της κορυφής 9. Να μην γίνεται ψεκασμός, αν αναμένεται βροχή σε 6 ώρες. 10. Να μην χρησιμοποιείται σε καλλιέργειες, που προορίζονται για σποροπαραγωγή. 11. Μην ψεκάζετε όταν φυσάει. 12. Να μην χρησιμοποιείται σε καλλιέργειες, που παράγουν υπόγειο βρώσιμο προϊόν πριν τη συγκομιδή τους. 13. Χρησιμοποιήστε υλικά ή γεωργικές πρακτικές για να αποφύγετε την επαφή των φρούτων με τη δραστική ουσία ή με το έδαφος που έχει υποστεί εφαρμογή με τη δραστική ουσία <p>*Καταπολεμούμενα ετήσια ζιζάνια:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>με δόση έως 266 κ.εκ./στρ.:</u> Βρώμος <i>Bromus sp.</i> (BROSS), Λεπτή Ήρα <i>Lolium rigidum</i> (LOLRI), Μουχρίτσα (<i>Echinochloa crus-galli</i>) (ECHCG), Λουβουδιά (<i>Chenopodium album</i>) (CHEAL), Σκαρολάχανο (<i>Mercurialis annua</i>) (MERAN). - <u>επιπλέον των παραπάνω, με δόση έως 333 κ.εκ./στρ. (μόνο στα πρώτα στάδια ανάπτυξης των πλατύφυλλων ζιζανίων):</u> Μολόχες (<i>Malva sp.</i>) (MALSS), Τσουκνίδες (<i>Urtica sp.</i>) (URTSS), Πολυκόμπι (<i>Polygonum sp.</i>) (POLSS), Αντράκλα (<i>Portulaca oleracea</i>) (POROL). - <u>επιπλέον των παραπάνω, με δόση έως 400 κ.εκ./στρ.:</u> Μολόχες (<i>Malva sp.</i>) (MALSS), Τσουκνίδες (<i>Urtica sp.</i>) (URTSS), Πολυκόμπι (<i>Polygonum sp.</i>) (POLSS), Αντράκλα (<i>Portulaca oleracea</i>) (POROL). - <u>επιπλέον των παραπάνω, με δόση έως 500 κ.εκ./στρ.:</u> Βελονίδα μαλακοειδής (<i>Erodium malacoides</i>) (EROMC), Δωδεκάνθι (<i>Lamium amplexicaule</i>) (LAMAM), Κοινή Πόα (<i>Poa annua</i>) (POAAN). - <u>επιπλέον των παραπάνω, με δόση έως 665 κ.εκ./στρ.:</u> Κεχροσετάρια (<i>Setaria italica</i>) (SETIT), Γεράνι (<i>Geranium rotundifolium</i>) (GERRT), Μαργαρίτα (<i>Glebionis coronarium</i>) (CHYCO), Καλεντούλα (<i>Calendula arvensis</i>) (CLDAR), Καψέλλα (<i>Capsella bursa-pastoris</i>) (CAPBP). <p>** Καταπολεμούμενα πολυετή ζιζάνια:</p> <ul style="list-style-type: none"> - με δόση <u>έως 333 κ.εκ./στρ.:</u> 						

Φτέρη (*Pteridium aquilinum*) (PTEAQ), **Ξυλώδεις θάμνοι: Βάτα** (*Rubus sp.*) (RUBSS)

- επιπλέον των παραπάνω,

με δόση **έως 665 κ.εκ./στρ.:**

Περικοκλάδα (*Convolvulus arvensis*) (CONAR), **Βέλιουρας** (*Sorghum halepense*) (SORHA), **Αγριάδα** (*Cynodon dactylon*) (CYNDA), **Οξαλίδα** (*Oxalis pes-caprae*) (OXAPC), **Ραδίκι** (*Cichorium intybus*) (CICIN), **Αγριοραδίκο** (*Taraxacum officinale*) (TAROF), *Diploaxis virgata* (DIPVG).

- 6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

Σε αρδευτικά και στραγγιστικά κανάλια πρέπει να γίνεται κατευθυνόμενος ψεκασμός των ζιζανίων στα πρανή και με τρόπο ώστε σταγονίδια του ψεκαστικού διαλύματος να μην πάνε στο νερό.

Διαχείριση ανθεκτικότητας

Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική ουσία glyphosate, η οποία ανήκει στην **ομάδα 9** κατά HRAC.

Συνιστάται η εναλλαγή με ζιζανιοκτόνα που δεν ανήκουν σε αυτή την ομάδα ή/και εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα), προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας.

- 7** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προσ-τατευόμενης καλλιέργειας

--

- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν

Σε αγρούς μετά τη συγκομιδή και πριν την κατεργασία του εδάφους για σπορά να μεσολαβεί διάστημα τουλάχιστον επτά (7) ημερών για τα ετήσια ζιζάνια και δεκατεσσάρων (14) ημερών για τα πολυετή ζιζάνια πριν την κατεργασία του εδάφους.

- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

Μην εισέρχεστε στην ψεκασμένη περιοχή πριν στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό υγρό στη φυλλική επιφάνεια.

Απαγορεύεται η είσοδος των ζώων σε αγρούς που έχει γίνει εφαρμογή με το σκεύασμα.

- 8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ετικέτα του.

- 9** Εικονογράμματα κινδύνου:



10 Δηλώσεις
επικινδυνότητας:

H411: Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης
EUH210: Δελτίο δεδομένων ασφαλείας διατίθεται κατόπιν αιτήματος.

11 Δηλώσεις
προφύλαξης:

P405+102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.
P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Φοράτε φόρμα εργασίας κατά την ανάμιξη/φόρτωση και εφαρμογή του σκευάσματος.

Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά τον ψεκάσμο, οι εργάτες θα πρέπει να φορούν μακρύ παντελόνι και μακρυμάνικο πουκάμισο.

SP1: ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ. Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.

SPe3: Για να προστατέψετε τα **φυτά μη στόχους** να αφήσετε μια:
 -αψέκαστη ζώνη προστασίας **5 μέτρων** από τη μη γεωργική γη ή **1 μέτρου** σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά **75%** για δόσεις των **665 κ.εκ./στρ.**
 -αψέκαστη ζώνη προστασίας **5 μέτρων** από τη μη γεωργική γη ή **1 μέτρου** σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά **50%** για τις δόσεις **333-533κ.εκ./στρ.**

12 Πρώτες βοήθειες –
Αντίδοτο

Γενικά: Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν τα συμπτώματα παραμένουν καλέστε γιατρό ή το Κέντρο Δηλητηριάσεων.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε ενδελεχώς με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Βγάλτε τους φακούς επαφής εφόσον είναι εύκολο. και κάτω από τα βλέφαρα. Εφόσον ο ερεθισμός των οφθαλμών παραμένει, συμβουλευτείτε γιατρό.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. Πλύνετε αμέσως με σαπούνι και άφθονο νερό, χωρίς τρίψιμο. Εφόσον ο ερεθισμός του δέρματος παραμένει, καλέστε γιατρό.

Σε περίπτωση εισπνοής: Μετακινηθείτε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Κρατήστε τον σε ηρεμία και διατηρήστε τη θερμοκρασία του σώματος. Εάν το άτομο είναι αναίσθητο, ξαπλώστε στο πλάι με το κεφάλι χαμηλότερο από το υπόλοιπο σώμα και τα γόνατα μισά στραμμένα. Εφόσον τα συμπτώματα παραμένουν, καλέστε γιατρό.

Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε το στόμα. Σε περίπτωση κατάποσης κάνετε πλύση στομάχου. Χορηγήστε ενεργό άνθρακα. Σε περίπτωση κατάποσης, αναζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε

αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793 777

13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Πεδίο Εφαρμογής	ΡΗΙ (σε ημέρες)
Δενδρώδεις καλλιέργειες: Εσπεριδοειδή, Ακρόδρυα, Μηλοειδή, Πυρηνόκαρπα, Ελιές, Ακτινίδιο, Αμπέλια	7 ημέρες
Καλαμιές των καλλιεργειών (Σιτάρι, Κριθάρι, Σίκαλη, Βρώμη, Σπέλτα, Ελαιοκράμβη, Ηλιάνθος, Αραβόσιτος)	Δεν ορίζεται (μετασυλλεκτική εφαρμογή)
Λιβάδια, γκαζόν (για καταστροφή ή ανανέωση της καλλιέργειας πριν την σπορά) Ακαλλιέργητες εκτάσεις Φυτώρια δενδρυλλίων (δασικών, ανθοκομικών, κωνοφόρων) Όλες οι γραμμικές καλλιέργειες μετά τη συγκομιδή (προσπαρτική ή μετασπαρτική/προφυτρωτική εφαρμογή) Κατά μήκος αρδευτικών και στραγγιστικών καναλιών	Δεν ορίζεται

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκεύασματος.

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 3 χρόνια τουλάχιστον όταν αποθηκεύεται στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο. Μακριά από άμεσο ηλιακό φως

15 Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

16 Κατάλογος προστατευομένων μελετών

Στο **Παράρτημα III** καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων

17 Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών

Ο κάτοχος της έγκρισης οφείλει εντός 24 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης να προσκομίσει στην ΣΕΑ τα ακόλουθα:

--

B Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει τη ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στη ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα απόφαση και θα πρέπει να προσκομιστεί εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της παρούσης.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στη ΣΕΑ τελική ετικέτα, μόνο ηλεκτρονικά, πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στη ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ