



Φ

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 13-01-2021  
Αριθ. πρωτ: 11928/315109ΠΕ

Ταχ . Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
TELEFAX: 210 9212090  
Πληροφορίες: Νίκος Παπανικολάου  
Τηλέφωνο: 210 9287230  
e-mail: [npapanikolaou@minagric.gr](mailto:npapanikolaou@minagric.gr)

Προς: ALPHA BIOPESTICIDES LIMITED  
(δια της εταιρείας  
MedPest Consultancy Office  
25ης Μαρτίου 29,  
19009 Ντράφι-Πικέρμι)  
e-mail: [kmarkakis@medpest.gr](mailto:kmarkakis@medpest.gr)

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 14577 οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) FLIPPER (fatty acids potassium salt 47,98% β/ο) ως προς τα εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος, τον τρόπο παρασκευής του ψεκαστικού υγρού και το φάσμα δράσης»

## ΑΠΟΦΑΣΗ

## Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 45 αυτού.
2. Το Νόμο 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών.
4. Το ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α' 45).
5. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α' 133) "Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης" και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
6. Την αριθ. 1881/286212/13.10.20 (Β' 4612) Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση".
7. Το άρθρο 87 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ».
8. Τη με αριθ. πρωτ. 11928/315109/10-11-2020 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ**

- Ι. Τροποποιούμε τη με αριθ. 14577 οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) FLIPPER (fatty acids potassium salt 47,98% β/ο), που χορηγήθηκε με την με αριθ. πρωτ. 7987/87425/01-09-2016 απόφασή μας, ως προς τα εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος, τον τρόπο παρασκευής του ψεκαστικού υγρού και το φάσμα δράσης.

Συγκεκριμένα, τα σημεία 1.4ε, 3 και 5 διαμορφώνονται ως εξής:

**1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα**

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος:

|  |
|--|
| <p>1. ALTHALLER ITALIA S.R.L.<br/>Strada Comunale per Campagna, 5<br/>20078-San Colombano al Lambro (MI),<br/>Ιταλία</p> <p><b>2. Bayer SAS</b><br/><b>Site industriel de Marle,</b><br/><b>Rue Antoine-Laurent de Lavoisier,</b><br/><b>Zone industriel BP2</b><br/><b>02250 Marle-sur-Serre,</b><br/><b>Γαλλία</b></p> |
|--|

**3** Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί πλήρους κάλυψης φυλλώματος εξασφαλίζοντας καλή κάλυψη και στις δυο όψεις των φύλλων.

**Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:**

Ανακινήστε καλά το προϊόν πριν από τη χρήση. Πλύνετε και καθαρίστε προσεκτικά το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος πριν από τη χρήση του σκευάσματος. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με καθαρό νερό και προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος. Πλύνετε τον περιέκτη του σκευάσματος δύο φορές με καθαρό νερό, ρίχνοντας αυτό το νερό στη δεξαμενή ψεκασμού. Γεμίστε το δοχείο ψεκασμού με καθαρό νερό, διασφαλίζοντας συνεχή ανάδευση. Το προϊόν αναμιγνύεται γρήγορα με νερό και δεν απαιτεί έντονη ανάδευση. Συνεχίστε την ανάδευση / ανάμιξη. Για να αποφύγετε τον αφρό, μην χρησιμοποιείτε ανάδευση στο πάνω μέρος της δεξαμενής. Κατά προτίμηση, μην αναμιγνύετε σε σκληρό νερό (νερό με πολλά άλατα καλίου και μαγνησίου). Εάν είναι διαθέσιμο μόνο σκληρό νερό, συνιστάται να κάνετε μια προκαταρκτική δοκιμή. Εάν σχηματιστεί ίζημα, ή όταν η σκληρότητα του νερού έχει ελεγχθεί και είναι μεγαλύτερη από 300 ppm, θα πρέπει να προσθέσετε έναν παράγοντα ρύθμισης στο νερό πριν προσθέσετε το σκεύασμα. Χρησιμοποιήστε το ψεκαστικό διάλυμα αμέσως μετά την προετοιμασία του ψεκαστικού διαλύματος.

**Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:**

Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και απορρυπαντικό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για την διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

**Συνδυαστικότητα:** Πριν την ανάμιξη με άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα συστήνεται να γίνεται δοκιμή μικρής κλίμακας. Να μη συνδυάζεται με όξινα σκευάσματα, διαφυλλικά λιπάσματα και με σκευάσματα που περιέχουν ιόντα θείου ή χηλικά, fosetyl-al, myclobutanil, cypermethrin, ιόντα μετάλλου (ψευδάργυρος, χαλκός, σίδηρος, μαγνήσιο, ασβέστιο κ.λ.π.). Αυτοί οι συνδυασμοί μπορεί να είναι μη συμβατοί και μπορεί να προκαλέσουν φυτοτοξικότητα.

| 5                                      |  | Φάσμα δράσης             |                       |                                    |  |  |
|--|--|--------------------------|-----------------------|------------------------------------|--|--|
| Πεδίο Εφαρμογής                        | Στόχος   | Δόσεις σκευάσματος       |                       |                                    | Τρόπος και χρόνος εφαρμογής <sup>2</sup> | Μέγιστος αρ. εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών |
|  |  | λίτρα/ στρέμμα (min-max) | λίτρα/ 100 ψεκ. υγρού | Όγκος ψεκ. υγρού / λίτρα / στρέμμα |  |  |
| <b>Σολανώδη (Υ+Θ)</b><br><b>Τομάτα</b> | <b>Αφίδες</b><br><i>Aphis gossypii</i><br>(APHIGO) | 0.3-1                    | 1 <sup>1</sup>        | 30-100                             | Με την εμφάνιση της                      | 5/7  |

|  |   |       |                |        |                               |     |
|--|---|-------|----------------|--------|-------------------------------|-----|
| <p>(LYPES)</p> <p><b>Μελιτζάνα</b><br/>(SOLME)</p> <p><b>Πιπεριά</b><br/>(CPSAN)</p> <p><b>Πιπεριά chilli</b><br/>(CPSFR)</p> <p><b>Πετίνο</b><br/>(SOLMU)</p> | <p><i>Aphis fabae</i><br/>(APHIFA)</p> <p><i>Macrosiphum euphorbiae</i><br/>(MACSEU)</p> <p><i>Myzus persicae</i><br/>(MYZUPE)</p> <p><i>Macrosiphum sp.</i><br/>(MACSSP)</p> <p><b>Αλευρώδεις</b><br/><i>Bemisia tabaci</i><br/>(BEMITA)</p> <p><i>Trialeurodes vaporariorum</i><br/>(TRIAVA)</p> <p><b>Ακάρεα</b><br/><i>Tetranychus urticae</i><br/>(TETRUR)</p> <p><b>Θρίπες</b><br/><i>Frankliniella occidentalis</i><br/>(FRANOC)</p>   |       |                |        | προσβολής                     |     |
| <p><b>Μπάμια (Υ+Θ)</b><br/>(ABMES)</p>   | <p><b>Αφίδες</b><br/><i>Aphis gossypii</i><br/>(APHIGO)</p> <p><i>Aphis fabae</i><br/>(APHIFA)</p> <p><i>Macrosiphum euphorbiae</i><br/>(MACSEU)</p> <p><i>Myzus persicae</i><br/>(MYZUPE)</p> <p><i>Macrosiphum sp,</i><br/>(MACSSP)</p> <p><b>Αλευρώδεις</b><br/><i>Bemisia tabaci</i><br/>(BEMITA)</p> <p><i>Trialeurodes vaporariorum</i><br/>(TRIAVA)</p> <p><b>Ακάρεα</b><br/><i>Tetranychus urticae</i> (TETRUR)</p> <p><b>Θρίπες</b><br/>Thripidae<br/>(1THRIF)</p> <p><i>Frankliniella occidentalis</i><br/>(FRANOC)</p> | 0.3-1 | 1 <sup>1</sup> | 30-100 | Με την εμφάνιση της προσβολής | 5/7 |

|  |   |       |                |        |                               |     |
|--|---|-------|----------------|--------|-------------------------------|-----|
|  | <i>Thrips tabaci</i><br>(THRITB)<br><i>Thrips sp.</i><br>(THRISP)   |       |                |        |                               |     |
| <b>Κολοκυνθοειδή (Υ+Θ)</b><br><b>Αγγούρι και αγγουράκι για τουρσί</b><br>(CUMSC, CUMSG, CUMSA)<br><b>Κολοκύθι</b><br>(CUUPG)<br><b>Πεπόνι</b><br>(CUMME)<br><b>Καρπούζι</b><br>(CITLA)<br><b>Κολοκύθα</b><br>(CUUPM, CUUPE, CUUMA) | <b>Αφίδες</b><br><i>Aphis gossypii</i><br>(APHIGO)<br><i>Aphis fabae</i><br>(APHIFA)<br><i>Macrosiphum euphorbiae</i><br>(MACSEU)<br><i>Myzus persicae</i><br>(MYZUPE)<br><i>Macrosiphum sp.</i><br>(MACSSP)<br><br><b>Αλευρώδεις</b><br><i>Bemisia tabaci</i><br>(BEMITA)<br><i>Trialeurodes vaporariorum</i><br>(TRIAVA)<br><br><b>Ακάρεα</b><br><i>Tetranychus urticae</i><br>(TETRUR)<br><br><b>Θρίπες</b><br><i>Frankliniella occidentalis</i><br>(FRANOC) | 0,3-1 | 1 <sup>1</sup> | 30-100 | Με την εμφάνιση της προσβολής | 5/7 |
| <b>Πατάτα</b><br>(SOLTU)   | <b>Αφίδες</b><br><i>Aphis gossypii</i><br>(APHIGO)<br><i>Aphis fabae</i><br>(APHIFA)<br><i>Macrosiphum euphorbiae</i><br>(MACSEU)<br><i>Myzus persicae</i><br>(MYZUPE)<br><i>Macrosiphum sp.</i><br>(MACSSP)<br><br><b>Αλευρώδεις</b><br><i>Bemisia tabaci</i><br>(BEMITA)<br><i>Trialeurodes vaporariorum</i><br>(TRIAVA)<br><br><b>Ακάρεα</b><br><i>Tetranychus urticae</i>   | 0,3-1 | 1 <sup>1</sup> | 30-100 | Με την εμφάνιση της προσβολής | 5/7 |

|  |  |       |                |        |                               |     |
|--|--|-------|----------------|--------|-------------------------------|-----|
|  | (TETRUR)<br><b>Θρίπες</b><br><i>Frankliniella occidentalis</i><br>(FRANOC)   |       |                |        |                               |     |
| <b>Γλυκοπατάτα</b><br>(ΙΡΟΒΑ) <sup>6</sup> | <b>Ακάρεα</b><br><i>Tetranychus urticae</i> (TETRUR)<br><br><b>Αφίδες</b><br><i>Aphis gossypii</i> (APHIGO)<br><i>Aphis fabae</i> (APHIFA)<br><i>Macrosiphum euphorbiae</i> (MACSEU)<br><i>Myzus persicae</i> (MYZUPE)<br><br><b>Θρίπες</b><br><i>Thrips sp.</i> (THRISP)  | 0.3-1 | 1 <sup>1</sup> | 30-100 | Με την εμφάνιση της προσβολής | 5/7 |
| <b>Φράουλα (Υ+Θ)</b><br>(FRAAN)            | <b>Αφίδες</b><br><i>Aphis gossypii</i> (APHIGO)<br><i>Aphis fabae</i> (APHIFA)<br><i>Macrosiphum euphorbiae</i> (MACSEU)<br><i>Myzus persicae</i> (MYZUPE)<br><i>Macrosiphum sp.</i> (MACSSP)<br><i>Rhodobium porosum</i> (METOPO)<br><i>Chaetosiphon fragaefolii</i> (CHTSFR)<br><i>Fimbriaphis fimbriata</i> (FIMBFI)<br><i>Macrosiphum rosae</i> (MACSRO)<br><br><b>Δροσόφιλα</b><br><i>Drosophila suzukii</i> (DROSSU)<br><br><b>Αλευρώδεις</b><br><i>Bemisia tabaci</i> | 0,3-1 | 1 <sup>1</sup> | 30-100 | Με την εμφάνιση της προσβολής | 5/7 |

|  |  |       |                |        |                               |     |
|--|--|-------|----------------|--------|-------------------------------|-----|
|  | <p>(BEMITA)<br/><i>Trialeurodes vaporariorum</i><br/>(TRIAVA)</p> <p><b>Ακάρεα</b><br/><i>Tetranychus urticae</i><br/>TETRUR</p> <p><b>Θρίπες</b><br/><i>Frankliniella occidentalis</i><br/>(FRANOC)</p>   |       |                |        |                               |     |
| <p><b>Φυλλώδη λαχανικά συμπεριλαμβανομένων των νεαρών φύλλων (Υ+Θ)</b></p> <p><b>Μαρούλι</b><br/>(LACSA)</p> <p><b>Μαρούλι σγουρό</b><br/>(LACSE)</p> <p><b>Αντίδι</b><br/>(CICEN)</p> <p><b>Ραδίκι</b><br/>(CICIN)</p> <p><b>Ραδίκι witloof</b><br/>(CICIF)</p> <p><b>Πικραλίδα</b><br/>(TAROF)</p> <p><b>Κάρδαμο</b><br/>(LEPSA, VERBE)</p> <p><b>Γαιοκάρδαμο</b><br/>(BARVE)</p> <p><b>Ρόκα</b><br/>(ERUVV, ERUVE, DIPER, NAAOF)</p> <p><b>Σινάπι</b><br/>(SINAL, BRSNI, BRSJU)</p> <p><b>Σπανάκι</b><br/>(SPQOL)</p> <p><b>Σέσκουλα</b><br/>(BEAVV)</p> <p><b>Λυκοτρίβολο</b><br/>(VLLLO)</p> <p><b>Μπαχάρι burnet</b><br/>(SANMI)</p> <p><b>Βαλεριανέλλα</b><br/>(VLLER)</p> <p><b>Ανδράκλα</b><br/>(POROS)</p> <p><b>Βαλεριάνα</b><br/>(VLLSS)</p> | <p><b>Αφίδες</b><br/><i>Aphis gossypii</i><br/>(APHIGO)</p> <p><i>Aphis fabae</i><br/>(APHIFA)</p> <p><i>Macrosiphum euphorbiae</i><br/>(MACSEU)</p> <p><i>Myzus persicae</i><br/>(MYZUPE)</p> <p><i>Macrosiphum sp.</i><br/>(MACSSP)</p> <p><i>Nasonovia ribis-nigri</i><br/>(NASORN)</p> <p><i>Acyrtosiphon sp.</i><br/>(ACYRSP)</p> <p><i>Aulacorthum sp.</i><br/>(AULASP)</p> <p><i>Uroleucon sonchi</i><br/>(DACTSN)</p> <p><i>Aphis sp.</i><br/>(APHISP)</p> <p><b>Αλευρώδεις</b><br/><i>Bemisia tabaci</i><br/>(BEMITA)</p> <p><i>Trialeurodes vaporariorum</i><br/>(TRIAVA)</p> <p><b>Ακάρεα</b><br/><i>Tetranychus urticae</i><br/>(TETRUR)</p> <p><b>Θρίπες</b><br/><i>Frankliniella occidentalis</i><br/>(FRANOC)</p> | 0,3-1 | 1 <sup>1</sup> | 30-100 | Με την εμφάνιση της προσβολής | 5/7 |

|   |   |       |                |        |                               |     |
|---|---|-------|----------------|--------|-------------------------------|-----|
| <b>Ρόκα (Θ)</b> <sup>6</sup><br>(DIPER)   | <b>Ψύλλα</b><br><i>Psylla alni</i><br>(PSYLAL)  |       |                |        |                               |     |
| <b>Αντίδι (Υ+Θ)</b> <sup>6</sup><br>(CICEN)   | <i>Euphyllura sp.</i><br>(EUPHSP)<br><i>Metcalfa pruinosa</i><br>(METFPR)   |       |                |        |                               |     |
| <b>Μαρούλι(Υ+Θ)</b> <sup>6</sup><br>(LACSA)   | <b>Κοφτοσκούληκα</b><br><i>Agrotis sp.</i><br>(AGROSP)  |       |                |        |                               |     |
| <b>Σπανάκι (Υ+Θ)</b> <sup>6</sup><br>(SPQOL)  | <b>Ψύλλα</b><br><i>Psylla alni</i><br>(PSYLAL)<br><b>Θρίπες</b><br><i>Thrips tabaci</i><br>(THRITB)<br><i>Thrips spp.</i><br>(THRISP)   |       |                |        |                               |     |
| <b>Ψυχανθή (Υ+Θ)</b><br><b>Φασόλι με λωβό</b><br>(PHSVX)<br><b>Φασόλι χωρίς λοβό</b><br>(PHSVX)<br><b>Αρακάς με λωβό</b><br>(PIBSX)<br><b>Αρακάς χωρίς λωβό</b><br>(PIBSX)<br><b>Φακή</b><br>(LENCU)<br><b>Κουκιά</b><br>(VICFX)<br><b>Όσπρια</b> <sup>6</sup> (Υ+Θ)<br><b>Φασόλι</b><br>(PHSVX)<br><b>Φακή</b><br>(LENCU)<br><b>Αρακάς</b><br>(PIBSX)<br><b>Λούπινο</b><br>(LUPAL)<br><b>Ρεβύθι</b> (CIEAR)<br><b>Λαθούρι</b><br>(LTHSA) | <b>Αφίδες</b><br><i>Aphis gossypii</i><br>(APHIGO)<br><i>Aphis fabae</i><br>(APHIFA)<br><i>Macrosiphum euphorbiae</i><br>(MACSEU)<br><i>Myzus persicae</i><br>(MYZUPE)<br><i>Macrosiphum sp.</i><br>(MACSSP)<br><i>Aulacorthum solani</i><br>(AULASO)<br><i>Uroleucon sonchi</i><br>(DACTSN)<br><i>Megoura viciae</i><br>(MEGHVI)<br><i>Aphis craccivora</i><br>(APHICR)<br><i>Acyrtosiphon pisum</i><br>(ACYRON)<br><i>Acyrtosiphon sp.</i><br>(ACYRSP)<br><br><b>Αλευρώδεις</b><br><i>Bemisia tabaci</i><br>(BEMITA)<br><i>Trialeurodes vaporariorum</i><br>(TRIAVA)<br><br><b>Ακάρεα</b><br><i>Tetranychus urticae</i> | 0,3-1 | 1 <sup>1</sup> | 30-100 | Με την εμφάνιση της προσβολής | 5/7 |



|  |  |       |                |        |                               |     |
|--|--|-------|----------------|--------|-------------------------------|-----|
|  | (TETRUR)<br><br><b>Θρίπες</b><br><i>Frankliniella occidentalis</i><br>(FRANOC)   |       |                |        |                               |     |
| <b>Ριζωματώδη και κονδυλώδη λαχανικά (Υ+Θ)<sup>6</sup></b><br><b>Καρότο</b><br>(DAUCA)<br><b>Γογγύλια</b><br>(RAPRA)<br><b>Ραπανοσέλινα</b><br>(APUGR)<br><b>Μάραθο</b><br>(FOEVD)<br><b>Παστινάκη η εδώδιμη</b><br>(PAVSA)<br>(AFEGR)<br><b>Χρένο</b><br>(ARWLA)<br><b>Κοκκινογούλια</b><br>(BEAVX)<br><b>Γογγύλια (Θ)</b><br>(BRSRR) | <b>Αφίδες</b><br><i>Aphis gossypii</i><br>(APHIGO)<br><i>Aphis fabae</i><br>(APHIFA)<br><i>Macrosiphum euphorbiae</i><br>(MACSEU)<br><i>Myzus persicae</i><br>(MYZUPE)<br><i>Macrosiphum sp</i><br>(MACSSP)<br><i>Aulacorthum solani</i><br>(AULASO)<br><i>Uroleucon sonchi</i><br>(DACTSN)<br><i>Megoura viciae</i><br>(MEGHVI)<br><i>Aphis craccivora</i><br>(APHICR)<br><i>Acyrtosiphon pisum</i><br>(ACYRON)<br><i>Acyrtosiphon sp.</i><br>(ACYRSP)<br><br><b>Αλευρώδεις</b><br><i>Bemisia tabaci</i><br>(BEMITA)<br><i>Trialeurodes vaporariorum</i><br>(TRIAVA)<br><br><b>Ακάρεα</b><br><i>Tetranychus urticae</i><br>(TETRUR)<br><br><b>Θρίπες</b><br><i>Frankliniella occidentalis</i><br>(FRANOC) | 0,3-1 | 1 <sup>1</sup> | 30-100 | Με την εμφάνιση της προσβολής | 5/7 |
| <b>Λαχανικά με στέλεχος (Υ+Θ)</b><br><br><b>Σπαράγγι</b><br>(ASPOF)<br><b>Αγκινάρες</b><br>(CYUSC)<br><b>Άγριες αγκινάρες</b>  | <b>Αφίδες</b><br><i>Aphis gossypii</i><br>(APHIGO)<br><i>Aphis fabae</i><br>(APHIFA)<br><i>Macrosiphum euphorbiae</i><br>(MACSEU)  | 0,3-1 | 1 <sup>1</sup> | 30-100 | Με την εμφάνιση της προσβολής | 5/7 |

|  |   |       |                |        |                               |     |
|--|---|-------|----------------|--------|-------------------------------|-----|
| <p>(CYUCA)<br/> <b>Ραβέντι</b><br/> (RHERH)<br/> <b>Φύτρα μπαμπού</b><br/> (BAMBA)<br/> <b>Καρδιές φοινίκων</b><br/> (1PALF)</p>   | <p><i>Myzus persicae</i><br/> (MYZUPE)<br/> <i>Macrosiphum</i><br/> <i>sp.</i> (MACSSP)<br/> <i>Aulacorthum</i><br/> <i>solani</i> (AULASO)<br/> <i>Uroleucon sonchi</i><br/> (DACTSN)<br/> <i>Megoura viciae</i><br/> (MEGHVI)<br/> <i>Aphis craccivora</i><br/> (APHICR)<br/> <i>Acyrtosiphon</i><br/> <i>pisum</i><br/> (ACYRON)<br/> <i>Acyrtosiphon sp.</i><br/> (ACYRSP)</p> <p><b>Αλευρώδεις</b><br/> <i>Bemisia tabaci</i><br/> (BEMITA)<br/> <i>Trialeurodes</i><br/> <i>vaporariorum</i><br/> (TRIAVA)</p> <p><b>Ακάρεια</b><br/> <i>Tetranychus</i><br/> <i>urticae</i> (TETRUR)</p> <p><b>Θρίπες</b><br/> <i>Frankliniella</i><br/> <i>occidentalis</i><br/> (FRANOC)</p> |       |                |        |                               |     |
| <p><b>Σπαράγγι (Υ+Θ) <sup>6</sup></b><br/> (ASPOF)</p>   | <p><b>Αφίδα</b><br/> <b>σπαραγγιού</b><br/> <i>Brachycorynella</i><br/> <i>asparagi</i> (BRAYAS)</p>  |       |                |        |                               |     |
| <p><b>Βολβώδη λαχανικά</b><br/> <b>Κρεμμύδι (Υ+Θ)</b><br/> (ALLCE)<br/> <b>Πράσο</b><br/> (ALLPO)<br/> <b>Ασκαλώνια</b><br/> (ALLAS)<br/> <b>Πράσο το</b><br/> <b>αμπελόπρασο</b><br/> (ALLAH)<br/> <b>Κρεμμυδάκια</b><br/> (ALLFI)<br/> <b>Σχοινόπρασο</b><br/> (ALLSC)<br/> <b>Σκόρδο</b><br/> (ALLSA)</p> | <p><b>Αφίδες</b><br/> <i>Aphis gossypii</i><br/> (APHIGO)<br/> <i>Aphis fabae</i><br/> (APHIFA)<br/> <i>Macrosiphum</i><br/> <i>euphorbiae</i><br/> (MACSEU)<br/> <i>Myzus persicae</i><br/> (MYZUPE)<br/> <i>Macrosiphum</i><br/> <i>sp.</i><br/> (MACSSP)<br/> <i>Aulacorthum</i><br/> <i>solani</i><br/> (AULASO)<br/> <i>Uroleucon sonchi</i><br/> (DACTSN)<br/> <i>Megoura viciae</i></p>  | 0,3-1 | 1 <sup>1</sup> | 30-100 | Με την εμφάνιση της προσβολής | 5/7 |

|  |  |       |                |        |                               |     |
|--|--|-------|----------------|--------|-------------------------------|-----|
|  | <p>(MEGHVI)<br/><i>Aphis craccivora</i><br/>(APHICR)<br/><i>Acyrtosiphon pisum</i><br/>(ACYRON)<br/><i>Acyrtosiphon sp.</i><br/>(ACYRSP)</p> <p><b>Αλευρώδεις</b><br/><i>Bemisia tabaci</i><br/>(BEMITA)<br/><i>Trialeurodes vaporariorum</i><br/>(TRIAVA)</p> <p><b>Ακάρεα</b><br/><i>Tetranychus urticae</i> (TETRUR)</p> <p><b>Θρίπες</b><br/><i>Frankliniella occidentalis</i><br/>(FRANOC)</p>                                |       |                |        |                               |     |
| <b>Κρεμμύδι (Υ+Θ) <sup>6</sup></b><br>(ALLCE)  | <i>Aceria tulipae</i><br>(ACEITU)  |       |                |        |                               |     |
| <b>Κρεμμυδάκια (Υ+Θ) <sup>6</sup></b><br>(ALLFI)   | <i>Dyspessa ulula</i><br>(DYSPUL)  |       |                |        |                               |     |
| <b>Πράσσο (Υ+Θ) <sup>6</sup></b><br>(ALLPO)  | <b>Ψύλλα</b><br><i>Psylla alni</i><br>(PSYLAL)   | 0,3-1 | 1 <sup>1</sup> | 30-100 | Με την εμφάνιση της προσβολής |     |
| <b>Κράμβες / Ρίζες - βλαστοί κράμβης και ραπανάκια (Υ+Θ)</b><br><br><b>Λαχανάκια Βρυξελλών</b><br>(BRSEF)<br><b>Λάχανο</b><br>(BRSEU)<br><b>Κινέζικο λάχανο</b><br>(BRSEH)<br><b>Λάχανο σαβόι</b><br>(BRSES),<br><b>Κουνουπίδι</b><br>(BRSEB)<br><b>Μπρόκολο</b><br>(BRSEK)<br><b>Κινέζικο μπρόκολο</b><br>(BRSEG)<br><b>Μη κεφαλωτή κράμβη</b><br>(BRSEI)<br><b>Γογγυλοκράμβες</b><br>(BRSEJ)<br><b>Γουλιά</b><br>(BRSEK) | <p><b>Αφίδες</b><br/><i>Aphis gossypii</i><br/>(APHIGO)<br/><i>Aphis fabae</i><br/>(APHIFA)<br/><i>Macrosiphum euphorbiae</i><br/>(MACSEU)<br/><i>Myzus persicae</i><br/>(MYZUPE)<br/><i>Macrosiphum sp.</i> (MACSSP)<br/><i>Brevicoryne brassicae</i><br/>(BRVCBR)<br/><i>Lipaphis erysimi</i><br/>(LIPAER)</p> <p><b>Αλευρώδεις</b><br/><i>Bemisia tabaci</i><br/>(BEMITA)<br/><i>Trialeurodes vaporariorum</i><br/>(TRIAVA)</p> | 0,3-1 | 1 <sup>1</sup> | 30-100 | Με την εμφάνιση της προσβολής | 5/7 |

|   |   |       |                |        |                               |     |
|---|---|-------|----------------|--------|-------------------------------|-----|
| <b>Σγουρό λάχανο</b><br>(BRSOA)<br><b>Λάχανο Peking</b><br>(BRSPK)<br><b>Ραπανάκι</b><br>(RAPSS)<br><b>Μικρά ραπάνια</b><br>(RAPSR)<br><b>Ραπάνια κήπου</b><br>(RAPSN)  | <b>Ακάρεα</b><br><i>Tetranychus urticae</i><br>(TETRUR)<br><br><b>Θρίπες</b><br><i>Frankliniella occidentalis</i><br>(FRANOC)   |       |                |        |                               |     |
| <b>Ραπανάκι</b><br>(RAPSR)  | <b>Ψύλλα</b> <sup>6</sup><br><i>Psylla sp.</i><br>(PSYLSP)  |       |                |        |                               |     |
| <b>Αρωματικά φυτά<sup>6</sup></b><br><b>(Υ+Θ)</b><br><br><b>Φραγκομαϊντανός</b><br>(ANRCE)<br><b>Σέλινο</b><br>(APUGV)<br><b>Μαϊντανός</b><br>(PARCR)<br><b>Φασκόμηλο</b><br>(SALOF)<br><b>Δενδρολίβανο</b><br>(RMSOF)<br><b>Θρούμπι</b><br>(STIHO)<br><b>Θυμάρι</b><br>(THYVU)<br><b>Βασιλικός</b><br>(BZISS)<br><b>Δάφνη</b><br>(LURNO)<br><b>Δρακόντιο / Εστραγκόν</b><br>(ARTDR)<br><b>Ρίγανη</b><br>(ORIVU)<br><b>Γλυκιά μαντζουράνα</b><br>(MAJHO)<br><b>Μέντα</b><br>(MENAR)<br><b>Γλυκάνισο</b><br>(PIMAN)<br><b>Μαυροκούκι / Μαύρο κύμινο</b><br>(NIGSA)<br><b>Σπόροι σέλινου</b><br>(APUGV)<br><b>Σπόροι κόριανδρου</b><br>(CORSA)<br><b>Σπόροι κύμινου</b><br>(CVUCY)<br><b>Σπόροι άνηθου</b><br>(AFEGR) | <b>Αφίδες</b><br><i>Aphis gossypii</i><br>(APHIGO)<br><i>Aphis fabae</i><br>(APHIFA)<br><i>Macrosiphum euphorbiae</i><br>(MACSEU)<br><i>Myzus persicae</i><br>(MYZUPE)<br><i>Macrosiphum sp.</i><br>(MACSSP)<br><i>Aulacorthum solani</i><br>(AULASO)<br><i>Uroleucon sonchi</i><br>(DACTSN)<br><i>Megoura viciae</i><br>(MEGHVI)<br><i>Aphis craccivora</i><br>(APHICR)<br><i>Acyrtosiphon pisum</i><br>(ACYRON)<br><i>Acyrtosiphon sp.</i><br>(ACYRSP)<br><br><b>Αλευρώδεις</b><br><i>Bemisia tabaci</i><br>(BEMITA)<br><i>Trialeurodes vaporariorum</i><br>(TRIAVA)<br><br><b>Ακάρεα</b><br><i>Tetranychus urticae</i><br>(TETRUR)<br><br><b>Θρίπες</b><br><i>Frankliniella occidentalis</i><br>(FRANOC) | 0,3-1 | 1 <sup>1</sup> | 30-100 | Με την εμφάνιση της προσβολής | 5/7 |

|  |  |       |                |        |                               |     |
|--|--|-------|----------------|--------|-------------------------------|-----|
| <b>Σπόροι μάραθου</b><br>(FOEVU)<br><b>Σπόροι μοσχοσίταρου</b><br>(TRKFG)<br><b>Μοσχοκάρυδο</b><br>(MYIFR)<br><b>Γλυκάνισο</b><br>(PIMAN)<br><b>Μαύρο πιπέρι</b><br>(PIPNI)<br><b>Μαύρο αγριοκύμινο</b><br>(NIGSA)<br><b>Σπόροι κύμινου</b><br>(CVUCY)<br><b>Κάρδαμο</b><br>(ETACA)<br><b>Καρποί αρκεύθου</b><br>(IUPCO)<br><b>Βανίλια</b><br>(VANSS)<br><b>Ταμάρανθος η</b><br><b>οξυφοίνιξ</b><br>(TAMIN)<br><b>Κανέλλα</b><br>(CINZE)<br><b>Γλυκόριζα</b><br>(GYCGL)<br><b>Πιπερόριζα</b><br>(ZINOF)<br><b>Κουρκουμάς</b><br>(CURLO)<br><b>Γαρύφαλλο</b><br>(SYZAR),<br><b>Κάπαρη</b><br>(CPPSP)<br><b>Μοσχοκάρυδο</b><br>(MYIFR) |  |       |                |        |                               |     |
| <b>Βαμβάκι</b><br>(GOSAR)  | <b>Αφίδες</b><br><i>Aphis gossypii</i><br>(APHIGO)<br><i>Myzus persicae</i><br>(MYZUPE)<br><i>Aphis fabae</i><br>(APHIFA)<br><i>Macrosiphum euphorbiae</i><br>(MACSEU)<br><i>Macrosiphum sp.</i><br>(MACSSP)<br><br><b>Αλευρώδεις</b><br><i>Bemisia tabaci</i><br>(BEMITA)<br><i>Trialeurodes vaporariorum</i><br>(TRIAVA) | 0,3-1 | 1 <sup>1</sup> | 30-100 | Με την εμφάνιση της προσβολής | 5/7 |

|                          |   |       |                |        |                               |     |
|--------------------------|---|-------|----------------|--------|-------------------------------|-----|
|                          | <b>Θρίπες</b><br><i>Frankliniella occidentalis</i><br>(FRANOC)<br><br><b>Ακάρεα</b><br><i>Tetranychus urticae</i><br>(TETRUR)   |       |                |        |                               |     |
| <b>Σόγια</b><br>(GLXMA)  | <b>Αφίδες</b><br><i>Aphis gossypii</i><br>(APHIGO)<br><i>Myzus persicae</i><br>(MYZUPE)<br><i>Aphis fabae</i><br>(APHIFA)<br><i>Macrosiphum euphorbiae</i><br>(MACSEU)<br><i>Macrosiphum sp.</i><br>(MACSSP)<br><br><b>Αλευρώδεις</b><br><i>Bemisia tabaci</i><br>(BEMITA)<br><i>Trialeurodes vaporariorum</i><br>(TRIAVA)<br><br><b>Θρίπες</b><br><i>Frankliniella occidentalis</i><br>FRANOC<br><br><b>Ακάρεα</b><br><i>Tetranychus urticae</i><br>TETRUR | 0,3-1 | 1 <sup>1</sup> | 30-100 | Με την εμφάνιση της προσβολής | 5/7 |
| <b>Καπνός</b><br>(ΝΙΟΤΑ) | <b>Αφίδες</b><br><i>Aphis gossypii</i><br>(APHIGO)<br><i>Myzus persicae</i><br>(MYZUPE)<br><i>Aphis fabae</i><br>(APHIFA)<br><i>Macrosiphum euphorbiae</i><br>(MACSEU)<br><i>Macrosiphum sp.</i><br>(MACSSP)<br><i>Myzus nicotianae</i><br>(MYZUNI)<br><br><b>Αλευρώδεις</b><br><i>Bemisia tabaci</i><br>(BEMITA)<br><i>Trialeurodes</i>  | 0,3-1 | 1 <sup>1</sup> | 30-100 | Με την εμφάνιση της προσβολής | 5/7 |

|                                |   |       |                |        |                               |     |
|--------------------------------|---|-------|----------------|--------|-------------------------------|-----|
|                                | <i>varorariorum</i><br>(TRIAVA)<br><br><b>Θρίπες</b><br><i>Frankliniella occidentalis</i><br>(FRANOC)<br><i>Thrips tabaci</i><br>(THRITB) <sup>6</sup><br><br><b>Ακάρεα</b><br><i>Tetranychus urticae</i><br>(TETRUR)   |       |                |        |                               |     |
| <b>Ελαιοκράμβη</b><br>(BRSNN)  | <b>Αφίδες</b><br><i>Aphis gossypii</i><br>(APHIGO)<br><i>Myzus persicae</i><br>(MYZUPE)<br><i>Aphis fabae</i><br>(APHIFA)<br><i>Macrosiphum euphorbiae</i><br>(MACSEU)<br><i>Macrosiphum sp.</i><br>(MACSSP)<br><br><b>Αλευρώδεις</b><br><i>Bemisia tabaci</i><br>(BEMITA)<br><i>Trialeurodes vaporariorum</i><br>(TRIAVA)<br><br><b>Θρίπες</b><br><i>Frankliniella occidentalis</i><br>(FRANOC)<br><br><b>Ακάρεα</b><br><i>Tetranychus urticae</i><br>(TETRUR) | 0,3-1 | 1 <sup>1</sup> | 30-100 | Με την εμφάνιση της προσβολής | 5/7 |
| <b>Ζαχαρότευτλα</b><br>(BEAVA) | <b>Αφίδες</b><br><i>Aphis gossypii</i><br>(APHIGO)<br><i>Myzus persicae</i><br>(MYZUPE)<br><i>Aphis fabae</i><br>(APHIFA)<br><i>Macrosiphum euphorbiae</i><br>(MACSEU)<br><i>Macrosiphum sp.</i><br>(MACSSP)<br><br><b>Αλευρώδεις</b>   | 0,3-1 | 1 <sup>1</sup> | 30-100 | Με την εμφάνιση της προσβολής | 5/7 |

|   |   |       |                |        |                               |     |
|---|---|-------|----------------|--------|-------------------------------|-----|
|   | <p><i>Bemisia tabaci</i><br/>(BEMITA)<br/><i>Trialeurodes vaporariorum</i><br/>(TRIAVA)</p> <p><b>Θρίπες</b><br/><i>Frankliniella occidentalis</i><br/>(FRANOC)<br/><i>Thrips tabaci</i><br/>(THRITB)<sup>6</sup><br/><i>Thrips sp.</i><br/>(THRISP)<sup>6</sup></p> <p><b>Ακάρεα</b><br/><i>Tetranychus urticae</i><br/>(TETRUR)</p>   |       |                |        |                               |     |
| <p><b>Ρύζι<sup>3</sup></b><br/><i>Oryza sativa</i><br/>(ORYSA)</p>      | <p><b>Αφίδες</b><br/><i>Aphis gossypii</i><br/>(APHIGO)<br/><i>Myzus persicae</i><br/>(MYZUPE)<br/><i>Aphis fabae</i><br/>(APHIFA)<br/><i>Macrosiphum euphorbiae</i><br/>(MACSEU)<br/><i>Macrosiphum sp.</i><br/>(MACSSP)<br/><i>Rhopalosiphum padi</i><br/>(RHOPPA)</p> <p><b>Αλευρώδεις</b><br/><i>Bemisia tabaci</i><br/>(BEMITA)<br/><i>Trialeurodes vaporariorum</i><br/>(TRIAVA)</p> <p><b>Θρίπες</b><br/><i>Frankliniella occidentalis</i><br/>(FRANOC)</p> <p><b>Ακάρεα</b><br/><i>Tetranychus urticae</i><br/>(TETRUR)</p> | 0,3-1 | 1 <sup>1</sup> | 30-100 | Με την εμφάνιση της προσβολής | 5/7 |
| <p><b>Σιτηρά</b><br/><br/><b>Βρώμη</b><br/>(AVESA)<br/><b>Σόργο</b></p> | <p><b>Αφίδες</b><br/><i>Aphis gossypii</i><br/>(APHIGO)<br/><i>Myzus persicae</i><br/>(MYZUPE)</p>  | 0,3-1 | 1 <sup>1</sup> | 30-100 | Με την εμφάνιση της προσβολής | 5/7 |



|  |  |       |                |        |                               |     |
|--|--|-------|----------------|--------|-------------------------------|-----|
| <p>(SORVU)<br/> <b>Σίκαλη</b><br/> (SECCE)<br/> <b>Σιτάρι</b><br/> (1TRZG, TRZAX)<br/> <b>Κριθάρι</b><br/> (HORVX)</p> | <p><i>Aphis fabae</i><br/> (APHIFA)<br/> <i>Macrosiphum euphorbiae</i><br/> (MACSEU)<br/> <i>Macrosiphum sp.</i><br/> (MACSSP)</p> <p><b>Αλευρώδεις</b><br/> <i>Bemisia tabaci</i><br/> (BEMITA)<br/> <i>Trialeurodes vaporariorum</i><br/> (TRIAVA)</p> <p><b>Θρίπες</b><br/> <i>Frankliniella occidentalis</i><br/> (FRANOC)</p> <p><b>Ακάρεα</b><br/> <i>Tetranychus urticae</i><br/> (TETRUR)</p>  |       |                |        |                               |     |
| <p><b>Ηλίανθος</b><br/> (HELAN)</p>  | <p><b>Αφίδες</b><br/> <i>Aphis gossypii</i><br/> (APHIGO)<br/> <i>Myzus persicae</i><br/> (MYZUPE)<br/> <i>Aphis fabae</i><br/> (APHIFA)<br/> <i>Macrosiphum euphorbiae</i><br/> (MACSEU)<br/> <i>Macrosiphum sp.</i><br/> (MACSSP)</p> <p><b>Αλευρώδεις</b><br/> <i>Bemisia tabaci</i><br/> (BEMITA)<br/> <i>Trialeurodes vaporariorum</i><br/> (TRIAVA)</p> <p><b>Θρίπες</b><br/> <i>Frankliniella occidentalis</i><br/> (FRANOC)</p> <p><b>Ακάρεα</b><br/> <i>Tetranychus urticae</i><br/> (TETRUR)</p> | 0,3-1 | 1 <sup>1</sup> | 30-100 | Με την εμφάνιση της προσβολής | 5/7 |
| <p><b>Καλαμπόκι</b><br/> (ZEAMX)</p>   | <p><b>Αφίδες</b><br/> <i>Aphis gossypii</i><br/> (APHIGO)</p>  | 0,3-1 | 1 <sup>1</sup> | 30-100 | Με την εμφάνιση της           | 5/7 |

|                          |  |       |                |        |                               |     |
|--------------------------|--|-------|----------------|--------|-------------------------------|-----|
|                          | <p><i>Myzus persicae</i><br/>(MYZUPE)<br/><i>Aphis fabae</i><br/>(APHIFA)<br/><i>Macrosiphum euphorbiae</i><br/>(MACSEU)<br/><i>Macrosiphum sp.</i><br/>(MACSSP)</p> <p><b>Αλευρώδεις</b><br/><i>Bemisia tabaci</i><br/>(BEMITA)<br/><i>Trialeurodes vaporariorum</i><br/>(TRIAVA)</p> <p><b>Θρίπες</b><br/><i>Frankliniella occidentalis</i><br/>(FRANOC)</p> <p><b>Ακάρεα</b><br/><i>Tetranychus urticae</i><br/>(TETRUR)</p>  |       |                |        | προσβολής                     |     |
| <b>Μηδική</b><br>(MEDSA) | <p><b>Αφίδες</b><br/><i>Aphis gossypii</i><br/>(APHIGO)<br/><i>Myzus persicae</i><br/>(MYZUPE)<br/><i>Aphis fabae</i><br/>(APHIFA)<br/><i>Macrosiphum euphorbiae</i><br/>(MACSEU)<br/><i>Macrosiphum sp.</i><br/>(MACSSP)</p> <p><b>Αλευρώδεις</b><br/><i>Bemisia tabaci</i><br/>(BEMITA)<br/><i>Trialeurodes vaporariorum</i><br/>(TRIAVA)</p> <p><b>Θρίπες</b><br/><i>Frankliniella occidentalis</i><br/>(FRANOC)</p> <p><b>Ακάρεα</b><br/><i>Tetranychus urticae</i><br/>(TETRUR)</p> | 0,3-1 | 1 <sup>1</sup> | 30-100 | Με την εμφάνιση της προσβολής | 5/7 |
| <b>Λυκίσκος</b>          | <b>Αφίδες</b>  | 0,3-1 | 1 <sup>1</sup> | 30-100 | Με την                        | 5   |

|                   |   |       |                |        |                               |     |
|-------------------|---|-------|----------------|--------|-------------------------------|-----|
| (HUMLU)           | <p><i>Aphis gossypii</i><br/>(APHIGO)<br/><i>Myzus persicae</i><br/>(MYZUPE)<br/><i>Aphis fabae</i><br/>(APHIFA)<br/><i>Macrosiphum euphorbiae</i><br/>(MACSEU)<br/><i>Macrosiphum sp.</i><br/>(MACSSP)</p> <p><b>Αλευρώδεις</b><br/><i>Bemisia tabaci</i><br/>(BEMITA)<br/><i>Trialeurodes vaporariorum</i><br/>(TRIAVA)</p> <p><b>Θρίπες</b><br/><i>Frankliniella occidentalis</i><br/>(FRANOC)</p> <p><b>Ακάρεα</b><br/><i>Tetranychus urticae</i><br/>(TETRUR)</p>      |       |                |        | εμφάνιση της προσβολής        |     |
| <b>Βοσκότοποι</b> | <p><b>Αφίδες</b><br/><i>Aphis gossypii</i><br/>(APHIGO)<br/><i>Myzus persicae</i><br/>(MYZUPE)<br/><i>Aphis fabae</i><br/>(APHIFA)<br/><i>Macrosiphum euphorbiae</i><br/>(MACSEU)<br/><i>Macrosiphum sp.</i><br/>(MACSSP)</p> <p><b>Αλευρώδεις</b><br/><i>Bemisia tabaci</i><br/>(BEMITA)<br/><i>Trialeurodes vaporariorum</i><br/>(TRIAVA)</p> <p><b>Θρίπες</b><br/><i>Frankliniella occidentalis</i><br/>(FRANOC)</p> <p><b>Ακάρεα</b><br/><i>Tetranychus urticae</i></p> | 0,3-1 | 1 <sup>1</sup> | 30-100 | Με την εμφάνιση της προσβολής | 5/7 |

|   |   |       |                |        |                               |     |
|---|---|-------|----------------|--------|-------------------------------|-----|
|   | (TETRUR)  |       |                |        |                               |     |
| <b>Άγριο ραδίκι</b><br>(CICIN)          | <b>Αφίδες</b><br><i>Aphis gossypii</i><br>(APHIGO)<br><i>Myzus persicae</i><br>(MYZUPE)<br><i>Aphis fabae</i><br>(APHIFA)<br><i>Macrosiphum euphorbiae</i><br>(MACSEU)<br><i>Macrosiphum sp.</i><br>(MACSSP)<br><br><b>Αλευρώδεις</b><br><i>Bemisia tabaci</i><br>(BEMITA)<br><i>Trialeurodes vaporariorum</i><br>(TRIAVA)<br><br><b>Θρίπες</b><br><i>Frankliniella occidentalis</i><br>(FRANOC)<br><br><b>Ακάρεα</b><br><i>Tetranychus urticae</i><br>(TETRUR) | 0,3-1 | 1 <sup>1</sup> | 30-100 | Με την εμφάνιση της προσβολής | 5/7 |
| <b>Παπαρούνα<sup>5</sup></b><br>(PAPSO) | <b>Αφίδες</b><br><i>Aphis gossypii</i><br>(APHIGO)<br><i>Myzus persicae</i><br>(MYZUPE)<br><i>Aphis fabae</i><br>(APHIFA)<br><i>Macrosiphum euphorbiae</i><br>(MACSEU)<br><i>Macrosiphum sp.</i><br>(MACSSP)<br><br><b>Αλευρώδεις</b><br><i>Bemisia tabaci</i><br>(BEMITA)<br><i>Trialeurodes vaporariorum</i><br>(TRIAVA)<br><br><b>Θρίπες</b><br><i>Frankliniella occidentalis</i><br>(FRANOC)<br><br><b>Ακάρεα</b>   | 0,3-1 | 1 <sup>1</sup> | 30-100 | Με την εμφάνιση της προσβολής | 5/7 |

|  |  |       |                |        |                               |     |
|--|--|-------|----------------|--------|-------------------------------|-----|
|  | <i>Tetranychus urticae</i><br>(TETRUR)   |       |                |        |                               |     |
| <b>Ανθοκομικά και καλλωπιστικά φυτά, Φυτώρια καλλωπιστικών φυτών</b> | <b>Αφίδες</b><br><i>Aphis gossypii</i><br>(APHIGO)<br><i>Myzus persicae</i><br>(MYZUPE)<br><i>Aphis fabae</i><br>(APHIFA)<br><i>Macrosiphum euphorbiae</i><br>(MACSEU)<br><i>Macrosiphum sp.</i><br>(MACSSP)<br><i>Aulacorthum circumflexum</i><br>(MYZUCI)<br><i>Myzus ornatus</i><br>(MYZUPO)<br><i>Macrosiphoniella sanborni</i><br>(MACRCH)<br><br><b>Αλευρώδεις</b><br><i>Bemisia tabaci</i><br>(BEMITA)<br><i>Trialeurodes vaporariorum</i><br>(TRIAVA)<br><br><b>Θρίπες</b><br><i>Frankliniella occidentalis</i><br>(FRANOC)<br><br><b>Ακάρεα</b><br><i>Tetranychus urticae</i><br>(TETRUR) | 0,3-1 | 1 <sup>1</sup> | 30-100 | Με την εμφάνιση της προσβολής | 5/7 |
| <b>Τριανταφυλλιά (Υ+Θ) (1ROSG)</b>                                   | <b>Αφίδες</b><br><i>Aphis gossypii</i><br>(APHIGO)<br><i>Myzus persicae</i><br>(MYZUPE)<br><i>Aphis fabae</i><br>(APHIFA)<br><i>Macrosiphum euphorbiae</i><br>(MACSEU)<br><i>Macrosiphum sp.</i><br>(MACSSP)<br><i>Myzus ornatus</i><br>(MYZUPO)<br><i>Macrosiphoniella sanborni</i>   | 0,3-1 | 1 <sup>1</sup> | 30-100 | Με την εμφάνιση της προσβολής | 5/7 |

|   |  |       |                |        |                               |     |
|---|--|-------|----------------|--------|-------------------------------|-----|
|   | <p>(MACRCH)</p> <p><b>Αλευρώδεις</b><br/><i>Bemisia tabaci</i><br/>(BEMITA)<br/><i>Trialeurodes vaporariorum</i><br/>(TRIAVA)<br/><i>Aleurocanthus spiniferus</i><sup>6</sup><br/>(ALECSN)</p> <p><b>Θρίπες</b><br/><i>Frankliniella occidentalis</i><br/>(FRANOC)</p> <p><b>Ακάρεα</b><br/><i>Tetranychus urticae</i><br/>(TETRUR)</p>  |       |                |        |                               |     |
| <p><b>Σπορεία (Υ+Θ)</b><br/>Κηπευτικές καλλιέργειες</p> | <p><b>Αφίδες</b><br/><i>Aphis gossypii</i><br/>(APHIGO)<br/><i>Myzus persicae</i><br/>(MYZUPE)<br/><i>Aphis fabae</i><br/>(APHIFA)<br/><i>Macrosiphum euphorbiae</i><br/>(MACSEU)<br/><i>Macrosiphum</i> sp.<br/>(MACSSP)<br/><i>Myzus ornatus</i><br/>MYZUPO<br/><i>Macrosiphoniella sanborni</i><br/>(MACRCH)</p> <p><b>Αλευρώδεις</b><br/><i>Bemisia tabaci</i><br/>(BEMITA)<br/><i>Trialeurodes vaporariorum</i><br/>(TRIAVA)</p> <p><b>Ακάρεα</b><br/><i>Tetranychus urticae</i><br/>(TETRUR)</p> <p><b>Θρίπες</b><br/><i>Frankliniella occidentalis</i><br/>(FRANOC)<br/><i>Thrips</i> sp.</p> | 0,3-1 | 1 <sup>1</sup> | 30-100 | Με την εμφάνιση της προσβολής | 5/7 |

|   |   |       |                |                     |                               |     |
|---|---|-------|----------------|---------------------|-------------------------------|-----|
|   | (THRISP)  |       |                |                     |                               |     |
| <b>Καλλιέργειες για σποροπαραγωγή (Υ+Θ)</b>   | <b>Αφίδες</b><br><i>Aphis gossypii</i><br>(APHIGO)<br><i>Myzus persicae</i><br>(MYZUPE)<br><i>Aphis fabae</i><br>(APHIFA)<br><i>Macrosiphum euphorbiae</i><br>(MACSEU)<br><i>Macrosiphum sp.</i><br>(MACSSP)<br><i>Myzus ornatus</i><br>(MYZUPO)<br><i>Macrosiphoniella sanborni</i><br>(MACRCH)<br><br><b>Αλευρώδεις</b><br><i>Bemisia tabaci</i><br>(BEMITA)<br><i>Trialeurodes vaporariorum</i><br>(TRIAVA)<br><br><b>Ακάρεα</b><br><i>Tetranychus urticae</i><br>(TETRUR)<br><br><b>Θρίπες</b><br><i>Frankliniella occidentalis</i><br>(FRANOC) | 0,3-1 | 1 <sup>1</sup> | 30-100              | Με την εμφάνιση της προσβολής | 5/7 |
| <b>Όλα τα λοιπά λαχανικά (Υ+Θ)</b>  | <b>Αλευρώδεις</b><br><i>Bemisia tabaci</i><br>(BEMITA)<br><i>Trialeurodes vaporariorum</i><br>(TRIAVA)<br><br><b>Θρίπες</b><br><i>Frankliniella occidentalis</i><br>(FRANOC)  | 0,3-1 | 1 <sup>1</sup> | 30-100              | Με την εμφάνιση της προσβολής | 5/7 |
| <b>Μηλοειδή</b><br><b>Μηλιά</b><br>(MABSD)<br><b>Αχλαδιά</b><br>(PYUCO)<br><b>Κυδωνιά</b><br>(CYDOB)<br><b>Μουσμουλιά Ιαπωνική</b><br>(EIOJA) | <b>Ψύλλες</b><br><i>Cacopsylla pyri</i><br>(PSYLPI)<br><i>Cacopsylla mali</i><br>(PSYLMA)<br><i>Cacopsylla picta</i><br>(PSYLCO)<br><i>Cacopsylla melanoneura</i>   | 0,5-1 | 1 <sup>1</sup> | 50-200 <sup>4</sup> | Με την εμφάνιση της προσβολής | 5/7 |

|   |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|
| <p><b>Μουσμουλιά</b><br/>(MSPGE)<br/><b>Αχλαδιά Nashi</b><br/>(PYUPC)</p> | <p>(PSYLME)</p> <p><b>Αφίδες</b><br/><i>Aphis pomi</i><br/>(APHIPO)<br/><i>Myzus persicae</i><br/>(MYZUPE)<br/><i>Dysaphis plantaginea</i><br/>(DYSAPL)<br/><i>Dysaphis pyri</i><br/>(DYSAPY)<br/><i>Eriosoma lanigerum</i> (ERISLA)<br/><i>Hyalopterus pruni</i><br/>(HYALPR)<br/><i>Brachycaudus helichrysi</i><br/>(ANURHE)<br/><i>Brachycaudus schwartzi</i><br/>(APPESW)<br/><i>Myzus varians</i><br/>(MYZUVA)<br/><i>Aphis gossypii</i><br/>(APHIGO)<br/><i>Myzus cerasi</i><br/>(MYZUCE)<br/><i>Pterochloroides persicae</i><br/>(PTECPE)<br/><i>Hyalopterus amygdali</i><br/>(HYALAM)<br/><i>Aphis fabae</i><br/>(APHIFA)<br/><i>Sitobion fragariae</i><br/>(MACSFR)<br/><i>Aphis idaei</i><br/>(APHIID)<br/><i>Aphis ruborum</i><br/>(APHIRB)<br/><i>Amphorophora rubi</i><br/>(AMPRHU)<br/><i>Rhopalosiphoninus ribesinus</i><br/>(RHOSRI)<br/><i>Appelia prunicola</i><br/>(=<i>Brachycaudus prunicola</i>)<br/>(APPEPR)</p> <p><b>Ακάρεα</b><br/><i>Tetranychus urticae</i><br/>(TETRUR)</p> |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|



|   |  |       |                |                     |                               |     |
|---|--|-------|----------------|---------------------|-------------------------------|-----|
|   | <i>Panonychus ulmi</i><br>(METTUL)   |       |                |                     |                               |     |
|   | <b>Θρίπες</b><br><i>Frankliniella occidentalis</i><br>(FRANOC)   |       |                |                     |                               |     |
| <b>Ροδακινιά</b><br>(PRNPS)<br><b>Βερυκοκιά</b><br>(PRNAR)<br><b>Κορομηλιά</b><br>(PRNDS)<br><b>Δαμασκηλιά</b><br>(PRNDO) | <b>Αφίδες</b><br><i>Aphis pomi</i><br>(APHIPO)<br><i>Myzus persicae</i><br>(MYZUPE)<br><i>Hyalopterus pruni</i><br>(HYALPR)<br><i>Brachycaudus helichrysi</i><br>(ANURHE)<br><i>Brachycaudus schwartzi</i><br>(APPESW)<br><i>Myzus varians</i><br>(MYZUVA)<br><i>Aphis gossypii</i><br>(APHIGO)<br><i>Myzus cerasi</i><br>(MYZUCE)<br><i>Pterochloroides persicae</i><br>(PTECPE)<br><i>Hyalopterus amygdali</i><br>(HYALAM)<br><i>Aphis fabae</i><br>(APHIFA)<br><i>Sitobion fragariae</i><br>(MACSFR)<br><i>Aphis idaei</i><br>(APHIID)<br><i>Aphis ruborum</i><br>(APHIRB)<br><i>Amphorophora rubi</i><br>(AMPRHU)<br><i>Rhopalosiphoninus ribesinus</i><br>(RHOSRI)<br><i>Appelia prunicola</i><br>(=Brachycaudus Prunicola)<br>(APPEPR)<br><br><b>Δροσόφιλα</b><br><i>Drosophila suzukii</i><br>(DROSSU)<br><br><b>Ακάρεα</b> | 0,5-1 | 1 <sup>1</sup> | 50-200 <sup>4</sup> | Με την εμφάνιση της προσβολής | 5/7 |

|   |   |       |                |                     |                               |     |
|---|---|-------|----------------|---------------------|-------------------------------|-----|
|   | <i>Tetranychus urticae</i><br>(TETRUR)<br><i>Panonychus ulmi</i><br>(METTUL)<br><br><b>Θρίπες</b><br><i>Frankliniella occidentalis</i><br>(FRANOC)  |       |                |                     |                               |     |
| <b>Κερασιά</b><br>(PRNAV)<br><b>Βυσσινιά</b><br>(PRNCE) | <b>Αφίδες</b><br><i>Aphis pomi</i><br>(APHIPO)<br><i>Myzus persicae</i><br>(MYZUPE)<br><i>Hyalopterus pruni</i><br>(HYALPR)<br><i>Brachycaudus helichrysi</i><br>(ANURHE)<br><i>Brachycaudus schwartzi</i><br>(APPESW)<br><i>Myzus varians</i><br>(MYZUVA)<br><i>Aphis gossypii</i><br>(APHIGO)<br><i>Myzus cerasi</i><br>(MYZUCE)<br><i>Pterochloroides persicae</i><br>(PTECPE)<br><i>Hyalopterus amygdali</i><br>(HYALAM)<br><i>Aphis fabae</i><br>(APHIFA)<br><i>Sitobion fragariae</i><br><b>(MACSFR)</b><br><i>Aphis idaei</i><br>(APHIID)<br><i>Aphis ruborum</i><br>(APHIRB)<br><i>Amphorophora rubi</i><br>(AMPRHU)<br><i>Rhopalosiphoninus ribesinus</i><br><b>(RHOSRI)</b><br><i>Appelia prunicola</i><br>(=Brachycaudus Prunicola)<br>(APPEPR)<br><br><b>Ακάρεα</b><br><i>Tetranychus</i> | 0,5-1 | 1 <sup>1</sup> | 50-200 <sup>4</sup> | Με την εμφάνιση της προσβολής | 5/7 |

|   |   |       |                |                     |                               |     |
|---|---|-------|----------------|---------------------|-------------------------------|-----|
|   | <i>urticae</i><br>(TETRUR)<br><i>Panonychus ulmi</i><br>(METTUL)<br><br><b>Δροσόφιλα</b><br><i>Drosophila suzukii</i><br>(DROSSU)<br><br><b>Θρίπες</b><br><i>Frankliniella occidentalis</i><br>(FRANOC)   |       |                |                     |                               |     |
| <b>Κερασιά</b><br>(PRNAV)   | <i>Quadraspidiotus perniciosus</i> <sup>6</sup><br>(QUADPE)   | 0,5-1 | 1 <sup>1</sup> | 50-200 <sup>4</sup> | Με την εμφάνιση της προσβολής |     |
| <b>Ακρόδρυα</b> <sup>6</sup><br><b>Αμυγδαλιά</b><br>(PRNDU)<br><b>Φουντουκιά</b><br>(CYLAV)<br><b>Καρυδιά</b><br>(IUGRE)<br><b>Καστανιά</b><br>(CSNSA)<br><b>Φυσικιά</b><br>(PIAVE)<br><b>Καρύδια Βραζιλίας</b><br>(BTHEX)<br><b>Κάσιους</b><br>(ANAOC)<br><b>Καρύδα</b><br>(CCNNU)<br><b>Μακαντάμια</b><br>(MCDTT)<br><b>Πεκάν</b><br>(CYAIL)<br><b>Κουκουναριά</b><br>(PIUPN) | <b>Αφίδες</b><br><i>Aphis pomi</i><br>(APHIPO)<br><i>Myzus persicae</i><br>(MYZUPE)<br><i>Hyalopterus pruni</i><br>(HYALPR)<br><i>Brachycaudus helichrysi</i><br>(ANURHE)<br><i>Brachycaudus schwartzi</i><br>(APPESW)<br><i>Myzus varians</i><br>(MYZUVA)<br><i>Aphis gossypii</i><br>(APHIGO)<br><i>Myzus cerasi</i><br>(MYZUCE)<br><i>Pterochloroides persicae</i><br>(PTECPE)<br><i>Hyalopterus amygdali</i><br>(HYALAM)<br><i>Aphis fabae</i><br>(APHIFA)<br><i>Sitobion fragariae</i><br>(MACSFR)<br><i>Aphis idaei</i><br>(APHIID)<br><i>Aphis ruborum</i><br>(APHIRB)<br><i>Amphorophora rubi</i><br>(AMPRHU)<br><i>Rhopalosiphoninus ribesinus</i><br>(RHOSRI)<br><i>Appelia prunicola</i> | 0,5-1 | 1 <sup>1</sup> | 50-200 <sup>4</sup> | Με την εμφάνιση της προσβολής | 5/7 |

|  |  |       |                |                     |                               |     |
|--|--|-------|----------------|---------------------|-------------------------------|-----|
|  | <p>(=<i>Brachycaudus prunicola</i>)<br/>(APPEPR)</p> <p><b>Ακάρεα</b><br/><i>Tetranychus urticae</i><br/>(TETRUR)<br/><i>Phytoptus avellanae</i><br/>(ERPHAV)</p> <p><b>Θρίπες</b><br/><i>Frankliniella occidentalis</i><br/>(FRANOC)</p> <p><b>Κοκκοειδή</b><br/><i>Eulecanium tiliae</i><br/>(LECATI)<br/><b><i>Parthenolecanium corni</i></b><br/>(LECACO)<br/><i>Ceroplastes sinensis</i> (CERPSI)<br/><i>Saissetia oleae</i><br/>(SAISOL)<br/><i>Coccus hesperidum</i><br/>(COCCHE)<br/><i>Melanaspis</i> sp.<br/>(MELASP)<br/><i>Sphaerolecanium prunastri</i><br/>(LECAPN)<br/><i>Pseudaulacaspis pentagona</i><br/>(PSEAPE)<br/><i>Lepidosaphes ulmi</i><br/>(LEPSUL)<br/><i>Melanaspis inopinata</i><br/>(MELAIN)<br/><i>Aeonidiella aurantii</i><br/>(AONDAU)<br/><i>Quadraspidiotus perniciosus</i><br/>(QUADPE)<br/><i>Pseudococcus</i> sp.<br/>(PSECSP)</p> |       |                |                     |                               |     |
| <p><b>Εσπεριδοειδή</b><br/><b>Πορτοκαλιά</b><br/>(CIDSΙ)<br/><b>Μανταρινιά</b><br/>(CIDRE)</p> | <p><b>Αφίδες</b><br/><i>Aphis gossypii</i><br/>(APHIGO)<br/><i>Myzus persicae</i><br/>(MYZUPE)</p>   | 0,5-1 | 1 <sup>1</sup> | 50-250 <sup>4</sup> | Με την εμφάνιση της προσβολής | 5/7 |

|   |   |  |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|--|
| <p><b>Λεμονιά</b><br/>(CIDLI)<br/><b>Γκρεΐπ-φρουτ</b><br/>(CIDPA)<br/><b>Λάιμ</b><br/>(CIDAF)<br/><b>Pomelos</b><br/>(CIDGR)<br/><b>Κουμ κουάτ</b><br/>(FOLJA)<br/><b>Περγαμόντο</b><br/>(CIDAB)<br/><b>Λοιπά</b></p> | <p><i>Toxoptera auranti</i><br/>(TOXOAU)<br/><b>Toxoptera</b><br/><b>criticidus</b><br/>(TOXOCI)<br/><i>Aphis spiraecola</i><br/><b>(=Aphis citricola)</b><br/>(APHISI)<br/><i>Aphis fabae</i><br/>(APHIFA)<br/><i>Macrosiphum</i><br/><i>euphorbiae</i><br/>(MACSEU)</p> <p><b>Ακάρεα</b><br/><i>Tetranychus</i><br/><i>urticae</i><br/>(TETRUR)<br/><i>Panonychus citri</i><br/>(METTCI)</p> <p><b>Θρίπες</b><br/><i>Thripidae</i><br/>(1THRIF)<br/><i>Frankliniella</i><br/><i>occidentalis</i><br/>(FRANOC)<br/><i>Selenothrips</i><br/><i>rubrocinctus</i><br/>(SLENRU)<br/><i>Heliothrips</i><br/><i>haemorrhoidalis</i><br/>(HEALTHA)<br/><i>Pezothrips</i><br/><i>kellyanus</i> (PEZTKE)</p> <p><b>Αλευρώδεις</b><br/><i>Trialeurodes</i><br/><i>vaporariorum</i><br/>(TRIAVA)<br/><i>Aleurothrixus</i><br/><i>floccosus</i><br/><b>(ALTHFL)</b><br/><i>Dialeurodes citri</i><br/>(DIALCI)<br/><i>Parabemisia</i><br/><i>myricae</i><br/>(PRABMY)<br/><i>Aleurocanthus</i><br/><i>spiniferus</i><sup>6</sup><br/>(ALECSN)</p> <p><b>Κοκκοειδή</b><br/><i>Aonidiella aurantii</i><br/>(AONDAU)</p> |  |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|--|

|                          |  |       |                |                     |                               |     |
|--------------------------|--|-------|----------------|---------------------|-------------------------------|-----|
|                          | <i>Ceroplastes sinensis</i><br>(CERPSI)  |       |                |                     |                               |     |
| <b>Ελιά</b><br>(OLVEU)   | <b>Αφίδες</b><br><i>Aphis sp.</i><br>(APHISP)<br><br><b>Κοκκοειδή</b><br><i>Saissetia Oleae</i><br>(SAISOL)<br><i>Leucaspis riccae</i><br>(LEUARI)<br><i>Aspidiotus nerii</i><br>(ASPDNE)<br><i>Lepidosaphes ulmi</i><br>(LEPSUL)<br><br><b>Αλευρώδεις</b><br><i>Trialeurodes vaporariorum</i><br>(TRIAVA)<br><br><b>Θρίπες</b><br>Thripidae<br>(1THRIF)<br><br><i>Calocoris trivialis</i> <sup>6</sup><br>(CLCRTR)<br>Κοκκοειδή<br><i>Polinia pollini</i> <sup>6</sup><br>(POLNPO)<br>Βαμβακάδα<br><i>Euphyllura olivina</i><br><sup>6</sup> (EURHOL) | 0,5-1 | 1 <sup>1</sup> | 50-250 <sup>4</sup> | Με την εμφάνιση της προσβολής | 5/7 |
| <b>Αμπέλι</b><br>(VITVI) | <b>Θρίπες</b><br><i>Frankliniella occidentalis</i><br>(FRANOC)<br><br><b>Ακάρια</b><br><i>Tetranychus urticae</i><br>(TETRUR)<br><i>Panonychus ulmi</i><br>(METTUL)<br><br><b>Τζιτζικάκια</b><br><i>Empoasca vitis</i><br>(EMPOFL)<br><i>Scaphoideus titanus</i><br>(SCAPLI)<br><b><i>Metcalfa pruinosa</i></b><br><sup>6</sup> (METFPR)<br><b>Κοκκοειδή</b><br><i>Planococcus ficus</i>   | 0,3-1 | 1 <sup>1</sup> | 30-100              | Με την εμφάνιση της προσβολής | 5/7 |

|                                       |   |       |                |        |                               |     |
|---------------------------------------|---|-------|----------------|--------|-------------------------------|-----|
|                                       | (PLANFI)<br><i>Parthenolecanium corni</i><br>(LECACO)<br><i>Pulvinaria vitis</i><br>(PULVVI)<br><i>Pseudococcus citri</i><br><sup>6</sup> (PSECCI)<br><br><b>Δροσόφιλα</b><br><i>Drosophila suzukii</i><br>(DROSSU)<br><br><b>Αφίδες</b><br><i>Aphis sp.</i><br>(APHISP)<br><i>Viteus vitifoliae</i><br>(VITEVI)<br><br><b>Αλευρώδεις</b><br><i>Aleurocanthus spiniferus</i> <sup>6</sup><br>(ALECSN)     |       |                |        |                               |     |
| <b>Ροδιά<sup>6</sup></b><br>(PUNGR)   | <b>Αφίδες</b><br><i>Aphis gossypii</i><br>(APHIGO)<br><i>Aphis fabae</i><br>(APHIFA)<br><i>Macrosiphum euphorbiae</i><br>(MACSEU)<br><i>Myzus persicae</i><br>(MYZUPE)<br><br><b>Θρίπες</b><br><i>Thrips sp.</i><br>(THRISP)<br><br><b>Ακάρια</b><br><i>Tetranychus urticae</i><br>(TETRUR)<br><br><b>Αλευρώδεις</b><br><i>Bemisia tabaci</i><br>(BEMITA)<br><i>Trialeurodes vaporariorum</i><br>(TRIAVA) | 0,3-1 | 1 <sup>1</sup> | 30-100 | Με την εμφάνιση της προσβολής | 5/7 |
| <b>Μπανάνα<sup>6</sup></b><br>(MUBSS) | <b>Αφίδες</b><br><i>Aphis gossypii</i><br>(APHIGO)<br><i>Aphis fabae</i><br>(APHIFA)<br><i>Macrosiphum euphorbiae</i>   | 0,3-1 | 1 <sup>1</sup> | 30-100 | Με την εμφάνιση της προσβολής | 5/7 |

|                                      |   |       |                |                     |                               |     |
|--------------------------------------|---|-------|----------------|---------------------|-------------------------------|-----|
|                                      | <p>(MACSEU)<br/><i>Myzus persicae</i><br/>(MYZUPE)</p> <p><b>Θρίπες</b><br/><i>Thrips sp.</i><br/>(THRISP)<br/><i>Hercinothrips femoralis</i><br/>(HERCFE)<br/><i>Thrips florum</i><br/>(THRIFO)</p> <p><b>Ακάρεα</b><br/><i>Tetranychus urticae</i><br/>(TETRUR)</p> <p><b>Αλευρώδεις</b><br/><i>Aleurothrixus sp.</i><br/>(ALTHSP)</p> <p><b>Κοκκοειδή</b><br/><i>Planococcus citri</i><br/>(PSECCI)<br/><i>Dysmicoccus grasilii</i><br/>(DYSMGR)</p>                         |       |                |                     |                               |     |
| <b>Μάγκο</b> <sup>6</sup><br>(MNGIN) | <p><b>Αφίδες</b><br/><i>Aphis gossypii</i><br/>(APHIGO)<br/><i>Aphis fabae</i><br/>(APHIFA)<br/><i>Macrosiphum euphorbiae</i><br/><b>(MACSEU)</b><br/><i>Myzus persicae</i><br/>(MYZUPE)</p> <p><b>Αλευρώδεις</b><br/><i>Trialeurodes vaporariorum</i><br/>(TRIAVA)<br/><i>Bemisia tabaci</i><br/>(BEMITA)</p> <p><b>Ακάρεα</b><br/><i>Tetranychus urticae</i><br/>(TETRUR)</p> <p><b>Θρίπες</b><br/><i>Frankliniella occidentalis</i><br/>(FRANOC)</p> <p><b>Κοκκοειδή</b></p> | 0,5-1 | 1 <sup>1</sup> | 50-250 <sup>4</sup> | Με την εμφάνιση της προσβολής | 5/7 |



|                                     |   |       |                |        |                               |     |
|-------------------------------------|---|-------|----------------|--------|-------------------------------|-----|
|                                     | <i>Pseudococcus viburni</i><br>PSECOB<br><b><i>Parthenolecanium corni</i></b><br>LECACO<br><i>Planococcus ficus</i><br>PLANFI<br><i>Planococcus citri</i><br>PSECCI<br><i>Parlatoria oleae</i><br>PARLSP  |       |                |        |                               |     |
| <b>Συκιά<sup>6</sup></b><br>(FIUCA) | <b>Ακάρεα</b><br><i>Tetranychus urticae</i><br>(TETRUR)<br><br><b>Κοκκοειδή</b><br><i>Ceroplastes sp.</i><br>CERPSP<br><br><b>Ψύλλα της συκιάς</b><br><i>Homotoma ficus</i><br>(HOMTFI)<br><br><b>Θρίπες</b><br><i>Thrips sp.</i><br>(THRSP)  | 0,3-1 | 1 <sup>1</sup> | 30-100 | Με την εμφάνιση της προσβολής | 5/7 |
| <b>Φασόλι Ινδιών</b><br>(NELNU)     | <b>Αφίδες</b><br><i>Aphis gossypii</i><br>(APHIGO)<br><i>Aphis fabae</i><br>(APHIFA)<br><i>Macrosiphum euphorbiae</i><br>(MACSEU)<br><i>Myzus persicae</i><br>(MYZUPE)<br><br><b>Αλευρώδεις</b><br><i>Trialeurodes vaporariorum</i><br>(TRIAVA)<br><i>Bemisia tabaci</i><br>(BEMITA)<br><br><b>Ακάρεα</b><br><i>Tetranychus urticae</i><br>(TETRUR)<br><br><b>Θρίπες</b><br><i>Frankliniella occidentalis</i><br>(FRANOC) | 0,3-1 | 1 <sup>1</sup> | 30-100 | Με την εμφάνιση της προσβολής | 5/7 |

|   |   |       |                |        |                               |     |
|---|---|-------|----------------|--------|-------------------------------|-----|
|   | <b>Κοκκοειδή</b><br><i>Pseudococcus viburni</i><br>(PSECOB)<br><b>Parthenolecanium corni</b><br>(LECACO)<br><i>Planococcus ficus</i><br>(PLANFI)<br><i>Planococcus citri</i><br>(PSECCI)<br><i>Parlatoria oleae</i><br>(PARLSP)   |       |                |        |                               |     |
| <b>Ακτινίδιο<sup>6</sup></b><br>(ATICH) | <b>Ακάρεα</b><br><i>Tetranychus urticae</i><br>(TETRUR)<br><br><b>Κοκκοειδή</b><br><i>Pseudaulacaspis pentagona</i><br>(PSEAPE)<br><br><i>Metcalfa sp.</i> <sup>6</sup><br>(METFSP)<br><br><i>Euphyllura sp.</i> <sup>6</sup><br>(EUPHSP)   | 0,3-1 | 1 <sup>1</sup> | 30-100 | Με την εμφάνιση της προσβολής | 5/7 |
| <b>Ανανάς<sup>6</sup></b><br>(ANHCO)    | <b>Αφίδες</b><br><i>Aphis gossypii</i><br>(APHIGO)<br><i>Aphis fabae</i><br>(APHIFA)<br><i>Macrosiphum euphorbiae</i><br>(MACSEU)<br><i>Myzus persicae</i><br>(MYZUPE)<br><br><b>Αλευρώδεις</b><br><i>Trialeurodes vaporariorum</i><br>(TRIAVA)<br><i>Bemisia tabaci</i><br>(BEMITA)<br><br><b>Ακάρεα</b><br><i>Tetranychus urticae</i><br>(TETRUR)<br><br><b>Θρίπες</b><br><i>Frankliniella occidentalis</i><br>(FRANOC) | 0,3-1 | 1 <sup>1</sup> | 30-100 |                               | 5/7 |

|   |   |       |                |        |                               |     |
|---|---|-------|----------------|--------|-------------------------------|-----|
|   | <b>Κοκκοειδή</b><br><i>Pseudococcus viburni</i><br>(PSECOB)<br><b><i>Parthenolacanium corni</i></b><br>(LECACO)<br><i>Planococcus ficus</i><br>(PLANFI)<br><i>Planococcus citri</i><br>(PSECCI)<br><i>Parlatoria oleae</i><br>(PARLSP)  |       |                |        |                               |     |
| <b>Αβοκάντο<sup>6</sup></b><br>PEBAM  | <b>Ακάρεα</b><br><i>Tetranychus urticae</i><br>(TETRUR) \<br><b><i>Oligonychus (1OLIGG)</i></b><br><br><b>Αφίδες</b><br><i>Aphis gossypii</i><br>(APHIGO)<br><i>Aphis fabae</i><br>(APHIFA)<br><i>Macrosiphum euphorbiae</i><br>(MACSEU)<br><i>Myzus persicae</i><br>(MYZUPE)<br><br><b>Θρίπες</b><br><i>Thrips sp.</i><br>(THRISP)<br><i>Oligonychus (1OLIGG)</i><br><br><b>Αλευρώδεις</b><br><i>Aleurothrixus floccosus</i><br>(ALTHFL)<br><br><b>Κοκκοειδή</b><br><i>Pseudococcus sp.</i><br>(PSECS) | 0,3-1 | 1 <sup>1</sup> | 30-100 | Με την εμφάνιση της προσβολής | 5/7 |
| <b>Μουρα και μικροί καρποί (Υ+Θ)<sup>6</sup></b><br><b>Βατόμουρα</b><br>(RUBOC, RUBFR)<br><b>Σμέουρα (ερυθρά και κίτρινα)</b><br>(RUBAR, RUBID)<br><b>Μύρτιλλα</b><br>(ABOAR, VACMY)<br><b>Φραγκοσταφυλά (μαυρά, κοκκίνα,</b> | <b>Ακάρεα</b><br><i>Tetranychus urticae</i> (TETRUR)<br><br><b>Αφίδες</b><br><i>Aphis gossypii</i><br>(APHIGO)<br><i>Aphis fabae</i><br>(APHIFA)<br><i>Macrosiphum euphorbiae</i>   | 0,3-1 | 1 <sup>1</sup> | 30-100 | Με την εμφάνιση της προσβολής | 5/7 |

|  |  |       |                |        |                               |     |
|--|--|-------|----------------|--------|-------------------------------|-----|
| <p><b>άσπρα)</b><br/>(RIBNI, RIBRU)<br/><b>Φραγκοσταφυλα</b><br/>(κόκκινα, πράσινα,<br/>κίτρινα<br/>(RIBUC)<br/><b>Λοιπά</b></p> | <p>(MACSEU)<br/><i>Myzus persicae</i><br/>(MYZUPE)</p> <p><b>Δροσόφιλα</b><br/><i>Drosophila suzukii</i><br/>(DROSSU)</p> <p><b>Θρίπες</b><br/><i>Frankliniella occidentalis</i><br/>(FRANOC)</p>  |       |                |        |                               |     |
| <p><b>Γκουάβα<sup>5</sup></b><br/>(PSISS)</p>  | <p><b>Αφίδες</b><br/><i>Aphis gossypii</i><br/>(APHIGO)<br/><i>Aphis fabae</i><br/>(APHIFA)<br/><i>Macrosiphum euphorbiae</i><br/>(MACSEU)<br/><i>Myzus persicae</i><br/>(MYZUPE)</p> <p><b>Αλευρώδεις</b><br/><i>Trialeurodes vaporariorum</i><br/>(TRIAVA)<br/><i>Bemisia tabaci</i><br/>(BEMITA)</p> <p><b>Ακάρεα</b><br/><i>Tetranychus urticae</i><br/>(TETRUR)</p> <p><b>Θρίπες</b><br/><i>Frankliniella occidentalis</i><br/>(FRANOC)</p> <p><b>Κοκκοειδή</b><br/><i>Pseudococcus viburni</i><br/>(PSECOB)<br/><b><i>Parthenolecanium corni</i></b><br/>(LECACO)<br/><i>Planococcus ficus</i><br/>(PLANFI)<br/><i>Planococcus citri</i><br/>(PSECCI)<br/><i>Parlatoria oleae</i><br/>(PARLSP)</p> | 0,3-1 | 1 <sup>1</sup> | 30-100 | Με την εμφάνιση της προσβολής | 5/7 |
| <p><b>Παπάγια<sup>5</sup></b><br/>(CIAPA)</p>  | <p><b>Αφίδες</b><br/><i>Aphis gossypii</i><br/>(APHIGO)</p>  | 0,3-1 | 1 <sup>1</sup> | 30-100 | Με την εμφάνιση της           | 5/7 |

|                                     |   |       |                |        |                               |     |
|-------------------------------------|---|-------|----------------|--------|-------------------------------|-----|
|                                     | <p><i>Aphis fabae</i><br/>(APHIFA)<br/><i>Macrosiphum euphorbiae</i><br/>(MACSEU)<br/><i>Myzus persicae</i><br/>(MYZUPE)</p> <p><b>Αλευρώδεις</b><br/><i>Trialeurodes vaporariorum</i><br/>(TRIAVA)<br/><i>Bemisia tabaci</i><br/>(BEMITA)</p> <p><b>Ακάρεα</b><br/><i>Tetranychus urticae</i><br/>(TETRUR)</p> <p><b>Θρίπες</b><br/><i>Frankliniella occidentalis</i><br/>(FRANOC)</p> <p><b>Κοκκοειδή</b><br/><i>Pseudococcus viburni</i><br/>(PSECOB)<br/><b><i>Parthenolecanium corni</i></b><br/>(LECACO)<br/><i>Planococcus ficus</i><br/>(PLANFI)<br/><i>Planococcus citri</i><br/>(PSECCI)<br/><i>Parlatoria oleae</i><br/>(PARLSP)</p> |       |                |        | προσβολής                     |     |
| <b>Λωτός<sup>6</sup></b><br>(DOSKA) | <p><b>Αφίδες</b><br/><i>Aphis gossypii</i><br/>(APHIGO)<br/><i>Aphis fabae</i><br/>(APHIFA)<br/><i>Macrosiphum euphorbiae</i><br/>(MACSEU)<br/><i>Myzus persicae</i><br/>(MYZUPE)</p> <p><b>Αλευρώδεις</b><br/><i>Aleurothrixus floccosus</i><br/>(ALTHFL)<br/><i>Dialeurodes citri</i><br/>(DIALCI)</p>  | 0,3-1 | 1 <sup>1</sup> | 30-100 | Με την εμφάνιση της προσβολής | 5/7 |

|   |   |       |                |        |                               |     |
|---|---|-------|----------------|--------|-------------------------------|-----|
|   | <p><b>Ακάρεα</b><br/><i>Tetranychus urticae</i><br/>(TETRUR)</p> <p><b>Θρίπες</b><br/><i>Frankliniella occidentalis</i><br/>(FRANOC)</p> <p><b>Κοκκοειδή</b><br/><i>Pseudococcus viburni</i><br/>(PSECOB)</p> <p><b><i>Parthenolecanium corni</i></b><br/>(LECACO)</p> <p><i>Planococcus ficus</i><br/>(PLANFI)</p> <p><i>Planococcus citri</i><br/>(PSECCI)</p> <p><i>Parlatoria oleae</i><br/>(PARLSP)</p>  |       |                |        |                               |     |
| <b>Γλυκό καλαμπόκι<sup>6</sup></b><br>(ZEAMS) | <p><b>Αφίδες</b><br/><i>Aphis gossypii</i><br/>(APHIGO)</p> <p><i>Aphis fabae</i><br/>(APHIFA)</p> <p><i>Macrosiphum euphorbiae</i><br/>(MACSEU)</p> <p><i>Myzus persicae</i><br/>(MYZUPE)</p> <p><i>Macrosiphum sp.</i><br/>(MACSSP)</p> <p><b>Αλευρώδεις</b><br/><i>Trialeurodes vaporariorum</i><br/>(TRIAVA)</p> <p><i>Bemisia tabaci</i><br/>(BEMITA)</p> <p><b>Ακάρεα</b><br/><i>Tetranychus urticae</i><br/>(TETRUR)</p> <p><b>Θρίπες</b><br/><i>Frankliniella occidentalis</i><br/>(FRANOC)</p> | 0,3-1 | 1 <sup>1</sup> | 30-100 | Με την εμφάνιση της προσβολής | 5/7 |

Παρατηρήσεις:

- 1) Η συνιστώμενη συγκέντρωση σκευάσματος είναι 1 λίτρο/100 λίτρα νερό για όλες τις περιπτώσεις. Σε περίπτωση έντονης προσβολής ή για την αντιμετώπιση ορισμένων εντόμων συστήνεται η

συγκέντρωση των 2 λίτρων/100 λίτρα νερό με μέγιστο όγκος ψεκαστικού διαλύματος 50 λίτρα/στρέμμα.

- 2) Το σκεύασμα θα πρέπει να εφαρμόζεται με ικανοποιητική ποσότητα νερού ώστε να επιτυγχάνεται καλό λούσιμο του οργανισμού-στόχου και της καλλιέργειας. Είναι σημαντικό να γίνεται πλήρης διαβροχή τόσο της πάνω όσο και κάτω πλευράς των φύλλων.
- 3) Εφαρμογές μόνο όταν τα τηγάνια είναι στεγνά.
- 4) Όταν απαιτείται ο όγκος ψεκαστικού υγρού να είναι >100 λίτρα/στρέμμα τότε η συγκέντρωση θα πρέπει να είναι μικρότερη με ελάχιστο 0.4 λίτρο σκευάσματος/100 λίτρα νερό. Σε αυτές τις περιπτώσεις το σκεύασμα εφαρμόζεται μόνο σε προγράμματα ολοκληρωμένης διαχείρισης σε συνδυασμό με άλλες μεθόδους καταπολέμησης.
- 5) Για τις καλλιέργειες αυτές δεν έχει τεκμηριωθεί η έλλειψη φυτοτοξικότητας. Όταν εφαρμόζεται για πρώτη φορά, συνιστάται να γίνεται δοκιμή του προϊόντος σε μικρή έκταση πριν την εφαρμογή του σε ευρεία κλίμακα.
- 6) Για τις καλλιέργειες αυτές δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στην καλλιέργεια από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.

II. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθ. πρωτ. 7987/87425/01-09-2016 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας»**

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

**Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ**