



ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΛΗΨΗ ως προς τον κωδικό των Αγριοραδικιών στο σημείο 13 της 10^{ης} σελίδας από το εσφαλμένο CICIF, στο ορθό 0251030-006, και ως προς τις συνθήκες αποθήκευσης του σκευάσματος στο σημείο 14 της 11^{ης} σελίδας από το εσφαλμένο «σε θερμοκρασίες κάτω των 5°C» στο ορθό «στους 5°C» (15.04.2022)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 12.04.2022
Αριθ. πρωτ: 3336/94757

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Δ. Καραμάνου
Τηλέφωνο: 210 92 87 228
e-mail: dkaramanou@minagric.gr

Προς: **Probelte S.A.U.**, Ισπανίας
(δια του υπεύθυνου επικοινωνίας,
της εταιρείας
Τουτουζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε.
– «**AGRIBIZ**»
Μιχαλακοπούλου 157, 115 27, Αθήνα)
email: info@agribiz.gr

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) BOTRYBEL (δ.ο. *Bacillus amyloliquefaciens* strain AH2 99,3% β/ο)»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον υπ' αρ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) Κανονισμό (ΕΚ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα τα άρθρα 33 & 47 αυτού.
2. Το ν. 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Τον υπ' αρ. 540/2011 Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τον υπ' αρ. 2021/1455 Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) της Επιτροπής της 6ης Σεπτεμβρίου 2021 για την έγκριση της δραστικής ουσίας χαμηλού κινδύνου *Bacillus amyloliquefaciens* στέλεχος **AH2**, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, και για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής.
5. Τον υπ' αρ. 547/2011 Κανονισμό (ΕΕ) της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
6. Τον υπ' αρ. 396/2005 Κανονισμό (ΕΚ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Τον υπ' αρ. 1272/2008 Κανονισμό (ΕΚ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.

8. Τη με αριθμό πρωτ. 1697/51932/25.02.2022 σχετική Έκθεση Αξιολόγησης του ΜΦΙ (ΕΜΠ127/22.02.2022).
9. Το ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
10. Το ν. 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
11. Τη με αριθ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β' 4612/19-10-20).
12. Τις με αρ. πρωτ. 9623/266510/29.09.2021, 11768/323373/17.11.2011, 12187/336949/26.11.2021, 1906/57552/03.03.2022, 2771/80208/24.03.2022 και 3336/94757/07.04.2022 αιτήσεις της εταιρείας Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε. – «ΑΓΡΙΒΙΖ», ως υπεύθυνη επικοινωνίας της εταιρείας Probelte S.A.U., Ισπανίας,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

A Χορηγούμε άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με τα άρθρα **33 και 47** του Κανονισμού 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (**μυκητοκτόνο**) **BOTRYBEL** (**δ.ο. *Bacillus amyloliquefaciens strain AH2 99,3% β/ο***) της εταιρείας **Probelte S.A.U., Ισπανίας**, με τα ακόλουθα στοιχεία:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης:
1.1.β Ημερομηνία λήξης:

61070
12.04.2022
27.09.2037

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

- 1.2.α Εμπορικό όνομα:
1.2.β Μορφή:

BOTRYBEL
Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)

1.3 Δραστική ουσία

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO:

<i>Bacillus amyloliquefaciens strain AH2</i>
--

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

Min 7×10^{10} CFU <i>B. amyloliquefaciens</i> AH2 /L product.
--

Χημική ομάδα:

Μικροβιακό σκεύασμα (Βάκιλος)

Παρασκευαστής της δ.ο. :

Probelte S.A.U. Calle Antonio Belmonte Abellán, 3-5 30100 Murcia, Ισπανία Mr Carlos García Tel +34 968 307 250 Email: carlosgarcia@probelte.com
--

Εργοστάσια παρασκευής της δ.ο.:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:
Probelte S.A.U.
 C/Blanca Nº 9, Polígono Industrial La Polvorista
 30500 Molina de Segura, Murcia, Ισπανία

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας προσδιορίζονται στο με αριθ. πρωτ. 1697/51932/25.02.2022 έγγραφο, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

Probelte S.A.U.
 Calle Antonio Belmonte Abellán, 3-5
 30100 Murcia, Ισπανία
 Mr Carlos García
 Tel +34 968 307 250
 Email: carlosgarcia@probelte.com

α) Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε. "Agribiz"
 Μιχαλακοπούλου 157, 115 27, Αθήνα
 Τηλ.: 210 7471000
 Fax: 210 7471009
 E-mail: info@agribiz.gr

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

ΒΙΟΡΥΛ Α.Ε.,
 28 χλμ. Εθνικής οδού Αθηνών - Λαμίας
 190 14 Αφίδνες, Αττική
 Τηλ: +30 22950 45 100
 Fax: +30 22950 45 250
 Email: ipsychogiou@vioryl.gr

Σε περίπτωση μελλοντικής τροποποίησης της παρούσας άδειας ως προς το εν λόγω σημείο, ο ανωτέρω υπεύθυνος διάθεσης θα έχει και την ευθύνη για τα υπάρχοντα αποθέματα του σκευάσματος που παρήχθησαν ή/και κυκλοφόρησαν στην ελληνική αγορά μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής απόφασης τροποποίησης. Για τις ποσότητες του σκευάσματος που θα παραχθούν και θα κυκλοφορήσουν στην αγορά από την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης τροποποίησης και μετά, την ευθύνη θα φέρει ο νέος υπεύθυνος διάθεσης.

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

Probelte S.A.U.
 Calle Antonio Belmonte Abellán, 3-5
 30100 Murcia, Ισπανία
 Mr Carlos García
 Tel +34 968 307 250
 Email: carlosgarcia@probelte.com

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:
Probelte S.A.U.
 C/ Blanca Nº 9, Polígono Industrial La Polvorista

30-500 Molina de Segura, Murcia, Ισπανία

ε) Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:

Probelte S.A.U.C/ Blanca Nº 9, Polígono Industrial La Polvorista
30-500 Molina de Segura, Murcia, Ισπανία

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστικές ουσίες: *Bacillus amyloliquefaciens* strain AH2 99,3% β/ο (1.0×10^{11} CFU/λίτρο σκευάσματος)
Βοηθητικές ουσίες: 0,7 % β/β

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως αυτή κατατέθηκε με το με αριθ. πρωτ. 1697/51932/25.02.2022 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

2 Συσκευασίες:

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλες	25 mL, 50 mL, 100 mL, 250 mL, 500 mL, 1 L	HDPE COEX (HDPE/ΕΝΟΗ) COEX (HDPE/ PA)
2	Δοχεία	5 L, 10 L, 20 L, 25 L	HDPE, COEX (HDPE/ΕΝΟΗ) COEX (HDPE/ PA)
3	Βαρέλι	200 L, 400 L, 600 L, 800 L, 1000 L	HDPE, COEX (HDPE/ΕΝΟΗ) COEX (HDPE/ PA)

3 Οδηγίες χρήσης:**Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.****Τρόπος εφαρμογής:** Ψεκασμοί καλύψεως φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Ανακινήστε καλά τη φιάλη ή το δοχείο του σκευάσματος. Προσθέστε τη συνιστώμενη ποσότητα του σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση καθ' όλη την διάρκεια της εφαρμογής. Εφαρμόστε αμέσως μετά την προετοιμασία του ψεκαστικού υγρού. Συνεχίζουμε την ανάδευση σε όλη την διάρκεια του ψεκασμού.

Καθαρισμός ψεκαστήρα: Αμέσως μετά την εφαρμογή αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα μέρη του ψεκαστικού με ζεστό νερό και απορρυπαντικό αφαιρώντας όλα τα ορατά υπολείμματα και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Οι φιάλες και τα δοχεία ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα: Δε συνιστάται η συνδυαστικότητα του με άλλα σκευάσματα

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Μυκητοκτόνο σκεύασμα για τον έλεγχο διαφόρων μυκητολογικών ασθενειών σε υπαίθριες και θερμοκηπιακές καλλιέργειες. Το στέλεχος *Bacillus amyloliquefaciens* strain AH2 δρα με τρεις διαφορετικούς τρόπους έναντι των παθογόνων μυκήτων:

- ανταγωνίζεται αποτελεσματικά τα παθογόνα, για το χώρο και τα θρεπτικά συστατικά, μέσω των αποικιών που αναπτύσσει στην επιφάνεια φύλλων του φυτού,
- παράγει και απελευθερώνει λιποπεπτίδια τα οποία αυξάνουν την διαπερατότητα των κυτταρικών μεμβρανών των μυκήτων καταστρέφοντας τους βλαστικούς σωλήνες και το μυκήλιο τους.
- παράγει διάφορες πρωτεάσες οι οποίες είναι ικανές να αποδομήσουν μυκηλιακές κατασκευές στα φύλλα.

5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών
		Κ.εκ / στρέμμα	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα		
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ: Ροδακινιά (PRNPS) Βερικοκιά (PRNAR) Δαμασκηινιά (PRNDO) Κερασιά (PRNAV)	Φαϊά Σήψη (<i>Monilia</i> sp. MONISP)	400-1500	70-100	Προληπτικοί ψεκασμοί όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας, ξεκινώντας από το φούσκωμα των οφθαλμών έως το στάδιο του πλήρους χρωματισμού των καρπών (BBCH 51-85).	4/ 7-10 ημέρες
Αμπέλι (VITVI) (Επιτραπέζιο και Οινοποιήσιμο)	Βοτρύτης (<i>Botrytis cinerea</i>) BOTRCI)	400-1500	50 - 100	Προληπτικοί ψεκασμοί όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας, που ξεκινούν από το στάδιο σχηματισμού σταφυλής μέχρι το μαλάκωμα των ραγών (BBCH 71-85).	2- 3/ 7 ημέρες
Φράουλα (FRAAN) (Υ+Θ)	Βοτρύτης (<i>Botrytis cinerea</i>) BOTRCI)	480-1500	50 - 100	Προληπτικοί ψεκασμοί όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας, ξεκινώντας από την εμφάνιση των πρώτων ταξιανθιών έως ότου οι καρποί αποκτήσουν το τυπικό	2-4/ 7-10 ημέρες

				χρώμα της ποικιλίας (BBCH 51-85).	
Καρποί βόττου (Θ): Βατόμουρα - (RUBFR) Σμέουρα (ερυθρά και κίτρινα) (RUBID), Μύρτιλλα (VACAN, VACCO, VACVG, VACMY) Μύρτιλλα μακρόκαρπα (VACMA) Φραγκοστάφυλα (κόκκινα, μαύρα ή άσπρα) (RIBNI, RIBRU), Φραγκοστάφυλα (κόκκινα, πράσινα, κίτρινα)(RIBUC),	Βοτρύτης <i>(Botrytis cinerea)</i> BOTRCI)	480-1500	50 - 100	Προληπτικοί ψεκασμοί όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας, ξεκινώντας από την εμφάνιση των πρώτων ταξιανθιών έως ότου οι καρποί αποκτήσουν το τυπικό χρώμα της ποικιλίας (BBCH 51-85)	2-4/ 7-10 ημέρες
Βολβώδη Λαχανικά (Υ): Κρεμμύδι (ALLCE) Σκόρδο (ALLSA)	Στεμφύλιο <i>(Stemphylium sp. STEMSP)</i>	400-600	40-50	Προληπτικοί ψεκασμοί όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας ξεκινώντας από την εμφάνιση του 4 ^{ου} πραγματικού φύλλου της καλλιέργειας έως ο βολβός αποκτήσει το τελικό μέγεθος του (BBCH 14-49)	2-3/ 7-10 ημέρες
ΣΟΛΑΝΩΔΗ: (Θ): Τομάτα (LYPES) Μελιτζάνα (SOLME) Πιπεριά (CPSAN)	Βοτρύτης <i>(Botrytis cinerea)</i> BOTRCI)	480-1500	50 - 100	Προληπτικοί ψεκασμοί όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας, ξεκινώντας από την εμφάνιση των πρώτων ταξιανθιών έως ότου το 50% των καρπών να έχει αποκτήσει το τυπικό χρώμα της ποικιλίας (BBCH 51-85)	2-4/ 7-10 ημέρες

<p>ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ με εδώδιμο φλοιό: (Θ):</p> <p>Αγγούρι (CUMSA)</p> <p>Αγγουράκια (CUMSA)</p> <p>Κολοκυθάκι (CUUPE)</p>	<p>Βοτρύτης (<i>Botrytis cinerea</i> BOTRCI)</p>	<p>480-1500</p>	<p>50 - 100</p>	<p>Προληπτικοί ψεκασμοί όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας, ξεκινώντας από την εμφάνιση των πρώτων ταξιανθιών έως ότου το 50% των καρπών να έχει αποκτήσει το τυπικό χρώμα της ποικιλίας (BBCH 51-85)</p>	<p>2-4/ 7-10 ημέρες</p>
<p>Μαρούλι (Υ) (LACSA)</p> <p>Και άλλα σαλατικά (Υ):</p> <p>Σκαρόλες (πικρίδα)/ Πλατύφυλλα Αντίδια (CICEN)</p> <p>Ρόκα (ERUVE)</p> <p>Λυκοτρίβολο (VLLLO)</p> <p>Κάρδαμο και άλλα βλαστάρια και φύτερες (LEPSA)</p> <p>Γαιοκάρδαμο (BARVE)</p> <p>Κόκκινο σινάπι (BRSJU)</p> <p>Καλλιέργειες νεαρών φύλλων (συμπεριλαμβανομένων ειδών κράμβης)</p>	<p>Βοτρύτης (<i>Botrytis cinerea</i>) BOTRCI)</p>	<p>720-1500</p>	<p>50 - 100</p>	<p>Προληπτικοί ψεκασμοί όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας ξεκινώντας από την εμφάνιση του 4^{ου} πραγματικού φύλλου έως ότου η κεφαλή φθάσει στο τυπικό της μέγεθος και μορφή (BBCH 14-49)</p>	<p>3-4/ 7-10 ημέρες</p>
<p>Παρατηρήσεις:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Μην το εφαρμόζετε όταν αναμένεται βροχή ή όταν τα φύλλα της καλλιέργειας είναι ακόμη βρεγμένα. 2. Οι μικρότερες δόσεις να εφαρμόζονται σε χαμηλής πίεσης προσβολή. 3. Η χρήση στα Σμέουρα (RUBID) περιλαμβάνει και τα Μαύρα σμέουρα (RUBOC). 4. Η χρήση στις Σκαρόλες περιλαμβάνει και τα Κιχώριο το ίντυβο (CICIN), Αγγιουράκια (CICIF) και Κοκκινόχρωμο κιχώριο (CICIF). 5. Η χρήση στο Λυκοτρίβολο περιλαμβάνει και τη Βαλεριανέλλα η εριόκαρπος (VLLER). 					

- 6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

Μετά την εφαρμογή του σκευάσματος να μην εφαρμόζονται άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα για το χρονικό διάστημα των **7 ημερών**.

Διαχείριση ανθεκτικότητας:

Το σκεύασμα περιέχει τον μικροοργανισμό *Bacillus amyloliquefaciens* strain AH2. Δεν αναμένεται κίνδυνος ανάπτυξης ανθεκτικότητας λόγω του εύρους των τρόπων δράσης του.

- 7** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:
- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

--

- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν

- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

Όταν έχει στεγνώσει τελείως το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φυτά.

- 8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις εφαρμογής.

- 9** Εικονογράμματα κινδύνου:

--

- 10** Δηλώσεις επικινδυνότητας:

EU401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. Περιέχει *Bacillus amyloliquefaciens* AH2. Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση. .

- 11** Δηλώσεις προφύλαξης:

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.
P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
P501: Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας, γάντια, και μάσκα κατά την ανάμιξη/φόρτωση και εφαρμογή του σκευάσματος.

Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό φοράτε

ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια.

Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα που παρουσιάζουν ανοσοανεπάρκεια ή διατελούν υπό θεραπεία με ανοσοκατασταλτικούς παράγοντες.

SP1: Μη ρυπαίνετε τα νερά με το προϊόν ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα.

12 Πρώτες βοήθειες –
Αντίδοτο

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν ο οφθαλμικός ερεθισμός επιμένει, συμβουλευθείτε / επισκεφθείτε γιατρό.

P333+P313: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Αφαιρέστε τα εμποτισμένα με το ψεκαστικό υγρό ρούχα αμέσως και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: συμβουλευθείτε / επισκεφθείτε γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα από το χώρο της έκθεσης, στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Αν τα συμπτώματα επιμένουν, ζητήστε ιατρική συμβουλή.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή γιατρό/γιατρό εάν αισθάνεστε αδιαθεσία. Μην προκαλέσετε εμετό. Ποτέ μη χορηγείτε οτιδήποτε από το στόμα σε αναίσθητο άτομο.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777

13

Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Καλλιέργειες	Ημέρες
Ροδακινιά (0140030), Βερικοκιά (0140010), Δαμασκηνιά (0140040), Κερασιά (0140020),	
Αμπέλι (0151010, 0151020)	
Φράουλα (0152000) (Υ+Θ)	
Βατόμουρα (0153010) (Θ), Σμέουρα (ερυθρά και κίτρινα) (0153030) (Θ), Μαύρα σμέουρα (0153030-002)(Θ), Μύρτιλλα (0154010) (Θ), Μύρτιλλα μακρόκαρπα (0154020)(Θ), Φραγκοστάφυλα (κόκκινα, μαύρα ή άσπρα) (0154030)(Θ), Φραγκοστάφυλα (κόκκινα, πράσινα, κίτρινα) (0154040) (Θ),	
Κρεμμύδι (0220020) (Υ), Σκόρδο (0220010) (Υ)	
Τομάτα (0231010) (Θ), Μελιτζάνα (0231030) (Θ), Πιπεριά (0231020) (Θ)	0
Αγγούρι (0232010) (Θ), Αγγουράκι (0232020) (Θ), Κολοκύθι (0232030) (Θ),	
Μαρούλι (0251020) (Υ), Σκαρόλες (πικρίδα)/ Πλατύφυλλα Αντίδια (0251030) (Υ) , Κοκκινόχρωμο κιχώριο (0251030-004) Ραδίκι / Κιχώριο το ίντυβο (0251030-003) (Υ), Αγριοράδικα (0251030-006) Ρόκα (0251060) (Υ), Λυκοτρίβολο (0251010) (Υ), Βαλεριανέλλα η Εριόκαρπος (0251010-001) (Υ), Κάρδαμο και άλλα βλαστάρια και φύτερες (0251040) (Υ), Γαιοκάρδαμο (0251050) (Υ), Κόκκινο σινάπι (0251070) (Υ), Καλλιέργειες νεαρών φύλλων (συμπεριλαμβανομένων ειδών κράμβης) (0251080) (Υ)	

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Διατηρείται στην αρχική απαραβίαστη συσκευασία του, στους 5°C. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

15 Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

16 Κατάλογος προστατευομένων μελετών

Στο **Παράρτημα III** καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων

B Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει τη ΣΕΑ για οποιοδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στη ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα απόφαση και θα πρέπει να προσκομιστεί εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της παρούσης.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στη ΣΕΑ τελική ετικέτα, μόνο ηλεκτρονικά, πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στη ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ