

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 14.04.2022
Αριθ. πρωτ: 1078/33704

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
FAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Ν. Αβραμίδης
Τηλέφωνο: 210 92 87 224
e-mail: navramidis@minagric.gr

Προς: FMC ΧΗΜΙΚΑ ΕΛΛΑΣ Μ.ΕΠΕ
Λ. Συγγρού 348
Τ.Κ. 176 74 Καλλιθέα
e-mail: kornilia.mitsopoulou@fmc.com

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθμό 14786 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) ΜΟJΑΝΤΕ 96,8 EC (δ.ο. paraffin oil 96,8 % β/β), ως προς τα στοιχεία στον κάτοχο και υπεύθυνο επικοινωνίας καθώς επίσης και στο φάσμα δράσης του σκευάσματος».

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 45 αυτού.
2. Το ν. 4036/2012 (Α'8/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 540/2011 της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών, στον οποίο έχει συμπεριληφθεί η δραστική ουσία **paraffin oil**.
4. Τον κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 546/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
6. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
7. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 2015/1608 της Επιτροπής της 24ης Σεπτεμβρίου 2015 για την τροποποίηση παραρτήματος IV του κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για το καπρινικό οξύ, το παραφινέλαιο (CAS 64742-46-7), το παραφινέλαιο (CAS 72623-86-0), το παραφινέλαιο (CAS 8042-47-5), το παραφινέλαιο (CAS 97862-82-3), τη θειική άσβεστο και την ουρία μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα.
8. Το με αριθμό πρωτ. 12862/330936/07.12.2020 «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά» έγγραφο της Υπηρεσίας.
9. Το ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α'45).

10. Το ν. 4622/2019 (Α'133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
11. Τη με αριθ. 1881/286212/13.10.2020 Απόφαση Υπουργού “Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση” (Β'4612/19.10.20).
12. Τη με αριθμό πρωτ. 1078/33704/08.02.2022 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- Ι. Τροποποιούμε τη με αριθμό 14786 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) ΜΟJΑΝΤΕ 96,8 ΕC (δ.ο. paraffin oil 96,8 % β/β), που χορηγήθηκε με την αριθμό πρωτ. 12086/334341/24.11.2021 απόφασή μας, ως προς τα στοιχεία στον κάτοχο και υπεύθυνο επικοινωνίας καθώς επίσης και στο φάσμα δράσης του σκευάσματος.

Τα σημεία **1.4α)**, **1.4β)** και **5** διαμορφώνονται ως εξής:

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

FMC ΧΗΜΙΚΑ ΕΛΛΑΣ Μ.ΕΠΕ
Λ. Συγγρού 348, 176 74 Καλλιθέα
Τηλ.: 211 198 3903
Fax: +30 211113 8614
e-mail: kornilia.mitsopoulou@fmc.com

α) Υπεύθυνος επικοινωνίας:

FMC ΧΗΜΙΚΑ ΕΛΛΑΣ Μ.ΕΠΕ
Λ. Συγγρού 348, 176 74 Καλλιθέα
Τηλ.: 211 198 3903
Fax: +30 211113 8614
e-mail: kornilia.mitsopoulou@fmc.com

5 Φάσμα δράσης:

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες
		κ.εκ./στρ.	κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/ στρ.		
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ Γκρέιπ φρούτ CIDPA	Κόκκινη ψώρα <i>Aonidiella aurantii</i>	2000-4500	1000-1500	200-300	Πριν την αλλαγή του χρωματισμού των καρπών έως το στάδιο όπου τα φρούτα έχουν αποκτήσει το 90% του τελικού τους μεγέθους. (BBCH 79)	1-2/10
Λεμονιά CIDLI	Ψευδόκοκκος <i>Planococcus citri</i>					
Μανταρινιά CIDRE	- PSECCI, Λεκάριο <i>Saissetia oleae</i>					
Πορτοκαλιά CIDSΙ	- SAISOL, Άσπρη ψώρα <i>Aspidiotus nerii</i>					
Φράπτα CIDGR	- ASPDNE, Μαύρη ψώρα <i>Parlatoria zizyphi</i>					
	Άλλα κοκκοειδή <i>Chrysomphalus</i>					

	<i>dictyospermi</i> - CHRYDI, <i>Pericerya purchasi</i> - ICERPU, <i>Ceroplastes rusci</i> - CERPRU, <i>C. sinensis</i> - CERPSI, <i>Mytilococcus</i> <i>beckii</i> - LEPSBE, <i>Coccus</i> <i>hesperidum</i> - COCCHE, Αλευρώδης <i>Dialeurodes citri</i> - DIALCI, <i>Aleurothrixus</i> <i>floccosus</i> - ALTHFL					
ΜΗΛΟΕΙΔΗ Μηλιά MABSD Αχλαδιά PYUSS	Ψώρα Σαν Ζοζέ <i>Quadraspidiotus</i> <i>perniciosus</i> - QUADPE, Παρλατόρια <i>Parlatoria oleae</i> - PARLOL, Βαμβακάδα <i>Pseudaulacaspis</i> <i>pentagona</i> - PSEAPE, Μυτιλόμορφη ψώρα <i>Lepidosaphes ulmi</i> - LEPSUL, Σταχτιά ψώρα <i>Epidiaspis leperii</i> - EPIDBE, Ακάρεα (<i>Tetranychus</i> <i>urticae</i> - TETRUR, <i>Panonychus ulmi</i> - METTUL, <i>Bryobia</i> <i>rubrioculus</i> - BRYORU), Αφίδες (<i>Eriosoma</i> <i>lanigerum</i> - ERISLA, <i>Aphis pomi</i> - APHIPO, <i>Dysaphis pyri</i> - DYSAPY, <i>D. plantaginea</i> - DYSAPL)	600-1000	750-1000	80-100	Ψεκασμοί μέχρι την άνθηση (πριν το άνοιγμα των λουλουδιών). (BBCH 59)	1
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ Βερικοκιά	Ψώρα Σαν Ζοζέ <i>Quadraspidiotus</i> <i>perniciosus</i>	600-1000	750-1000	80-100	Ψεκασμοί μέχρι την άνθηση	1

<p>PRNAR</p> <p>Κερασιά PRNCE</p> <p>Ροδακινιά PRNPS</p> <p>Δαμασκηνιά PRNSS</p>	<p>- QUADPE, Βαμβακάδα <i>Pseudaulacaspis pentagona</i></p> <p>- PSEAPE, Σφαιρολεκάνιο <i>Sphaerolecanium prunastri</i></p> <p>- LECAPN, Παρλατόρια <i>Parlatoria oleae</i></p> <p>- PARLOL, Μυτιλόμορφη ψώρα <i>Lepidosaphes ulmi</i> - LEPSUL,</p> <p>Αφίδες <i>Myzus persicae</i></p> <p>- MYZUPE, <i>Aphis sp.</i> - APHISP, Ακάρεια <i>Tetranychus sp.</i></p> <p>- TETRSP, <i>Bryobia praetiosa</i></p> <p>- BRYOPR, <i>Aculus sp.</i></p> <p>- ACULSP</p>				<p>(πριν το άνοιγμα των λουλουδιών). (BBCH 59)</p>	
<p>Μπανάνα MUBPA</p>	<p><i>Aonidiella aurantii</i></p> <p>- AONDAU, Ψευδόκοκκος <i>Planococcus citri</i></p> <p>- PSECCI, Λεκάνιο <i>Saissetia oleae</i></p> <p>- SAISOL, Άσπρη ψώρα <i>Aspidiotus nerii</i></p> <p>- ASPDNE, Μαύρη ψώρα <i>Parlatoria zizyphi</i></p> <p>- PARLZI, Άλλα κοκκοειδή <i>Chrysomphalus dictyospermi</i> – CHRYDI, <i>Pericerya purchasi</i></p> <p>- ICERPU, <i>Ceroplastes ruscii</i></p> <p>- CERPRU, <i>C. sinensis</i> - CERPSI, <i>Mytilococcus beckii</i></p> <p>- LEPSBE, <i>Coccus hesperidum</i></p>	<p>800-1500</p>	<p>1000-1500</p>	<p>150-300</p>	<p>Πριν την αλλαγή του χρωματισμού των καρπών έως το στάδιο όπου τα φρούτα έχουν αποκτήσει το 90% του τελικού τους μεγέθους (BBCH 79)</p>	<p>1</p>

	- COCCHE, Αλευρώδης <i>Dialeurodes citri</i> - DIALCI, <i>Aleurothrixus</i> <i>floccosus</i> - ALTHFL					
--	---	--	--	--	--	--

Παρατηρήσεις:

1. Το εύρος των δόσεων εξαρτάται από την ένταση της προσβολής.
2. Κατά τη χρήση του σκευάσματος τα δένδρα πρέπει να είναι ποτισμένα. Ποτίζουμε μία εβδομάδα πριν από τον ψεκασμό.
3. Οι εφαρμογές είναι πιο αποτελεσματικές όταν γίνονται κατά τη διάρκεια των σταδίων διαχείμασης των εντόμων και των αυγών.

6 Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Διαχείριση ανθεκτικότητας

Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική paraffin oil, η οποία δεν έχει εξειδικευμένο τρόπο δράσης. Δεν αναμένεται ανάπτυξη ανθεκτικότητας.

1. Αποφεύγετε τον ψεκασμό όταν τα φυτά είναι μισομαραμένα και σε περιόδους έντονης ξηρασίας.
2. Να μη γίνεται εφαρμογή με το σκεύασμα όταν η θερμοκρασία ξεπερνάει τους 32°C, γιατί μπορεί να εμφανιστούν προβλήματα φυτοτοξικότητας.
3. Να μην γίνονται ψεκασμοί όταν υπάρχει παγετός ή κίνδυνος παγετού, καθώς και σε περιόδους ξηρασίας και υπερβολικής υγρασίας.
4. Να μη γίνεται εφαρμογή με το σκεύασμα επί 40 ημέρες πριν ή μετά την εφαρμογή θείου ή θειασβεστίου.
5. Στα μηλοειδή και ειδικά στο κρυστάλλι να μην προηγείται ή έπεται εφαρμογή Cartan, Folpet, δινιτροενώσεων, σε διάστημα τουλάχιστον 1 εβδομάδας.

II. Ετικέτα σκευάσματος:

- Η ετικέτα του σκευάσματος να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
- Για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, επιτρέπεται η τοποθέτηση στις συσκευασίες του σκευάσματος της μέχρι σήμερα ισχύουσας ετικέτας.
- Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις συσκευασίες του σκευάσματος θα τοποθετείται υποχρεωτικά η νέα τροποποιημένη ετικέτα.

III. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθ. πρωτ. 12086/334341/24.11.2021 απόφασή μας.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ