



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 27.01.2021
Αριθ. πρωτ: 352/10588

Ταχ. Δ/νση:	Λ. Συγγρού 150	Προς:	BASF ΕΛΛΑΣ Μονοπρόσωπη Α.Β.Ε.Ε.
Ταχ. Κώδικας:	176 71 - ΑΘΗΝΑ		Παραδείσου 2 & Λ. Κηφισίας,
Πληροφορίες:	Κ. Μητσοπούλου		151 25 Μαρούσι
Τηλέφωνο:	210 9287165		
e-mail:	kmitsopoulou@minagric.gr	e-mail:	dimitris.theodosiou@basf.com

ΘΕΜΑ: Διεύρυνση της με αριθμό 61005 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) CONAN 20 WG (pyraclostrobin 20% β/β) ως προς την κατηγορία και τον τρόπο δράσης, το φάσμα δράσης (διεύρυνση σε ήσσοнос σημασίας χρήσεις), τις δηλώσεις προφύλαξης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 51 αυτού.
2. Το ν. 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
4. Τη με αριθμό 10088/115732/26-9-2013 απόφαση (ΦΕΚ Β'/2587) σχετικά με την «Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσοнос σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσοнос σημασίας».
5. Τη με αριθ. πρωτ. 13915/355092π.ε./21.01.2021 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 61005 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) CONAN 20 WG (pyraclostrobin 20% β/β).
6. Τη με αριθ. πρωτ. 38/504/03.01.2017 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 60587 άδεια διάθεσης στην αγορά του πανομοιότυπου φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) INSIGNIA 20 WG (pyraclostrobin 20% β/β), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
7. Το ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α' 45).
8. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α' 133) "Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης" και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.

9. Τη με αριθ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού “Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση” (Β’4612/19.10.2020).
10. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 352/10588/13.01.2021 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

A Διευρύνουμε την με αριθμό 61005 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) CONAN 20 WG (pyraclostrobin 20% β/β), που χορηγήθηκε με την Υπ. Αριθ. 13915/355092π.ε./21.01.2021 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως προς την κατηγορία και τον τρόπο δράσης, το φάσμα δράσης (διεύρυνση σε ήσσονος σημασίας χρήσεις), τις δηλώσεις προφύλαξης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Συγκεκριμένα τα σημεία 4, 5, 11 και 13 διαμορφώνονται ως εξής:

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση κατά των ασθενειών που προσβάλλουν την ελιά, τα εσπεριδοειδή, **τα πυρηνόκαρπα και το λωτό**. Περιέχει pyraclostrobin που ανήκει στη χημική ομάδα των μεθόξυ-καρβαμιδικών και παρεμποδίζει την κυτταρική αναπνοή στη θέση Qo του συμπλόκου III της αναπνευστικής αλυσίδας, εμφανίζοντας αποπλαστική και διελασματική κίνηση.

5 Φάσμα δράσης						
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα (σε ημέρες)
		γραμ./στρ.	γραμ./100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ.		
Ελιά (επιτραπέζια) (OLVEU)	Κυκλοκόνιο <i>Spilocaea oleagina</i> (CYCLOL) Γλοιοσπόριο <i>Colletotrichum sp.</i> (COLLSP)	50	33,3-50	100-150	Σε ανοιξιάτικες εφαρμογές, κάνετε 1-2 εφαρμογές, μέχρι οι καρποί να αποκτήσουν το 10% του τελικού τους μεγέθους (BBCH 15-71) Σε φθινοπωρινές εφαρμογές: κάνετε 1 εφαρμογή μετά τη συγκομιδή (BBCH 89)	3/ 21

Ελιά (ελαιοποιήσιμη) (OLVEU)	Κυκλοκόνιο <i>Spilocaea oleagina</i> (CYCLOL) Γλοιοσπόριο <i>Colletotrichum sp.</i> (COLLSP)	50	33,3-50	100-150	Σε ανοιξιάτικες εφαρμογές, κάνετε 1-2 εφαρμογές, μέχρι οι καρποί να αποκτήσουν το 10% του τελικού τους μεγέθους (BBCH 15-71)	2/ 21
Πορτοκαλιά (CIDSΙ) Μανταρινιά (CIDRE)	Αλτερνάρια <i>Alternaria sp.</i> (ALTESP)	112,5	37,5-75	150-300	Από την αρχή της έντονης βλάστησης μέχρι και την αρχή της ωρίμανσης των καρπών (BBCH 31-85)	4/ 14
Ροδακινιά (PRNPS) Βερικοκιά (PRNAR) Κερασιά (PRNAV) Δαμασκηνιά (PRNDO) (χρήσεις ήσσονος σημασίας)	Κλαδοσπορίωση <i>Cladosporium carrophilum*</i> (VENTCA)	25	16,5-25	100-150	Από την έναρξη ανάπτυξης των καρπών έως την αρχή της ωρίμανσης των καρπών (BBCH 71-85)	2/ 14
Λωτός* (DOSKA) (χρήση ήσσονος σημασίας)	Μυκοσφαιρέλα <i>Mycosphaerella nawae</i> (MYCONA)	50	25-50	100-200	Από την εμφάνιση των φύλλων έως το τέλος της άνθησης (BBCH 10-69)	2/ 15

Παρατηρήσεις:

- ΠΡΟΣΟΧΗ: Η μεγάλη δόση στο εκατόλιτρο να εφαρμόζεται με το χαμηλό όγκο ψεκαστικού υγρού και αντίστροφα. Πρέπει πάντα να τηρείτε και να μην υπερβαίνετε τη μέγιστη δόση ανά στρέμμα.

*«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες της ροδακινιάς, της βερικοκιάς, της κερασιάς, της δαμασκηνιάς και του λωτού από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα από τη χρήση του σκευάσματος»

11

Δηλώσεις
Προφυλαξης

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.

P261: Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη.

P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια.

«Φοράτε γάντια κατά την ανάμιξη/ φόρτωση και κατά την συντήρηση του ψεκαστικού μηχανήματος.

Φοράτε ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία και γάντια κατά τη διάρκεια της

εφαρμογής»

«Σε περίπτωση επανεισόδου μετά τον ψεκάσμο οι εργάτες πρέπει να φοράνε ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία και γάντια»

P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

SP1: Μη ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. (Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η μόλυνση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους).

SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια αφέκαστη ζώνη προστασίας

- 10 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα για την καλλιέργεια της ελιάς και του λωτού και
- 15 μέτρων για την καλλιέργεια της πορτοκαλιάς, της μανταρινιάς, της ροδακινιάς, της βερικοκιάς, της κερασιάς και της δαμασκηνιάς

13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Ελιά (επιτραπέζια, ελαιοποιήσιμη)	105
Πορτοκαλιά, Μανταρινιά	7
Λωτός	100
Ροδακινιά, Κερασιά, Βερικοκιά, Δαμασκηνιά	14

B Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό πρωτ. 13915/355092π.ε./21.01.2021 Απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ