



## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 02.02.2021  
Αριθ. πρωτ: 720/23338

|               |                          |         |  |
|---------------|--------------------------|---------|--|
| Ταχ. Δ/ση:    | Λ. Συγγρού 150           | Προς:   | <b>BASF ΕΛΛΑΣ Μονοπρόσωπη Α.Β.Ε.Ε.</b> |
| Ταχ. Κώδικας: | 176 71 - ΑΘΗΝΑ           |         | Παραδείσου 2 & Λ. Κηφισίας,            |
| Πληροφορίες:  | Κ. Μητσοπούλου           |         | 151 25 Μαρούσι                         |
| Τηλέφωνο:     | 210 9287165              |         |  |
| e-mail:       | kmitsopoulou@minagric.gr | e-mail: | dimitris.theodosiou@basf.com           |

**ΘΕΜΑ:** Διεύρυνση της με αριθμό 61004 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) ORDEXO ACTIVE 30 SC (fluxarygoxad 30% β/ο) ως προς την κατηγορία και τον τρόπο δράσης, το φάσμα δράσης (διεύρυνση σε ήσσονος σημασίας χρήσεις), τις ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

## ΑΠΟΦΑΣΗ

## Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 51 αυτού.
2. Το ν. 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
4. Τη με αριθμό 10088/115732/26-9-2013 απόφαση (ΦΕΚ Β'/2587) σχετικά με την «Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσονος σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσονος σημασίας».
5. Τη με αριθ. πρωτ. 14040/358167 π.ε./15.01.2021 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 61004 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) ORDEXO ACTIVE 30 SC (fluxarygoxad 30% β/ο).
6. Τη με αριθ. πρωτ. 7933/76610/13.07.2017 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 60636 άδεια διάθεσης στην αγορά του πανομοιότυπου του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) SERCADIS 30 SC (fluxarygoxad 30% β/ο), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
7. Το ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α' 45).

8. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α' 133) "Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης" και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
9. Τη με αριθ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β' 4612/19.10.2020).
10. Την υπ' αριθ. πρωτ. 720/23338/26.01.2021 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

**A** Διευρύνουμε την με αριθμό 61004 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) ORDEXO ACTIVE 30 SC (flucarγοχad 30% β/ο), που χορηγήθηκε με την Υπ. Αριθ. 14040/358167 π.ε./15.01.2021 απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως προς την κατηγορία και τον τρόπο δράσης, το φάσμα δράσης (διεύρυνση σε ήσσονος σημασίας χρήσεις), τις ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Συγκεκριμένα τα σημεία 4, 5, 6 και 13 διαμορφώνονται ως εξής:

**4** Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Μυκητοκτόνο για την αντιμετώπιση μυκητολογικών ασθενειών σε αμπέλι, μηλοειδή, πυρηνόκαρπα, **ακρόδρυα** και πατάτα με προστατευτική και θεραπευτική δράση και μεγάλης διάρκειας αποτελεσματικότητα. Το flucarγοχad ανήκει στην ομάδα των καρβοξαμιδικών μυκητοκτόνων και δρα σε βιοχημικό επίπεδο ως παρεμποδιστής της αναπνευστικής αλυσίδας στο σύμπλοκο II (παρεμποδιστής του ενζυμικού συμπλόκου της αφυδρογονάσης του ηλεκτρικού οξέος - SDHI). Παρεμποδίζει την βλάστηση των σπορίων, την επιμήκυνση του βλαστικού σωλήνα, την ανάπτυξη του μυκηλίου και τη σποριογένεση.

| 5 Φάσμα δράσης  |  |                    |                               |  |  |
|---|--|--------------------|-------------------------------|--|--|
| Πεδίο Εφαρμογής                                       | Στόχος   | Δόσεις σκευάσματος |                               | Τρόπος και χρόνος εφαρμογής  | Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο |
|   |  | κ.εκ./στρ.         | Όγκος ψεκ. υγρού λιτρα / στρ. |  |  |
| Αμπέλι<br>VITVI<br>(Επιτραπέζιο Οινοποιήσιμο Σταφίδα) | Ωίδιο<br>( <i>Erysiphe necator-UNCINE</i> )  | 15                 | 20-120                        | Εφαρμογές από το στάδιο έκπτυξης των φύλλων και έως ότου οι ράγες αποκτήσουν το τυπικό για την ποικιλία χρώμα.<br>(BBCH 11-83) | 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10-21 ημέρες             |
| Μηλιά<br>MABSD<br><br>Αχλαδιά<br>PYUCO                | Φουζικλάδιο<br>( <i>Venturia inaequalis-VENTIN, Venturia pyrina-VENTPI</i> )<br><br>Στεμφύλιο<br>( <i>Stemphylium sp.-</i> | 25-30              | 20-120                        | Εφαρμογές από το στάδιο της πράσινης κορυφής έως την αρχή της ωρίμανσης των καρπών<br>(BBCH 53-81)                             | 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-10 ημέρες              |

|   |   |  |   |   |  |
|---|---|--|---|---|--|
|   | STEMSP)   |  |   |   |  |
|   | Ωίδιο<br>( <i>Podosphaera leucotricha</i> -PODOLE)  | 15   | 20-120  | Εφαρμογές από το στάδιο της πράσινης κορυφής έως την αρχή της ωρίμανσης των καρπών (BBCH 53-81)                       | 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10-14 ημέρες |
| Ροδακινιά<br>PRNPS<br><br>Βερικοκιά<br>PRNAR  | Ωίδιο<br>( <i>Sphaerotheca pannosa</i> - SPHRPA)  | 15   | 50-150  | Εφαρμογές από το φούσκωμα των ανθοφόρων οφθαλμών έως και την πλήρη ωρίμανση των καρπών. (BBCH 51-85)                  | 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10-14 ημέρες |
| Πατάτα<br>SOLTU<br>(κόνδυλοι για φύτευση)   | Ριζοκτόνια<br>( <i>Rhizoctonia solani</i> - RHIZSO)   | 20 κ.εκ./<br>100 κιλά<br>πατατό-<br>σπορου | Αδιάλυτο ή<br>έως 1 λίτρο<br>ψεκαστι-<br>κού<br>διαλύμα-<br>τος/ 1000<br>κιλά<br>κονδύλων | Εφαρμογή απ' ευθείας στον πατατόσπορο πριν τη φύτευση με εξαιρετικά μικρού όγκου ψεκασμό (ULV) <sup>1</sup> (BBCH 00) | 1 εφαρμογή                               |
| Αμυγδαλιά*<br>PRNDU<br>(χρήση ήσσονος σημασίας)   | Φαιά σήψη<br>( <i>Monilinia laxa</i> -<br>MONILA,<br><i>Monilinia fructicola</i> -<br>MONIFC) | 30   | 100-120   | Εφαρμογές από την άνθηση και μέχρι την ωρίμανση των καρπών (BBCH 60-85)   | 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-14 ημέρες  |
| Φιστικιά*<br>PIAVE<br>(χρήση ήσσονος σημασίας)  | Καμαροσπόριο<br>( <i>Botryosphaeria dothidea</i> -<br>BOTSDO)                                 | 30   | 100-120   | Εφαρμογές από την άνθηση και μέχρι την ωρίμανση των καρπών (BBCH 60-85)   | 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-14 ημέρες  |
| <p>Παρατηρήσεις:</p> <p><sup>1</sup>Ο ψεκασμός αυτός πραγματοποιείται πάνω σε ραουλόδρομο (τροχιόδρομος κύλισης) με θάλαμο ψεκασμού, τύπου MAFEX.</p> <p>*Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες Αμυγδαλιάς και Φιστικιάς από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις ήσσονος σημασίας, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος. Η χρήση του σκευάσματος στις καλλιέργειες αυτές γίνεται με ευθύνη του χρήστη.</p> |   |  |   |   |  |

**6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Το σκεύασμα είναι άχρωμο. Κατά τη χρήση του πριν τη φύτευση, ο χρήστης πρέπει υποχρεωτικά να εξασφαλίσει ότι κανένας κόνδυλος που έχει ψεκαστεί με το σκεύασμα δεν υπάρχει περίπτωση να βρεθεί κατά λάθος προς κατανάλωση. Οι επενδεδυμένοι κόνδυλοι, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για ζωοτροφή.

Η εφαρμογή σε πατατόσπορο να πραγματοποιείται:

- μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο.
- κατά προτίμηση λίγο πριν τη φύτευση και χωρίς να υπερβεί το στάδιο των λευκών φύτρων. Η διαδικασία του ψεκασμού που χρησιμοποιείται πρέπει να επιτρέπει καλή διανομή του προϊόντος στο σύνολο των καθαρών κονδύλων.

Διαχείριση ανθεκτικότητας:

Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική ουσία fluxarygoxad που ανήκει στην ομάδα 7 κατά FRAC.

Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας συνιστάται:

- Η εναλλαγή με μυκητοκτόνα που δεν ανήκουν σε αυτή την ομάδα.
- **Στη Φιστικιά και την Αμυγδαλιά να μην εφαρμόζεται το σκεύασμα σε περισσότερες από 2 συνεχόμενες εφαρμογές.**

**13** Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

| Φυτικά προϊόντα            | Ημέρες                                 |
|----------------------------|--|
| Αμπέλι, Μηλιά, Αχλαδιά     | 35                                     |
| Ροδακινιά, Βερικοκιά       | 21                                     |
| Πατάτα                     | Δεν ορίζεται λόγω του χρόνου εφαρμογής |
| <b>Αμυγδαλιά, Φιστικιά</b> | <b>14</b>                              |

**B** Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό πρωτ. 14040/358167 π.ε./15.01.2021 Απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας»  
**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

**Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ**