

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 30.03.2021  
Αριθ. πρωτ: 3053/87376

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
FAX: 210 92 12 090  
Πληροφορίες: Ν. Αβραμίδης  
Τηλέφωνο: 210 92 87 224  
e-mail: [navramidis@minagric.gr](mailto:navramidis@minagric.gr)

Προς: Spiess-Urania Chemicals GmbH  
(Δια του υπευθύνου επικοινωνίας,  
της εταιρείας  
MedPest Consultancy Office  
25ης Μαρτίου 29 Τ.Θ.763, 19009,  
Ντράφι-Πικέρμι  
e-mail: [Kmarkakis@medpest.gr](mailto:Kmarkakis@medpest.gr))

**ΘΕΜΑ:** «Τροποποίηση της με αριθμό 60840 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) CUPROZIN 35 WP (δ.ο. copper oxychloride σε Cu 35% β/β), ως προς το φάσμα δράσης, τα στοιχεία στις ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί και την προστασία των καταναλωτών καθώς επίσης και την κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών».

**ΑΠΟΦΑΣΗ**  
**Ο**  
**ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 44 αυτού.
2. Το ν. 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 546/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
5. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1907/2006.
6. Το με αριθμό πρωτ. 12862/330936/07.12.2020 «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά» έγγραφο της Υπηρεσίας.
7. Το ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α' 45).
8. Το ν. 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.

2

9. Την με αριθ. 1881/286212/13.10.2020 Απόφαση Υπουργού “Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση” (Β’ 4612/19.10.20).
10. Τη με αριθμό πρωτ. 1993/58317/26.02.2021 αίτηση της εταιρείας της εταιρείας MedPest Consultancy Office, ως υπεύθυνου επικοινωνίας της εταιρείας Spiess-Urania Chemicals GmbH, Γερμανίας.

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Τροποποιούμε τη με αριθμό 60840 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) CUPROZIN 35 WP (δ.ο. copper oxychloride σε Cu 35% β/β), που χορηγήθηκε με την αριθμό πρωτ. 1964/32662/14.03.2019 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς φάσμα δράσης, τα στοιχεία στις ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί και την προστασία των καταναλωτών καθώς επίσης και την κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών.

Το σημείο **17 απαλείφεται** ενώ τα σημεία **5, 6** και **15** του σκεύασματος διαμορφώνονται ως εξής:

<b>5</b> Φάσμα δράσης						
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/μεσοδιάστημα εφαρμογών.
		Γραμ./100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ.	Γραμ./στρ		
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ: Γκρέιπ φρουτ CIDPA, Λεμονιά CIDLI, Πορτοκαλιά CIDSΙ, Μανταρινιά CIDRE, Νεραντζιά CIDAU	Φυτόφθορα καρπών ( <i>Phytophthora sp.</i> - PHYTSP)	280	100	280	Μια εφαρμογή το φθινόπωρο. Συνιστάται να ψεκάζονται τα χαμηλά κλαδιά μέχρι 1,5 μ. από το έδαφος. (BBCH 15-89)	1
ΜΗΛΟΕΙΔΗ: Μηλιά MABSD Αχλαδιά (εκτός των ποικιλιών «Κρυστάλλι» και «Κοντούλα») PYUCO	Φουζικλάδιο ( <i>Venturia inaequalis</i> - VENTIN, <i>V. pirina</i> - VENTPI)	140-220	85-100	140-220	Μια εφαρμογή το φθινόπωρο-χειμώνα στην πτώση των φύλλων ή την άνοιξη πριν την άνθιση. (< BBCH 59)	1
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ: Ροδακινιά PRNPS, Βερικοκιά PRNAR, Κερασιά PRNAV, Δαμασκηνιά PRNDO	Εξώασκος ( <i>Taphrina deformans</i> - TAPHDE)	150-357	100	150-357	Μια εφαρμογή από το λήθαργο έως το τέλος της διόγκωσης των οφθαλμών. (BBCH 00-03)	1

ΑΜΠΕΛΙ (οινοποιήσιμα και επιτραπέζια σταφύλια εκτός των ποικιλιών, «Σουλτανίνας» και «Κορινθιακής σταφίδας») VITVI	Περονόσπορος ( <i>Plasmopara viticola</i> - PLASVI)	220-300	100	220-300	Προληπτικές εφαρμογές εφόσον οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας. Για τα επιτραπέζια σταφύλια έως το δέσιμο των καρπών. (BBCH <71) Για τα οινοποιήσιμα σταφύλια έως την ωρίμανση. (BBCH <85)	3/7
ΕΛΙΑ OLVEU	Κυκλοκόνιο ( <i>Cyloconium oleaginum</i> - CYCLOL)	220-300	100	220-300	Μια εφαρμογή από αρχές φθινοπώρου μέχρι αρχές άνοιξης. (BBCH 10-85)	1
Τομάτα (Υ) LYPES Μελιτζάνα (Υ) SOLME	Φυτόφθορα ( <i>Phytophthora infestans</i> - PHYTIN)	--	80	170-200	Προληπτικές εφαρμογές εφόσον οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας. (BBCH 15-89)	5/5
Πατάτα SOLTU	Φυτόφθορα ( <i>Phytophthora sp.</i> - PHYTSP)	--	60	170-285	Εφαρμογές που ξεκινάνε όταν τα φυτά έχουν ύψος 15-20 εκ. και επανάληψη ανά 6 ημέρες ανάλογα με την ένταση της προσβολής. (BBCH 15-85)	4/6
<p>Παρατηρήσεις:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Οι εφαρμογές είναι προληπτικές και γίνονται εφόσον οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών.</li> <li>- Οι μικρές δόσεις αφορούν τους ψεκασμούς που πλησιάζουν προς την άνθηση και οι μεγάλες όταν οι καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη των ασθενειών.</li> <li>- Στα λαχανικά να αποφεύγονται οι ψεκασμοί με υψηλές θερμοκρασίες και κατά τις θερμές ώρες της ημέρας.</li> <li>- Η συνολική εφαρμοζόμενη ποσότητα χαλκούχων σκευασμάτων ανά καλλιεργητική περίοδο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 400 γραμ. ανά στρέμμα (ποσότητα εκφρασμένη σε μεταλλικό χαλκό).</li> <li>- Να ακολουθούνται στις περιοχές που εφαρμόζονται, τα προγράμματα των Γεωργικών προειδοποιήσεων.</li> <li>- Η χρήση του σκευάσματος μπορεί να ενταχθεί σε προγράμματα ολοκληρωμένης καταπολέμησης.</li> </ul>						

- 6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

**Διαχείριση ανθεκτικότητας.**

Το σκεύασμα περιέχει copper oxychloride που ανήκει στην ομάδα M01 κατά FRAC.

Επειδή δρα σε πολλαπλά σημεία (multi-site activities) είναι ένα σημαντικό προϊόν σε στρατηγικές διαχείρισης ανθεκτικότητας μέσα σε προγράμματα ορθής γεωργικής πρακτικής. Παρόλα αυτά συνιστάται η εναλλαγή με μυκητοκτόνα που δεν ανήκουν σε αυτή την ομάδα προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας.

Να μην εφαρμόζεται στις ποικιλίες αχλαδιάς, «Κρυστάλλι» και «Κοντούλα».

Να μην εφαρμόζεται στις ποικιλίες αμπέλου, «Σουλτανίνας» και «Κορινθιακής σταφίδας».

**13 Προστασία των καταναλωτών**

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Γκρέϊπ φρουτ, Λεμονιά, Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Νεραντζιά	14
Μηλιά, Αχλαδιά (εκτός των ποικιλιών «Κρυστάλλι» και «Κοντούλα»)	Καθορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του σκευάσματος (πριν την άνθηση BBCH 59)
Ροδακινιά, Βερικοκιά, Κερασιά, Δαμασκηνιά	Καθορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του σκευάσματος (στο τέλος τη διόγκωση των οφθαλμών BBCH 03)
Αμπέλι (οινοποιήσιμα και επιτραπέζια σταφύλια εκτός των ποικιλιών, «Σουλτανίνας» και «Κορινθιακής σταφίδας»)	21
Ελιά	14
Τομάτα (Υ), Μελιτζάνα (Υ)	3
Πατάτα	14

## II. Ετικέτα σκευάσματος:

- Η ετικέτα του σκευάσματος να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
- Για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, επιτρέπεται η τοποθέτηση στις συσκευασίες του σκευάσματος της μέχρι σήμερα ισχύουσας ετικέτας.
- Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις συσκευασίες του σκευάσματος θα τοποθετείται υποχρεωτικά η νέα τροποποιημένη ετικέτα.

5

- III. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθ. πρωτ. 1964/32662/14.03.2019 απόφασή μας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σήμερα.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας»**

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

**Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ**