



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 24/06/2021
Αριθ. πρωτ: 6262/165405

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
ΤΕΛΕΦΑΧ: 210 9212090
Πληροφορίες: Μ.Γάσπαρη
Τηλέφωνο: 210 9287250
e-mail: mgaspari@minagric.gr

Προς: ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Εθν. Αντιστάσεως 73
ΤΚ 152 31 Αθήνα
Nikos.Georgiou@alfagro.gr

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 6087 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνου) NIMROD 25 EC (bupirimate 25% β/ο) ως προς το φάσμα δράσης λόγω αλλαγής των ανωτάτων ορίων υπολειμμάτων της δραστικής ουσίας bupirimate».

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 45 αυτού.
2. Το ν. 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α'45).
4. Το ν. 4622/2019 (Α'133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
5. Τη με αριθ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β'4612/19-10-20).
6. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2020/1566 της Επιτροπής της 27ης Οκτωβρίου 2020 για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για τις ουσίες **bupirimate**, carfentrazone-ethyl, ethirimol και pyriofenone μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα.
7. Τη με αριθ. πρωτ. 102336/7-11-2011 απόφασή μας, με την οποία παρατάθηκε-τροποποιήθηκε η με αριθμό 6087 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) NIMROD 25 EC, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
8. Τη με αριθ. πρωτ. 6262/165405/24-6-2021 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Τροποποιούμε τη με αριθ. **6087** άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μηκυτοκτόνο) **NIMROD 25 EC (bupirimate 25% β/ο)**, η οποία παρατάθηκε και διαμορφώθηκε με τη με αριθ. πρωτ. 102336/7-11-2011 απόφασή μας, ως προς το φάσμα δράσης.

Συγκεκριμένα το σημείο 5 διαμορφώνεται ως ακολούθως:

5	5.1 Φάσμα δράσης
----------	-------------------------

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών
		κ.εκ./στρέμμα	κ.εκ/ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λιτρα / στρέμμα		
Μηλιά	Ωίδιο (<i>Podosphaera leucotricha</i>)	60	40 - 60	100 - 150	Από το στάδιο της πράσινης κορυφής	3/14
Βερικοκιά	Ωίδιο (<i>Podosphaera oxycanthae</i>)	90	30 - 60	100 - 150	Από την πτώση των πετάλων ή μόλις εμφανιστούν τα πρώτα συμπτώματα της ασθένειας	3/14
Ροδακινιά	Ωίδιο (<i>Sphaerotheca pannosa</i>)	90	30 - 60	100 - 150	Από την πτώση των πετάλων ή μόλις εμφανιστούν τα πρώτα συμπτώματα της ασθένειας	3/14
Αμπέλι	Ωίδιο (<i>Uncinula necator</i>)	120-150	150	80 - 100	Όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας και με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων	4/10 - 14
Φράουλα	Ωίδιο (<i>Sphaeroteca macularis</i>)	60-105	120-150	50 - 70	Όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας και με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων	4/10

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών
		κ.εκ./ στρέμμα	κ.εκ/ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λιτρα / στρέμμα		
Τομάτα (Υ+Θ)	Ωίδιο (<i>Leveillula taurica</i>)	100-200	200	50 - 100	Όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας και με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων	3/10
Πιπεριά (Υ+Θ)	Ωίδιο (<i>Leveillula taurica</i>)	100-200	200	50 - 100	Όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας και με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων	2/10
Αγγούρι (Υ+Θ)	Ωίδιο (<i>Sphaerotheca fuliginea</i> , <i>Erysiphe cichoracearum</i> , <i>Leveillula taurica</i>)	50- 120	100- 120	50 - 100	Όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας και με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων	4/10
Κολοκύθι (Υ+Θ)	Ωίδιο (<i>Erysiphe cichoracearum</i> , <i>Leveillula taurica</i> , <i>Sphaerotheca fuliginea</i>)	50- 150	100- 150	50 - 100	Όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας και με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων	4/10
Πεπόνι Καρπούζι Κολοκύθα (Α & Θ)	Ωίδιο (<i>Erysiphe cichoracearum</i> , <i>Sphaerotheca fuliginea</i>)	50- 150	100- 150	50 - 100	Όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας και με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων	4/10

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών
		κ.εκ./ στρέμμα	κ.εκ/ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λιτρα / στρέμμα		
Τριανταφυλλιά	Οίδιο (<i>Sphaerotheca pannosa</i>)	100	120-200 (προληπτικά)	50	Προστατευτική εφαρμογή	3/14
		150	200-240 (θεραπευτικά) + 40 κ.εκ. Προσκολλητικό AGRAL 90	50	Θεραπευτικά	

Παρατηρήσεις:

- 1) Το εύρος των δόσεων είναι ανάλογο με την ένταση της προσβολής
- 2) Ο όγκος ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα είναι ανάλογος του σταδίου ανάπτυξης κάθε καλλιέργειας
- 3) Στη Μηλιά, η δόση δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει τα 60 κ.εκ./στρ. και στη Βερικοκιά και Ροδακινιά τα 90 κ.εκ./στρ.
- 4) Στις περιοχές που εφαρμόζονται, να ακολουθούνται οι οδηγίες των Δελτίων Γεωργικών Προειδοποιήσεων
- 5) Για διαχείριση φαινομένων ανθεκτικότητας οι επεμβάσεις με το σκεύασμα πρέπει να γίνονται σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα που ανήκουν σε ομάδα με διαφορετικό τρόπο δράσης από τις αμινοπυριμιδίνες

Β. 1) Για τις ποσότητες του σκευάσματος που έχουν διατεθεί σε καταστήματα χονδρικής ή λιανικής πώλησης, ο υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά, οφείλει να χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο μέσο επιδεχόμενο ελέγχου, ώστε να ειδοποιεί για τις τροποποιήσεις που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση, τα εν λόγω καταστήματα.

2) Κατά την πώληση συσκευασιών με παλαιές ετικέτες, ο υπεύθυνος επιστήμονας των καταστημάτων χονδρικής ή λιανικής πώλησης οφείλει αφενός να ενημερώνει για την παρούσα απόφαση τους επαγγελματίες χρήστες και αφετέρου να αναγράφει ότι πραγματοποιήθηκε η ενημέρωση αυτή στο αντίστοιχο πεδίο των παρατηρήσεων του εντύπου ηλεκτρονικής καταγραφής της πώλησης.

3) Οι επαγγελματίες χρήστες που έχουν ήδη προμηθευτεί ποσότητες του σκευάσματος οφείλουν να συμμορφώνονται με την παρούσα απόφαση τροποποίησης.

Γ. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθ. πρωτ. 102336/7-11-2011 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ