



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 12.07.2021
Αριθ. πρωτ: 6382/167228

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Δ. Μακρογιάννη
Τηλέφωνο: 210 9287160
e-mail: dmakrogianni@minagric.gr

Προς: Syngenta Hellas A.E.B.E.
Λ. Ανθούσας, 15349, Ανθούσα Αττικής
e-mail: voula.kalliakaki@syngenta.com

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 60346 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) SWITCH 25/37.5 WG (cyprodinil 37,5% β/β + fludioxonil 25% β/β) ως προς το φάσμα δράσης και τις ειδικές συνθήκες γεωργικές, την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 44 αυτού.
2. Το ν. 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α'45).
4. Το ν. 4622/2019 (Α'133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
5. Τη με αριθ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β'4612/19-10-20).
6. Τη με αριθ. πρωτ. 639/6916/18.01.2013 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 60346 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) SWITCH 25/37.5 WG (cyprodinil 37,5% β/β + fludioxonil 25% β/β), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
7. Το υπ' αριθ. πρωτ. 6382/167228/25.06.2021 έγγραφο της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Τροποποιούμε τη με αριθ. 60346 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) SWITCH 25/37.5 WG (cyprodinil 37,5% β/β + fludioxonil 25% β/β), που χορηγήθηκε με

τη με αριθ. πρωτ. 639/6916/18.01.2013 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς το φάσμα δράσης και τις ειδικές συνθήκες γεωργικές, την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις.

Τα σημεία 5 και 13 διαμορφώνονται ως εξής:

| 5 Φάσμα δράσης | | | | | | |
|---|--|------------------------------|---|---|---|---|
| Πεδίο Εφαρμογής | Στόχος | Δόσεις σκευάσματος | | | Τρόπος και χρόνος εφαρμογής | Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο |
| | | κ.εκ/ στρέμ α (max) | κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού | Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμ α | | |
| Αμπέλι Οινοποιήσιμο Επιτραπέζιο Σταφίδα (VITVI) | Βοτρύτης <i>Botrytis cinerea</i> (BOTRCI) Ασπέργιλλος <i>Aspergillus</i> sp. (ASPESP) | 100 | 80-100 | 80-100 | Προληπτική εφαρμογή όταν οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών από την άνθηση έως την ωρίμανση των ραγών. (BBCH 60-88) | 1 εφαρμογή |
| Τομάτα (Υ + Θ) (LYPES) Μελιτζάνα (Υ + Θ) (SOLME) | Βοτρύτης <i>Botrytis</i> sp. (BOTRSP) Σκληρωτίνια <i>Sclerotinia</i> sp. (SCLESP) | 100 | 80-100 | 80-100 | Προληπτική εφαρμογή όταν οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών. Από την άνθηση της 7 ^{ης} ταξιανθίας για τη τομάτα/ 7 ^ο άνθος για την μελιτζάνα έως και την πλήρη ωρίμανση όλων των καρπών. (BBCH 67-89) | 3 εφαρμογές για το βοτρύτη και 2 εφαρμογές για τη σκληρωτίνια με 7-10 ημέρες μεσοδιάστημα. |
| Πιπεριά (Υ + Θ) (CPSAN) | Βοτρύτης <i>Botrytis</i> sp. (BOTRSP) Σκληρωτίνια <i>Sclerotinia</i> sp. (SCLESP) | 100 | 80-100 | 80-100 | Προληπτική εφαρμογή όταν οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών. Από την εμφάνιση του 5 ^{ου} ανθοφόρου οφθαλμού έως και την πλήρη ωρίμανση. (BBCH 55-89) | 3 εφαρμογές για το βοτρύτη και 2 εφαρμογές για τη σκληρωτίνια με 10-14 ημέρες μεσοδιάστημα. |
| Κολοκυνθοειδή: Αγγούρι (Υ + Θ) (CUMSA) Κολοκύθι (Υ + Θ) (CUUPG) Αγγουράκι για τουρσί (Υ + Θ) (CUMSA) | Βοτρύτης <i>Botrytis</i> sp. (BOTRSP) Σκληρωτίνια <i>Sclerotinia</i> sp. (SCLESP) | 100 | 80-100 | 80-100 | Προληπτική εφαρμογή όταν οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών. Από τον σχηματισμό των πρώτων καρπών έως να αποκτήσουν το | 3 εφαρμογές για το βοτρύτη και 2 εφαρμογές για τη σκληρωτίνια με 7-10 ημέρες μεσοδιάστημα. |

| | | | | | | |
|--|---|-----|-----|-----|--|--|
| | | | | | τυπικό σχήμα και μέγεθος. (BBCH 71-79) | |
| Καρότο (Υ) (DAUCS) | Αλτερνάρια <i>Alternaria</i> sp. (ALTESP) Σκληρωτίνια <i>Sclerotinia</i> sp. (SCLESP) | 80 | 100 | 80 | Προληπτική εφαρμογή όταν οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών Από το στάδιο των 4 φύλλων έως την πλήρη ανάπτυξη της ρίζας. (BBCH 14-49) | 2 εφαρμογές με 12 ημέρες μεσοδιάστημα. |
| Φινόκιο (Υ) (Μαραθόριζα) (FOEVA) | Αλτερνάρια <i>Alternaria</i> sp. (ALTESP) Σκληρωτίνια <i>Sclerotinia</i> sp. (SCLESP) | 80 | 100 | 80 | Προληπτική εφαρμογή όταν οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών. Από την έκπτυξη του 4 ^{ου} φύλλου έως το στάδιο που έχει αποκτήσει το τυπικό σχήμα και μέγεθος. (BBCH 14-49) | 2 εφαρμογές με 10 ημέρες μεσοδιάστημα. |
| Κρεμμύδι ξηρό (Υ) (ALLCE) Σκόρδο (Υ) (ALLSA) Ασκαλώνια (Υ) (ALLAS) | Βοτρύτης <i>Botrytis squamosa</i> (SCLESQ) Σκληρωτίνια <i>Sclerotinia</i> sp. (SCLESP) | 100 | 120 | 80 | Προληπτική εφαρμογή όταν οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών. Από την εμφάνιση του 10 ^{ου} φύλλου έως το στάδιο όπου τα φύλλα του 10% των φυτών έχουν πλαγιάσει. (BBCH 20-47) | 3 εφαρμογές για το βοτρυτή και 2 εφαρμογές για τη σκληρωτίνια με 14 ημέρες μεσοδιάστημα. |
| Κρεμμύδι φρέσκο (Υ) (ALLCE) | Βοτρύτης <i>Botrytis squamosa</i> (SCLESQ) Σκληρωτίνια <i>Sclerotinia</i> sp. (SCLESP) | 100 | 120 | 80 | Προληπτική εφαρμογή όταν οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών. Από την εμφάνιση του 10 ^{ου} φύλλου έως όπου το φυτό αποκτήσει το 70% του τελικού μήκους και διαμέτρου. (BBCH 20-47) | 3 εφαρμογές για το βοτρυτή και 2 εφαρμογές για τη σκληρωτίνια με 14 ημέρες μεσοδιάστημα. |
| Μαρούλι (Υ + Θ) (LACSA) Σαλάτα (Υ + Θ) (LACSA) Αντίδι (Υ + Θ) (CICEN) Αρωματικά φυτά (Υ + Θ) | Βοτρύτης <i>Botrytis cinerea</i> (BOTRCI) Σκληρωτίνια <i>Sclerotinia</i> sp. (SCLESP) | 60 | 60 | 100 | Προληπτική εφαρμογή όταν οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών. Από την έκπτυξη του 1 ^{ου} φύλλου έως το στάδιο όπου οι κεφαλές | 3 εφαρμογές για το βοτρυτή και 2 εφαρμογές για τη σκληρωτίνια με 10 ημέρες μεσοδιάστημα. |

| | | | | | | |
|---|--|-----|--------|-----|--|--|
| | | | | | έχουν αποκτήσει το τυπικό τους σχήμα και μέγεθος. (BBCH 11-49) | |
| Σπαράγγι (ASPSS) | Στεμφύλιο <i>Stemphylium botryosum</i> (PLEOHE), <i>Stemphylium vesicarium</i> (PLEOAL) Βοτρύτης <i>Botrytis cinerea</i> (BOTRCI) | 100 | 100 | 100 | Προληπτική εφαρμογή όταν οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών. Από την έναρξη της άνθησης έως τη συγκομιδή. (BBCH 61-89) | 3 εφαρμογές με 10-21 ημέρες μεσοδιάστημα. |
| Φράουλα (Υ + Θ) (FRAAN) | Βοτρύτης <i>Botrytis cinerea</i> (BOTRCI) Ανθράκωση <i>Colletotrichum</i> sp. (COLLSP) | 100 | 125 | 80 | Προληπτική εφαρμογή όταν οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών. Από την εμφάνιση των πρώτων ανθέων στο βάθος της ροζέτας έως το τέλος της συγκομιδής. (BBCH 55-89) | 2 εφαρμογές με 10 ημέρες μεσοδιάστημα στο θερμοκήπιο και 1 εφαρμογή στον αγρό. |
| Φασολάκι με λοβό (Υ + Θ) (PHSVX) | Βοτρύτης <i>Botrytis cinerea</i> (BOTRCI) Σκληρωτίνια <i>Sclerotinia</i> sp. (SCLESP) Ανθράκωση <i>Colletotrichum</i> sp. (COLLSP) | 100 | 100 | 100 | Προληπτική εφαρμογή όταν οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών. Από την εμφάνιση των πρώτων ανθοφόρων οφθαλμών έως ότου τον πλήρη σχηματισμό των λοβών. BBCH 51-79 | 2 εφαρμογές με 10-14 ημέρες μεσοδιάστημα. |
| Όσπρια Φασόλια (PHSVX) | Βοτρύτης <i>Botrytis cinerea</i> (BOTRCI) Σκληρωτίνια <i>Sclerotinia</i> sp. (SCLESP) Ανθράκωση <i>Colletotrichum</i> sp. (COLLSP) | 100 | 100 | 100 | Προληπτική εφαρμογή όταν οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών. Από την έναρξη της άνθησης έως το στάδιο όπου το 40% των λοβών έχουν φθάσει το τελικό τους μέγεθος. (BBCH 61-74) | 2 εφαρμογές με 10 ημέρες μεσοδιάστημα. |
| Μήλα (MABSD) Αχλάδια (PYUCO) Κυδώνια (CYDOB) | Σήψεις καρπών: Γλοιοσπόριο <i>Gloeosporium</i> sp. (GLOESP) Βοτρύτης <i>Botrytis cinerea</i> | 100 | 80-100 | 100 | Προληπτική εφαρμογή όταν οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών. Από την έναρξη της άνθησης έως την πλήρη | 3 εφαρμογές με 6-10 ημέρες μεσοδιάστημα. |

| | | | | | | |
|--|---|-----|--------|-----|--|--|
| | (BOTRCI) Πενικίλιο <i>Penicillium</i> sp. (PENISP) Αλτερνάρια <i>Alternaria</i> sp. (ALTESP) Φαιά σήψη <i>Monilia</i> sp. (MONISP) Ανθράκωση <i>Colletotrichum</i> sp. (COLLSP) Φουζικλάδιο <i>Venturia</i> sp. (VENTSP) Εξέγκωση βραχιόνων <i>Nectria</i> sp. (NECTSP) Φουζάριο <i>Fusarium</i> sp. (FUSASP) | | | | ωρίμανση των καρπών. [Πρώτη εφαρμογή από την έναρξη έως το τέλος της άνθησης-πτώση πετάλων (BBCH 61-69) & τελευταία εφαρμογή από την έναρξη της ωρίμανσης των καρπών έως το στάδιο της συγκομιδής τους. (BBCH 81-87)] | |
| | Μετασυλλεκτικές ασθένειες: Φουζικλάδιο <i>Venturia</i> sp. (VENTSP) Εξέγκωση βραχιόνων <i>Nectria</i> sp. (NECTSP) Φαιά σήψη <i>Monilia</i> sp. (MONISP) | 100 | 80-100 | 100 | Προληπτική εφαρμογή για την αντιμετώπιση μετασυλλεκτικών ασθενειών. [Πρώτη εφαρμογή από την έναρξη έως το τέλος της άνθησης-πτώση πετάλων (BBCH 61-69) & τελευταία εφαρμογή από την έναρξη της ωρίμανσης των καρπών έως το στάδιο της συγκομιδής τους (BBCH 81-87)] | |
| Ροδακινιά (PRNPS) Νεκταρινιά (PRNPN) Βερικοκιά (PRNAR) | Φαιά σήψη <i>Monilia</i> sp. (MONISP) | 100 | 60-100 | 100 | Προληπτική εφαρμογή όταν οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών. Από την έναρξη της άνθησης έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών. [Πρώτη εφαρμογή από την έναρξη έως το τέλος της άνθησης-πτώση πετάλων (BBCH 61-69) & τελευταία εφαρμογή από την | 2 εφαρμογές με 7-10 ημέρες μεσοδιάστημα. |

| | | | | | | |
|--|--|-----|--------|-----|--|--|
| | | | | | έναρξη της ωρίμανσης των καρπών έως την πλήρη ωρίμανση τους. (BBCH 81-89)] | |
| Κεράσια (PRNAV) | Φαιά σήψη <i>Monilia</i> sp. (MONISP) | 100 | 60-100 | 100 | Προληπτική εφαρμογή όταν οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών. Από το ροζ μπουμπούκι έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών. [Πρώτη εφαρμογή από την έναρξη έως το τέλος της άνθησης-πτώση πετάλων (BBCH 57-69) & τελευταία εφαρμογή από την έναρξη της ωρίμανσης των καρπών έως την πλήρη ωρίμανση τους. (BBCH 81-89)] | 2 εφαρμογές με 7 ημέρες μεσοδιάστημα. |
| Δαμάσκηνα (PRNDO) | Φαιά σήψη <i>Monilia</i> sp. (MONISP) | 100 | 60-100 | 100 | Προληπτική εφαρμογή όταν οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών. Από την έναρξη της άνθησης έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών. [Πρώτη εφαρμογή από την έναρξη έως το τέλος της άνθησης-πτώση πετάλων (BBCH 61-69) & τελευταία εφαρμογή από την έναρξη της ωρίμανσης των καρπών έως την πλήρη ωρίμανση τους. (BBCH 81-89)] | 3 εφαρμογές με 7-10 ημέρες μεσοδιάστημα. |
| Καπνός (NIOTA) | Σκληρωτία <i>Sclerotinia</i> sp. (SCLESP) | 60 | -- | 60 | Προληπτικές εφαρμογές όταν οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών από την έναρξη και κατά τη διάρκεια της άνθησης. (BBCH 51-89) | 2 εφαρμογές με 14 ημέρες μεσοδιάστημα. |
| Ανθοκομικά: Ανεμώνη (ANMSS), Μπιγκόνια (CMIGR), Κυκλάμινο (CZHE), Βιόλα (VIOSS), | Βοτρύτης <i>Botrytis cinerea</i> (BOTRCI) Ασπέργιλλος <i>Aspergillus</i> sp. | 100 | 100 | 100 | Προληπτικές εφαρμογές όταν οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών. | 3 εφαρμογές με 10 ημέρες μεσοδιάστημα. |

| | | | | | | |
|---|--|-----|-----|--------|--|---|
| Βιολέτα (MTLIN), Πελαργόνιο (PELSS), Πρίμουλα (PRISS), Τριαντάφυλλο (ROSSS), Γαρύφαλλο (DINCA), Χρυσάνθεμο (CHYHO), Φίκος (FIUSY), Μπένζαμιν (FIUBE), Ζέρμπερα (GEBSS), Πανσές (VIOTR), Γεράνι (GERSS), Εξάκον (EXUAF), Ορτανσία (HYESS), Αζαλέα (RHOSS), Γυψοφίλη (GYPSP), Κάκτοι παχύφυτα, Λυσσίανθος (EVMGR), Βιβούρνο σε πλαστικά τούνελ (VIBSS), Ντιόσμα σε πλαστικά τούνελ, Γκιουλθέρια (CMPME), Ίλεξ (ILESS), Παιόνια (PAOLH) (Y+Θ) | (ASPESP) | | | | (BBCH 14-67) | |
| Βατόμουρα* (Y + Θ) (RUBFR) Σμέουρα* (Y + Θ) (RUBID) (Χρήσεις ήσσονος σημασίας) | <i>Rhabdospora ruborum</i> (RBSPRU) <i>Leptosphaeria coniothyrium</i> (LEPTCO) Βοτρώτης <i>Botrytis cinerea</i> (BOTRCI) Μαύρη σήψη <i>Dydimella applanata</i> (DIDYAP) | 100 | 100 | 20-100 | Προληπτικές εφαρμογές όταν οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών. Από την έναρξη της άνθησης έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών. (BBCH 61-89) | 3 εφαρμογές με 7 ημέρες μεσοδιάστημα. |
| Σπανάκι* (Y & Θ) (SPQOL) (Χρήσεις ήσσονος σημασίας) | Βοτρώτης <i>Botrytis cinerea</i> (BOTRCI) Σκληρωτίνια <i>Sclerotinia</i> sp. (SCLESP) | 60 | 60 | 100 | Προληπτική εφαρμογή όταν οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών. Από την έκπτυξη του 1 ^{ου} πραγματικού φύλλου έως το στάδιο πριν την έκπτυξη της | 3 εφαρμογές για το βοτρώτη και 2 εφαρμογές για τη σκληρωτίνια με 7-10 ημέρες μεσοδιάστημα |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|------------------------------------|--|
| | | | | | ανθικής καταβολής. (BBCH 11-49) | |
| <p>*Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες βατόμουρων, σμέουρων και σπανακιού από τη χρήση του σκευάσματος. Για την χρήση του σκευάσματος στις καλλιέργειες αυτές ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του.</p> | | | | | | |

13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

| Καλλιέργεια | Ημέρες |
|---|---------|
| Φασόλια | 28 |
| Αμπέλι οινοποιήσιμο | 21 |
| Ασκαλώνια (Υ), Φασολάκι με λοβό (Υ), Σκόρδο (Υ) | 14 |
| Αμπέλι επιτραπέζιο, Αντίδι (Υ+Θ), Αρωματικά φυτά (Υ+Θ), Βατόμουρα (Υ+Θ), Βερίκοκα, Δαμάσκηνα, Καπνός, Καρότο (Υ), Κεράσια, Κρεμμύδι ξηρό (Υ), Κρεμμύδι φρέσκο (Υ), Φινόκιο (Μαραθόριζα) (Υ), Μαρούλι (Υ+Θ), Νεκταρίνια, Ροδάκινα, Σαλάτα (Υ+Θ), Σμέουρα (Υ+Θ), Σπανάκι (Υ+Θ) | 7 |
| Αγγούρι (Υ+Θ), Αγγουράκι για τουρσί (Υ+Θ), Αχλάδια, Κολοκύθι (Υ+Θ), κυδώνια, Μηλιά, Μελιτζάνα (Υ+Θ), πιπεριά (Υ+Θ), τομάτα (Υ+Θ), Φασολάκι με λοβό (Θ) | 3 |
| Φράουλα (Υ) | 2 |
| Φράουλα (Θ) | 1 |
| Σπαράγγι | 6 μήνες |
| Ανθοκομικά (Υ+Θ) | - |

- II. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθ. πρωτ. 639/6916/18.01.2013 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ