



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 08/07/2021
Αριθ. πρωτ: 4761/12582

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Μ. Γάσπαρη
Τηλέφωνο: 210 9287250
e-mail: mgaspari@minagric.gr

Προς: Bayer Ελλάς ABEE
Σωρού 18-20 Μαρούσι
151 25 Μαρούσι
e-mail: ioannis.tsoutsanis@bayer.com

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 14539 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) **MOVENTO GOLD** (δ.ο. **spirotetramat**) ως προς το φάσμα δράσης, τις δηλώσεις προφύλαξης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή».

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 45 αυτού.
2. Το ν. 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α' 45).
4. Το ν. 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
5. Τη με αριθ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β' 4612/19-10-20).
6. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2021/644 της Επιτροπής της 15ης Απριλίου 2021 για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για τις ουσίες fluxarogoxad, hymexazol, metamidron, penflufen και **spirotetramat** μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα.
7. Τη με αριθ. πρωτ. 9189/103774/25-9-2015 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 14539 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) **MOVENTO GOLD** (δ.ο. **spirotetramat**), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
8. Τη με αριθ. πρωτ. 4761/125782/13-5-2021 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Τροποποιούμε τη με αριθ. 14539 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος **(εντομοκτόνο) MOVENTO GOLD (δ.ο. spirotetramat)**, που χορηγήθηκε με τη με αριθ. πρωτ. 9189/103774/25-9-2015 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς το φάσμα δράσης, τις δηλώσεις προφύλαξης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή.

Συγκεκριμένα, τα σημεία **5**, **11** και **13** διαμορφώνονται ως εξής:

5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική ή περίοδο/μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες)
		κ. εκ./ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα	κ. εκ./ στρέμμα (max)		
ΜΗΛΟΕΙΔΗ¹ Μηλιά MABSD, Αχλαδιά PYUCO	ΑΦΙΔΕΣ Ρόδινη αφίδα της μηλιάς (<i>Dysaphis plantaginea</i> - DYSAPL , <i>Dysaphis pyri</i> – DYSAPY), Πράσινη αφίδα της μηλιάς (<i>Aphis pomi</i> - APHIPO)	75-120*	50-150	---	Εφαρμογές μετά την πτώση των πετάλων και μέχρι την έναρξη της ωρίμανσης. BBCH: 69-79.	1-2/14
	ΚΟΚΚΟΕΙΔΗ Ψώρα Σαν Ζοζέ ² (<i>Quadraspidiotus perniciosus</i> - QUADPE , <i>Pseudaulacapsis pentagona</i> - PSEAPE)	120-150*	50-150	---	Εφαρμογές μετά την πτώση των πετάλων και μέχρι την έναρξη της ωρίμανσης. BBCH: 69-79. Ψύλλα:	

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες)
		κ. εκ./ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα	κ. εκ./ στρέμμα (max)		
	<p><i>Psylla mali</i> - PSYLMA), <i>Lepidosaphes</i> sp - LEPSSP (μόνο Μηλιά),</p> <p>ΜΑΤΟΨΕΙΡΑ (<i>Eriosoma lanigerum</i> - ERISLA)</p> <p>ΨΥΛΛΑ ΑΧΛΑΔΙΑΣ (<i>Cacopsila pyricolla</i>, <i>Psylla pyri</i> - PSYLPI)</p>				<p>Εφαρμογές όταν το 50% των αυγών είναι κίτρινα και το υπόλοιπο 50% λευκά. Ψώρα Σαν Ζοζέ: Εφαρμογές μετά το τέλος της άνθησης στα ευαίσθητα στάδια (κινητές μορφές)</p> <p>Ματόψειρα: Εφαρμογές μετά το τέλος της άνθησης με την εμφάνιση της προσβολής. Συστήνεται να γίνεται πολύ καλή διαβροχή.</p>	
<p>Ροδακινιά¹ PRNPS Βερικοκιά¹ PRNAR</p>	<p>ΑΦΙΔΕΣ Πράσινη αφίδα της ροδακινιάς (<i>Myzus persicae</i> - MYZUPE), <i>Aphis pomi</i> - APHIPO, <i>Hyalopterus pruni</i> - HYALPR, <i>Hyalopterus amygdali</i> - HYALAM</p>	75-100*	50-150	---	<p>Εφαρμογές μετά την πτώση των πετάλων και μέχρι την έναρξη της ωρίμανσης. BBCH: 69-79.</p>	1-2/14

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες)
		κ. εκ./ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα	κ. εκ./ στρέμμα (max)		
	ΚΟΚΚΟΕΙΔΗ Ψώρα Σαν Ζοζέ (<i>Quadraspidiotus perniciosus</i> - QUADPE), Βαμβακάδα της ροδακινιάς (<i>Pseudalacaspis pentagona</i> - PSEAPE), <i>Parthenolecanium corni</i> - LECACO , <i>Eulecanium tiliae</i> - LECATI ΘΡΙΠΕΣ <i>Thrips sp.</i> – THRISP	120-150*	50-150	---	Εφαρμογές μετά την πτώση των πετάλων και μέχρι την έναρξη της ωρίμανσης στα ευαίσθητα στάδια (κινητές μορφές). BBCH: 69-79.	
Κερασιά ¹ PRNAV	ΑΦΙΔΕΣ Πράσινη αφίδα της ροδακινιάς (<i>Myzus persicae</i> - MYZUPE), <i>Aphis pomi</i> - ΑΡΗΠΟ , <i>Hyalopterus pruni</i> - HYALPR , <i>Hyalopterus amygdali</i> – HYALAM , Μαύρη Αφίδα της Κερασιάς (<i>Myzus cerasi</i> - MYZUCE)	75-150*	50-150	---	Εφαρμογές μετά την πτώση των πετάλων και μέχρι την έναρξη της ωρίμανσης. BBCH: 69-79.	1-2/14
	ΚΟΚΚΟΕΙΔΗ Ψώρα Σαν Ζοζέ (<i>Quadraspidiotus perniciosus</i> - QUADPE), Βαμβακάδα της ροδακινιάς (<i>Pseudalacaspis</i>	120-150*	50-150	---	Εφαρμογές μετά την πτώση των πετάλων και μέχρι την έναρξη της ωρίμανσης στα ευαίσθητα στάδια (κινητές μορφές). BBCH: 69-79.	

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες)
		κ. εκ./ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα	κ. εκ./ στρέμμα (max)		
	<i>pentagona</i> - PSEAPE), <i>Parthenolecanium corni</i> - LECACO , <i>Eulecanium tiliae</i> – LECATI					
Δαμασκησιά ¹ PRNDO	ΑΦΙΔΕΣ Πράσινη αφίδα της ροδακινιάς (<i>Myzus persicae persicae</i> - MYZUPE), <i>Aphis pomi</i> - ΑΡΗΙΡΟ , <i>Hyalopterus pruni</i> - HYALPR , <i>Hyalopterus amygdali</i> - HYALAM , <i>Aphis spiraecola</i> - APHISI	75-150*	50-150	---	Εφαρμογές μετά την πτώση των πετάλων και μέχρι την έναρξη της ωρίμανσης. BBCH: 69-79.	1-2/14
	ΚΟΚΚΟΕΙΔΗ Ψώρα Σαν Ζοζέ (<i>Quadraspidiotus perniciosus</i> - QUADPE), Βαμβακάδα της ροδακινιάς (<i>Pseudalacaspis pentagona</i> - PSEAPE), <i>Parthenolecanium corni</i> - LECACO , <i>Eulecanium tiliae</i> - LECATI	120-150*	50-150	---	Εφαρμογές μετά την πτώση των πετάλων και μέχρι την έναρξη της ωρίμανσης στα ευαίσθητα στάδια (κινητές μορφές). BBCH: 69-79.	

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες)
		κ. εκ./ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος υγρού λίτρα / στρέμμα	κ. εκ./ στρέμμα (max)		
Εσπεριδοειδή ¹ (Πορτοκαλιά CIDSI , Μανταρινιά CIDRE , Κλημεντίνη CIDCL , Λεμονιά CIDLI , Κιτριά CIDME , Γκρέϊπ φρουτ CIDPA , Μοσχολέμονο (Λάμ) CIDAF , Νερατζιά CIDAU , Φράπα CIDGR)	ΑΦΙΔΕΣ (<i>Myzus persicae</i> – ΜΥΖΥΡΕ , <i>Aphis gossypii</i> – ΑΡΗΙΓΟ)	45-60	100-300	---	Ψεκάστε από την καρπόδεση και μέχρι ο καρπός να φτάσει το 90 % του τελικού μεγέθους του. BBCH: 71-89.	1-2 /21
	ΘΡΙΠΕΣ <i>Pezothrips kellyanus</i> – ΡΕΖΤΚΕ	60-75	100-300	---		
	ΚΟΚΚΟΕΙΔΗ Κόκκινη ψώρα εσπεριδοειδών (<i>Aonidiella aurantii</i> – AONDAU), Λευκή ψώρα εσπεριδοειδών (<i>Aspidiotus nerii</i> – ASPDNE), <i>Parlatoria pergandei</i> – PARLPE), Κόκκος	45-75	100-300	---		

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες)
		κ. εκ./ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα	κ. εκ./ στρέμμα (max)		
	εσπεριδοειδών (<i>Coccus hesperidum</i> - COCCHE), <i>Ceroplastes rusci</i> - CERPRU , <i>Pseudococcus citri</i> - PSECCI , <i>Planococcus sp.</i> - PLANSP , <i>Saissetia oleae</i> - SAISOL , <i>Lepidosaphes sp.</i> - LEPSSP , ΑΛΕΥΡΩΔΗΣ Εριώδης Αλευρώδης (<i>Aleurothrixus floccosus</i> - ALTHFL)					
Μπανάνα ¹ MUBPA	ΚΟΚΚΟΕΙΔΗ (<i>Aspidiotus nerii</i> - ASPDNE , Βαμβακάδα - <i>Dysmicoccus grassi</i> - DYSMGR), ΑΛΕΥΡΩΔΗΣ (<i>Aleurodicus dispersus</i> - ALEDDI , <i>Lecanoideus sp.</i> - LECOSP , <i>Bemisia sp.</i> - BEMISP , <i>Aleurodes sp.</i> - ALEUSP)	45-75	100-300	---	Εφαρμογές από το στάδιο των τριών εντελώς ανοικτών φύλλων μέχρι την εμφάνιση του πρώτου βρακτίου. BBCH: 13-50	1-2 /30
Λάχανο BRSOL (Λευκό BRSOH , Κόκκινο BRSOR , Savoy BRSOS , Κινέζικο BRSPK),	ΑΛΕΥΡΩΔΗΣ (<i>Aleurodes proletella</i> - ALEUPR)	---	30-100	15-75	Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής από το στάδιο των πέντε πραγματικών φύλλων και μέχρι η κεφαλή να	1-2/14

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες)
		κ. εκ./ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα	κ. εκ./ στρέμμα (max)		
Κουνουπίδι BRSOB , Μπρόκολο BRSOK					φτάσει το τυπικό μέγεθος του είδους. BBCH: 15-49	
Μαρούλι LACSA Λυκοτρίβολο/Β αλεριανέλλα (lamb's lettuce) VLLLO , Σαλάτα LACSA Ρόκα ERUVE , Κάρδαμο LEPSA , Γαιοκάρδαμο BARVE , Σινάπι κόκκινο BRSJU (red mustard)	ΑΦΙΔΕΣ (<i>Nasonovia ribisnigri</i> - NASORN , <i>Aphis sp.</i> - APHISP , <i>Myzus persicae</i> - MYZUPE)	-	30-80	15-60	Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής από το στάδιο των πέντε πραγματικών φύλλων και μέχρι η κεφαλή να φτάσει το τυπικό μέγεθος του είδους. BBCH: 15-49	1-2/14

Παρατηρήσεις:

¹ Στις καλλιέργειες Μηλοειδών, Πυρηνοκάρπων, Εσπεριδοειδών και Μπανάνας η δόση ανά στρέμμα να μην υπερβαίνει τα 225 κ.εκ/στρέμμα.

² Στη Μηλιά και την Αχλαδιά να χρησιμοποιείται η υψηλή δόση για την καταπολέμηση του *Quadraspidiotus perniciosus*.

* Η ελάχιστη δόση να εφαρμόζεται με τουλάχιστον 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού/στρέμμα.

11

Δηλώσεις
Προφύλαξης

P102 Μακριά από παιδιά.

P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο.

P270 Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

P201 Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.

P202 Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες φύλαξης.

P261 Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/ αέρια/συγκεντρώσεις σταγονιδίων/ατμούς/εκνεφώματα.

P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα.

P391 Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.

SPo 2 Ξεπλύνετε όλες τις προστατευτικές ενδυμασίες μετά τη χρήση.

Spe3 Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας **15 μέτρων ή 10 μέτρων με παράλληλη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50%** μέχρι τα σώματα επιφανειακών υδάτων για την καλλιέργεια της Μπανάνας, **10 μέτρων ή 5 μέτρων με παράλληλη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50%** μέχρι τα σώματα επιφανειακών υδάτων για τις καλλιέργειες των Μηλοειδών (Μηλιά, Αχλαδιά) και των Πυρηνοκάρπων (Ροδακινιά, Βερικοκιά, Κερασιά, Δαμασκηλιά) και **5 μέτρων με παράλληλη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50%** μέχρι τα σώματα επιφανειακών υδάτων για την καλλιέργεια των Εσπεριδοειδών (Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Κλημεντίνη, Λεμονιά, Κιτριά, Γκρέιπ φρουτ, Μοσχολέμονο (Λάιμ), Νερατζιά, Φράπα).

SPE3 Για να προστατέψετε μη στοχευόμενα φυτά να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας **1 μέτρου** μέχρι τη μη γεωργική γη για τις καλλιέργειες Λάχανο (Λευκό, Κόκκινο, Savoy), Κινέζικο Λάχανο, Κουνουπίδι, Μπρόκολο, Μαρούλι, Λυκοτρίβολο/ Βαλεριανέλλα (lamb's lettuce), Σαλάτα, Ρόκα, Κάρδαμο, Γαιοκάρδαμο, Σινάπι κόκκινο (red mustard) και **10 μέτρων** για την καλλιέργεια της Μπανάνας.

SPE3 Για να προστατέψετε μη στοχευόμενα αρθρόποδα να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας **5 μέτρων** μέχρι τη μη γεωργική γη για την καλλιέργεια Εσπεριδοειδών, Μηλοειδών και Πυρηνοκάρπων και **10 μέτρων** για την καλλιέργεια της Μπανάνας.

SPE8 Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο ανθοφορίας ζιζανίων. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν γύρη.

13

Προστασία των καταναλωτών13.2 Τελευταία επέμβαση
πριν τη συγκομιδή

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Μήλα (0130010), Αχλάδια (0130020), Ροδάκινα (0140030), Βερίκοκα (0140010), Κεράσια (0140020), Δαμάσκηνα (0140040)	21

Πορτοκάλια (0110020), Μανταρίνια (0110050), Κλημεντίνη (0110050-002), Λεμόνια (0110030), Κίτρα (0110030-002), Γκρέιπ φρουτ (0110010), Μοσχολέμονο (Λάιμ) (0110040), Νεράτζια (0110020-002), Φράπα (0110010-002), Μπανάνα (0163020)	14
Μαρούλι (0251020), Λυκοτρίβολο/ Βαλεριανέλλα (lamb's lettuce) (0251010), Σαλάτα (0251020), Ρόκα (0251060), Κάρδαμο (0251040), Γαιοκάρδαμο (0251050), Σινάπι κόκκινο (red mustard) (0251070)	7
Λάχανο (0242020, Λευκό 0242020-004, Κόκκινο 0242020-002, Savoy 0242020-003), Κινέζικο Λάχανο (0243010), Κουνουπίδι (0241020), Μπρόκολο (0241010)	3

Β. 1) Για τα υπάρχοντα αποθέματα του σκευάσματος, επιτρέπεται η διάθεση σε καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων με ετικέτα που να είναι σύμφωνη με την παλαιά έγκριση (παλαιά ετικέτα) για χρονικό διάστημα μέχρι δύο (2) μηνών από την υπογραφή της παρούσας απόφασης.

2) Για τις ποσότητες του σκευάσματος που έχουν διατεθεί σε καταστήματα χονδρικής ή λιανικής πώλησης, ο υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά, οφείλει να χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο μέσο επιδεχόμενο ελέγχου, ώστε να ειδοποιεί για τις τροποποιήσεις που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση, τα εν λόγω καταστήματα.

3) Κατά την πώληση συσκευασιών με παλαιές ετικέτες, ο υπεύθυνος επιστήμονας των καταστημάτων χονδρικής ή λιανικής πώλησης οφείλει αφενός να ενημερώνει για την παρούσα απόφαση τους επαγγελματίες χρήστες και αφετέρου να αναγράφει ότι πραγματοποιήθηκε η ενημέρωση αυτή στο αντίστοιχο πεδίο των παρατηρήσεων του εντύπου ηλεκτρονικής καταγραφής της πώλησης.

4) Οι επαγγελματίες χρήστες που έχουν ήδη προμηθευτεί ποσότητες του σκευάσματος οφείλουν να συμμορφώνονται με την παρούσα απόφαση τροποποίηση του φάσματος δράσης.

Γ. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθ. πρωτ. **9189/103774/25-9-2015** απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ