



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 16.02.2022
Αριθ. πρωτ: 1208/36879

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Γ. Τσολομούτη
Τηλέφωνο: 210 9287247
e-mail: gtsolomiti@minagric.gr

Προς: Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ
Σωρού 18-20,
151 25 Μαρούσι
Email: ioannis.tsoutsanis@bayer.com

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 14670 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) SIVANTO PRIME (δ.ο flupyradifurone 20% β/ο), ως προς το φάσμα δράσης, τις δηλώσεις προφύλαξης και τη τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα τα άρθρα 45 και 33 αυτού.
2. Το ν. 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών.
4. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωϊκής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθ. 2021/1842 της Επιτροπής της 20ης Μαΐου 2021 για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για τη **flupyradifurone** (φλουπυραδιφουρόνη) και το διφθοροξικό οξύ μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα.
6. Τη με αριθ. πρωτ. 8067/106364 Ο.Ε./09.08.2018 άδεια διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) SIVANTO PRIME (δ.ο flupyradifurone 20% β/ο), με ΑΑΔΑ 14670, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
7. Το ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
8. Το ν. 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
9. Την με αριθ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β' 4612/19-10-20).

10. Την με αρ. πρωτ. 11865/326466/19.11.2021 αίτηση καθώς και τα με αριθ. πρωτ. 1208/36879/10.02.2022 συμπληρωματικά στοιχεία της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- I. Τροποποιούμε τη με αριθ. **14670** άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος **(εντομοκτόνο) SIVANTO PRIME (δ.ο flupyradifurone 20% β/ο)**, η οποία χορηγήθηκε την υπ. αριθ. πρωτ. 8067/106364 Ο.Ε./09.08.2018 απόφαση μας, ως προς το φάσμα δράσης, τις δηλώσεις προφύλαξης και τη τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις.

Συγκεκριμένα τα σημεία **5, 11** και **13** διαμορφώνονται ως εξής:

5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες
		κ.εκ./ στρ.	κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ.		
Μηλιά MABSD	Αφίδες <i>Aphis pomi</i> (ΑΡΗΠΟ), <i>Dysaphis plantaginea</i> (DYSAPL), <i>Dysaphis devectora</i> (DYSADE)	30 για ύψος κόμης 100 εκ.	60	50	Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος με την εμφάνιση της προβολής από το στάδιο της πράσινης κορυφής μέχρι οι καρποί να αποκτήσουν το 90% του τελικού μεγέθους τους (BBCH 10-79)	1 εφαρμογή κάθε 2 χρόνια
		60 για ύψος κόμης 200 εκ.		100		
		90 για ύψος κόμης 300 εκ.		150		
					Μέγιστο ύψος καλλιέργειας 300 εκ.	

Αχλαδιά PYUCO	Αφίδες <i>Aphis gossypii</i> (ΑΡΗΙΓΟ), <i>Aphis pomi</i> (ΑΡΗΙΡΟ), <i>Dysaphis pyri</i> (ΔΥΣΑΡΥ)	30 για ύψος κόμης 100 εκ. 60 για ύψος κόμης 200 εκ. 90 για ύψος κόμης 300 εκ.	60	50 100 150	Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος με την εμφάνιση της προβολής από το στάδιο της πράσινης κορυφής μέχρι οι καρποί να αποκτήσουν το 90% του τελικού μεγέθους τους (BBCH 10-79) Μέγιστο ύψος καλλιέργειας 300 εκ.	1 εφαρμογή κάθε 2 χρόνια
	Οπλοκάμπη <i>Homocampa brevis</i> (HOPLBR)	Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος με την εμφάνιση της προβολής από το στάδιο της πλήρης άνθισης (τουλάχιστον το 50% των άνθεων ανοικτά) μέχρι το τέλος της άνθισης (BBCH 65-69) Μέγιστο ύψος καλλιέργειας 300εκ.				
Ελιά (επιτραπέζιες & Ελαιοποιήσιμες ποικιλίες) OLVEU	Δάκος <i>Bactrocera oleae</i> (DACUOL) Λεκάνιο <i>Saissetia oleae</i> (SAISOL)	75	-	80-100	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προβολής από το στάδιο της πλήρης έκπτυξης των ανθοταξιών μέχρι πριν από την πλήρη ωρίμανση των καρπών (το χρώμα των καρπών έχει σχεδόν αλλάξει) (BBCH 55-85). Ειδικά για τον δάκο, ο ψεκασμός να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις συλλήψεις των ακμαίων στις παγίδες παρακολούθησης του δακοπληθυσμού.	1 εφαρμογή τον χρόνο

Αμπέλι VITVI	Τζιτζικάκια <i>Empoasca vitis</i> (EMPOFL)	20 για ύψος κόμης 80 εκ. 25 για ύψος κόμης 100 εκ. 30 για ύψος κόμης 120 εκ.	-	50-100	Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής όταν οι ταξιανθίες είναι πλήρως αναπτυγμένες, ως την έναρξη της ωρίμανσης των καρπών (BBCH 57-81)	1
	Κοκκοειδή <i>Scaphoideus</i> <i>titanus</i> (SCAPLI)	50	-	50-100		
	<i>Metcalfa</i> <i>pruinosa</i> (METFPR)					
	Αφίδες <i>Aphis gossypii</i> (APHIGO)					
	Φυλλοξήρα <i>Viteus vitifoliae</i> (VITEVI)					
	Ψευδόκοκκος <i>Planococcus</i> <i>ficus</i> (PLANFI)					
Σολανώδη Υπαίθρου (Υ) Τομάτα LYPES Πιπεριά CPSAN Μελιτζάνα SOLME	Αφίδες <i>Aphis gossypii</i> (APHIGO), <i>Myzus persicae</i> (MYZUPE), <i>Macrosiphum</i> <i>euphorbiae</i> (MACSEU)	45	-	45-100	Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής από την εμφάνιση του δεύτερου πραγματικού φύλλου μέχρι την πλήρη ωρίμανση (BBCH 12-89)	1
Κολοκυνθοειδή Υπαίθρου (Υ) Αγγούρι CUMSA Κολοκύθι CUUPG Καρπούζι CITLA Κολοκύθα CCUMA	Αφίδες <i>Aphis gossypii</i> (APHIGO)	56	-	45-100	Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής από την εμφάνιση του δεύτερου πραγματικού φύλλου μέχρι την πλήρη ωρίμανση (BBCH 12-89)	1

Μαρούλι (Υ) LACSA	Αφίδες <i>Nasonovia ribisnigri</i> (NASORN), <i>Macrosiphum euphorbiae</i> (MACSEU), <i>Myzus persicae</i> , (MYZUPE), <i>Uroleucon sonchi</i> (DACTSN), <i>Aulacorthum solani</i> (AULASO), <i>Acyrtosiphon</i> sp. (ACYRSP) <i>Aphis gossypii</i> (APHIGO)	62,5	-	50-100	Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής από το 10% της ανάπτυξης της φυλλικής επιφάνειας μέχρι να ολοκληρωθεί η ανάπτυξη του προς κατανάλωση μέρους του φυτού (BBCH 41-49)	1
Μπιζέλια με ή χωρίς λοβό (Υ) PIBSX, Μπιζέλια ξηρά (Υ) PIBSA	Αφίδες <i>Acyrtosiphon pisum</i> (ACYRON)	37,5		10-40	Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής από την εμφάνιση του δεύτερου πραγματικού φύλλου μέχρι τον σχηματισμό των 9 πρώτων φύλλων και ελίκων. (BBCH 12-19). Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής από την έναρξη επιμήκυνσης του βλαστού μέχρι την ωρίμανση του 70% των λοβών (BBCH 30-87).	1 εφαρμογή κάθε 2 χρόνια 1 εφαρμογή τον χρόνο

Καπνός (ΝΙΟΤΑ)	Αφίδες <i>Myzus nicotianae</i> (MYZUNI), <i>Myzus persicae</i> (MYZUPE)	50	-	50-100	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προβολής από το στάδιο του δεύτερου πραγματικού φύλλου μέχρι τα συγκομίσιμα φύλλα φτάσουν το τελικό τους μέγεθος (BBCH 12-49)	1
Βαμβάκι GOSHI	Αφίδες <i>Aphis gossypii</i> (APHIGO)	37,5	-	20-60	Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής από την εμφάνιση του δεύτερου πραγματικού φύλλου μέχρι την έναρξη αποξήρανσης του φυλλώματος (BBCH 12-90)	1 εφαρμογή τον χρόνο
Καλλωπιστικά Βολβώδη (NNNZL) (Θ)	Αφίδες <i>Aphis fabae</i> (APHIFA)	50	-	50-100	Ψεκασμοί με την εμφάνιση της προσβολής από το πρώτο πραγματικό φύλλο/ζεύγος φύλλων (από BBCH 11).	4/7
Καλλωπιστικά (Θ): Ανθοκομικά και Πολυετή Καλλωπιστικά, Φυτώρια Δένδρων	Αφίδες <i>Aulacorthum solani</i> (AULASO), <i>Aphis fabae</i> (APHIFA), <i>Macrosiphum euphorbiae</i> (MACSEU), <i>Macrosiphum rosae</i> (MACSRO), <i>Myzus persicae</i> (MYZUPE), <i>Myzus ascalonicus</i> (MYZUAS), <i>Brachycaudus helichrysi</i> (ANURHE)	50	-	50-150	Ψεκασμοί με την εμφάνιση της προσβολής από το πρώτο πραγματικό φύλλο/ζεύγος φύλλων (από BBCH 11).	4/7
	Αλευρώδεις <i>Trialeurodes vaporariorum</i> (TRIAVA)	75	-	50-150		

Κολοκυνθοειδή (Θ): Αγγούρι CUMSA Κολοκύθι CCUPG Καρπούζι CITLA Κολοκύθα CCUMA Σολανώδη (Θ): Τομάτα LYPES Πτεριά CPSAN Μελιτζάνα SOLME	Αφίδες <i>Myzus persicae</i> (MYZUPE), <i>Macrosiphum euphorbiae</i> (MACSEU)	45 ανά ύψος φυτού 100 εκ.	60	75 λίτρα/ 100 εκ. ύψους φυτού	Ψεκασμοί με την εμφάνιση της προβολής από την εμφάνιση του δεύτερου πραγματικού φύλλου μέχρι την πλήρη ωρίμανση (BBCH 12-89) Μέγιστο ύψος καλλιέργειας 200 εκ.	2/10
	Αφίδες <i>Aphis gossypii</i> (APHIGO)	56 ανά ύψος φυτού 100 εκ.	75			
	Αλευρώδεις <i>Bemisia tabaci</i> (BEMITA), <i>Trialeurodes vaporariorum</i> (TRIAVA)					
Φράουλα (Θ) FRAAN	Αφίδες <i>Macrosiphum euphorbiae</i> (MACSEU), <i>Chaetosiphon fragaefolii</i> (CHTSFR), <i>Macrosiphum rosae</i> (MACSRO)	50	-	60-100	Ψεκασμοί φυλλώματος με την εμφάνιση της προβολής από το στάδιο του πέμπτου (5 ^{ου}) πραγματικού φύλλου μέχρι την πλήρη ωρίμανση των καρπών (BBCH 15-89)	2/10
	Αλευρώδεις <i>Trialeurodes vaporariorum</i> (TRIAVA)	62,5				
Σμέουρο/ Κόκκινο Βατόμουρο (Θ) (Raspberry) RUBID Μαύρο Βατόμουρο (Θ) (Blackberry) RUBFR	Αφίδες <i>Aphis idaei</i> (APHIID), <i>Aphis gossypii</i> (APHIGO)	50 για ύψος κόμης 100 εκ. 100 για ύψος κόμης 200 εκ.	100	50 100	Ψεκασμοί φυλλώματος με την εμφάνιση της προβολής από το στάδιο του πέμπτου (5 ^{ου}) πραγματικού φύλλου μέχρι την πλήρη ωρίμανση των καρπών (BBCH 15-89) Μέγιστο ύψος καλλιέργειας 200 εκ.	2/10
Παρατηρήσεις:						
- Πριν την εφαρμογή του σκευάσματος στα καλλωπιστικά να προηγείται δοκιμαστική εφαρμογή του σε μικρή κλίμακα.						

P405+102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.

P260: Μην αναπνέετε εκνεφώματα.

P270: Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο.

P284: Φοράτε μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής.

P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας, γάντια, μέσα ατομικής προστασία για πρόσωπο και μάτια κατά την ανάμιξη/φόρτωση και ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια κατά την εφαρμογή του σκευάσματος.

Σε περίπτωση επανεισόδου μετά τον ψεκάσμό φοράτε γάντια, μακρύ παντελόνι και πουκάμισο με μακριά μανίκια.

SP1: ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ. Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.

SPe2: Μην εφαρμόζετε το σκεύασμα σε αποστραγγιζόμενα εδάφη.

SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε από τα επιφανειακά ύδατα:

- φυτική ζώνη ανάσχεσης 5 μέτρων για την καλλιέργεια τομάτας (Υ), πιπεριάς (Υ), μελιτζάνας (Υ), αγγουριού (Υ), κολοκυθίου (Υ), κολοκύθας (Υ), καρπούζιου (Υ) και καπνού:
- φυτική ζώνη ανάσχεσης 10 μέτρων για την καλλιέργεια του αμπελιού,
- φυτική ζώνη ανάσχεσης 20 μέτρων για την καλλιέργεια της μηλιάς και της αχλαδιάς, με ταυτόχρονη χρήση ακροφύσιων μείωσης διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 75%»
- φυτική ζώνη ανάσχεσης 15 μέτρων για την καλλιέργεια του μαρουλιού (Υ).
- **φυτική ζώνη ανάσχεσης 20 μέτρων για τις καλλιέργειες ελιάς, ξηρού μπιζελιού και μπιζελιού με ή χωρίς λοβό.**
- **αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων ή να χρησιμοποιήσετε ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50%**

SPe3: Για να προστατέψετε τα αρθρόποδα μη-στόχους να αφήσετε:

- μια αψέκαστη ζώνη προστασίας από μη γεωργική γη 5 μέτρων για τις καλλιέργειες αμπέλι, τομάτα (Υ), πιπεριά (Υ), μελιτζάνα (Υ), αγγούρι (Υ), κολοκύθι (Υ), κολοκύθα (Υ) και καρπούζι (Υ) ή **χρησιμοποιήστε ακροφύσιων μείωσης της διασποράς κατά 50%.**
- **μια αψέκαστη ζώνη 15 μέτρων από μη γεωργική γη ή μία αψέκαστη ζώνη 5 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφύσιων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 75% ή να χρησιμοποιήσετε ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 80% για την καλλιέργεια της ελιάς.**
- μια αψέκαστη ζώνη 20 μέτρων από μη γεωργική γη ή 5 μέτρων, με ταυτόχρονη χρήση ακροφύσιων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 90%, για την καλλιέργεια της μηλιάς

13 Προστασία των καταναλωτών
Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Πεδίο Εφαρμογής	ΡΗΙ (σε ημέρες)
Μηλιά (0130000) -Αχλαδιά (0130020), Αμπέλι [Επιτραπέζιες ποικιλίες (0151010) , Οινοποιήσιμες ποικιλίες (0151020)] Ελιά [επιτραπέζιες(0161030) και Ελαιοποιήσιμες (0402010) ποικιλίες]	14
Τομάτα (Υ&Θ) (0231010), Πιπεριά (Υ&Θ) (0231020), Μελιτζάνα (Υ&Θ) (0231030), Αγγούρι (Υ&Θ) (0232010), Κολοκύθι (Υ&Θ) (0232030), Κολοκύθα (Υ&Θ) (0233020), Καρπούζι (Υ&Θ) (0233030), Μαρούλι (Υ) (0251020), Φράουλα (Θ) (0632010), Σμέουρο/ Κόκκινο Βατόμουρο (Θ) (0153030), Μαύρο Βατόμουρο (Θ) (0153010)	3
Μπιζέλι με λοβό (0260030) (Υ), Μπιζέλι χωρίς λοβό (0260040) (Υ), Μπιζέλι ξηρό (0300030) (Υ) <u>1 εφαρμογή κάθε χρόνο</u>	7
Μπιζέλι με λοβό (0260030) (Υ), Μπιζέλι χωρίς λοβό (0260040) (Υ), Μπιζέλι ξηρό (0300030) (Υ) <u>1 εφαρμογή κάθε 2 χρόνια</u>	Καθορίζεται από το χρόνο εφαρμογής (BBCH 12-19)
Βαμβάκι (0260030)	21
Καπνός, Καλλωπιστικά (Θ)	Μη εφαρμόσιμο

II. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθ. πρωτ. 8067/106364 Ο.Ε./09.08.2018 απόφαση μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ