



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 01.03.2022
Αριθ. πρωτ.: 206/6811

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 210 9287223
Πληροφορίες: Ι. Καλαϊτζόγλου
e-mail: ikalaitzoglou@minagric.gr

Προς: Agria S.A.
(Διά του υπεύθυνου επικοινωνίας της εταιρείας: ΤΟΥΤΟΥΤΖΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. - «AGRIBIZ».
Μιχαλακοπούλου 157, 11527, Αθήνα)
e-mail: a.toutoutzidakis@agribiz.gr

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) IPREAS (δ.ο. oxyfluorfen 24 % β/ο)»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 34 αυτού.
2. Το Νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής της 25^{ης} Μαΐου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών, όπως ισχύει.
4. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16^{ης} Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.
5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 της Επιτροπής της 8^{ης} Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
6. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23^{ης} Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως ισχύει.
7. Τη με αριθ. 70362 έγκριση του πανομοιότυπου φυτοπροστατευτικού σκευάσματος (ζιζανιοκτόνο) SMERCH (δ.ο. oxyfluorfen 24 % β/ο), η οποία χορηγήθηκε με την αριθ. πρωτ. 12661/303050/25.11.2019 Απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
8. Το Νόμο 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α' 45).
9. Το Νόμο 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
10. Τη με αριθ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β' 4612/19-10-20).
11. Τη με αριθμό πρωτ. 206/6811/11.01.2022 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

A Χορηγούμε άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 34 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **IPPEAS** της εταιρείας **Agria S.A.** με τα ακόλουθα στοιχεία:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος**Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)**

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης
1.1.β Ημερομηνία λήξης

70447
01.03.2022
31.12.2025

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

- 1.2.α Εμπορικό όνομα
1.2.β Μορφή

IPPEAS
Γαλακτωματοποιήσιμο συμπύκνωμα (EC)

1.3 Δραστική ουσία

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO

Oxyfluorfen

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία

97 % (β/β) min

Χημική ομάδα

Διφαινυλαιθέρων

Παρασκευαστής

Agria S.A.
Asenovgradsko Shose 4009, Plovdiv, Βουλγαρία
Mr. Plamen Alexandrov
Τηλ.: +35 929150500
Fax: +35 929150555
Email: palexandrov@agria.bg

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:

YIFAN BIOTECHNOLOGY GROUP CO., LTD
No.136 Zhongxing Road,
Wenzhou Industrial Zone,
Zhejiang, Κίνα

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας Oxyfluorfen, όπως αυτές κατατέθηκαν με τη με αριθ. πρωτ. 12471/166134/30.11.2018 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας για το πανομοιότυπο σκεύασμα SMERCH είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

Agria S.A.

Asenovgradsko Shose 4009, Plovdiv, Βουλγαρία
 Mr. Plamen Alexandrov
 Τηλ.: +35 929150500
 Fax: +35 929150555
 Email: palexandrov@agria.bg

β) Υπεύθυνος επικοινωνίας:

ΤΟΥΤΟΥΤΖΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. - «AGRIBIZ»

Μιχαλακοπούλου 157, 11527, Αθήνα
 Τηλ.: +30 2107471000
 E-mail: a.toutoutzidakis@agribiz.gr

γ) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

NITROFARM S.A.

ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδος, Κτίριο 35-55, Είσοδος Α, Τετράγωνο 20, ΤΚ 57022, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
 Τηλ.: +30 2310 553354-7
 Fax: +30 2310 545235
 E-mail: info@nitrofarm.gr

δ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

Agria S.A.

Asenovgradsko Shose 4009,
 Plovdiv, Βουλγαρία

ε) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:

1. Agria S.A.

Asenovgradsko Shose 4009, Plovdiv, Βουλγαρία

2. YIFAN BIOTECHNOLOGY GROUP CO., LTD

No.136 Zhongxing Road, Wenzhou Industrial Zone,
 Zhejiang, Κίνα

στ) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος:

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1. Agria S.A.

Asenovgradsko Shose 4009, Plovdiv, Βουλγαρία

2. NITROFARM S.A.

ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδος, Κτίριο 35-55, Είσοδος Α, Τετράγωνο 20, ΤΚ 57022, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

ζ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία: Oxyfluorfen 24 % β/ο**Βοηθητικές ουσίες:** 76,6% β/β

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως αυτή κατατέθηκε με το με αριθ. πρωτ. 12471/166134/30.11.2018 έγγραφο της ενδιαφερόμενης εταιρείας, για το πανομοιότυπο σκεύασμα SMERCH είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

2 Συσκευασίες

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλη	60 κ.εκ. έως 1 λίτρο	HDPE-COEX
2	Φιάλη μέσα σε κουτί	60 κ.εκ. έως 600 κ.εκ.	HDPE-COEX
	Δοχεία	1 λίτρο έως 25 λίτρα	Κουτί χάρτινο

3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής: Εφαρμόζεται με ψεκασμό κοντά στο έδαφος, σε λωρίδες που καλύπτουν το 30% της συνολικής επιφάνειας του αγρού, από το φθινόπωρο έως τις αρχές της άνοιξης, με ακροφύσιο τύπου σκούπας και πίεση 2 - 3 Atm.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Ανακινείτε καλά τη φιάλη ή το δοχείο, πριν τη χρήση. Γεμίστε το ψεκαστικό δοχείο μέχρι τη μέση με νερό και προσθέστε την συνιστώμενη ποσότητα σκευάσματος. Προσθέστε το υπόλοιπο νερό υπό συνεχή ανάδευση. Η εφαρμογή πρέπει να γίνεται υπό συνεχή ανάδευση.

Καθαρισμός ψεκαστήρα: Αμέσως μετά την εφαρμογή αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Καθαρίστε σχολαστικά το βυτίο και όλα τα μέρη του ψεκαστικού, γεμίζοντας το βυτίο με νερό (τουλάχιστον 10% του συνολικού όγκου του) και αδειάζοντας το βυτίο μέσω του ψεκαστήρα συμπεριλαμβανομένων ακροφυσίων και βραχιόνων και γραμμών ψεκασμού. Επαναλάβετε την διαδικασία 2 φορές.

Συνδυαστικότητα: Να μη συνδυάζεται με άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Εφαρμόζεται μόνο του.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: τα κενά μέσα συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, να εναποτεθούν σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων πλατύφυλλων και αγρωστωδών ζιζανίων, προφυτρωτικά ή νωρίς μεταφυτρωτικά. Εφαρμόζεται με ψεκασμό κοντά στο έδαφος, σε λωρίδες που καλύπτουν το 30% της συνολικής επιφάνειας του αγρού, από το φθινόπωρο έως τις αρχές της άνοιξης.

5 Φάσμα δράσης					
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών / καλλιεργ. περίοδο
		κ.εκ./ στρ.	κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού		
Εσπεριδοειδή Πορτοκαλιά (CIDSΙ) Μανταρινιά (CIDRE) Λεμονιά (CIDLI) Γκρέιπ φρουτ (CIDPA) Κίτρο (CIDAU)	Ετήσια πλατύφυλλα και αγρωστώδη ζιζάνια	62,5	20 - 50	Ψεκάσμος κοντά στο έδαφος, σε λωρίδες που καλύπτουν το 30% της συνολικής επιφάνειας του αγρού, από το φθινόπωρο έως τις αρχές της άνοιξης, και όχι μετά τις 30 Απριλίου.	1
Μηλοειδή Μηλιά (MABSD) Αχλαδιά (PYUCO) Κυδωνιά (CYDOB) Μουσμουλιά (MSPGE) Αχλαδόμηλα (PYUPC)	Ετήσια πλατύφυλλα και αγρωστώδη ζιζάνια	62,5	20 - 50	Ψεκάσμος κοντά στο έδαφος σε λωρίδες που καλύπτουν το 30% της συνολικής επιφάνειας του αγρού, από το φθινόπωρο έως τις αρχές της άνοιξης, κατά το λήθαργο (BBCH 00). Μην εφαρμόζετε το σκεύασμα μετά τις 30 Απριλίου.	1
Ελιά (OLVEU)	Ετήσια πλατύφυλλα και αγρωστώδη ζιζάνια	62,5	20 - 50	Ψεκάσμος κοντά στο έδαφος σε λωρίδες που καλύπτουν το 30% της συνολικής επιφάνειας του αγρού, από το φθινόπωρο έως τις αρχές της άνοιξης, και όχι μετά τις 30 Απριλίου.	1
Αμπέλι Οινοποιήσιμα, Επιτραπέζια (VITVI)	Ετήσια πλατύφυλλα και αγρωστώδη ζιζάνια	62,5	20 - 50	Ψεκάσμος κοντά στο έδαφος σε λωρίδες που καλύπτουν το 30% της συνολικής επιφάνειας του αγρού, από το φθινόπωρο έως τις αρχές της άνοιξης, κατά το λήθαργο (BBCH 00). Μην εφαρμόζετε το σκεύασμα μετά τις 30 Απριλίου.	1

Ηλιάνθος (HELAN)	Ετήσια πλατύφυλλα και αγρωστώδη ζιζάνια	62,5	30 - 60	Ψεκασμός προφυτρωτικά κοντά στο έδαφος, στην γραμμή σποράς, σε λωρίδες πάνω στην γραμμή φύτευσης της καλλιέργειας. Μην εφαρμόζετε το σκεύασμα μετά τις 30 Απριλίου.	1
<p>ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:</p> <ol style="list-style-type: none"> Εφαρμόζεται με ψεκασμό κοντά στο έδαφος, σε λωρίδες που καλύπτουν το 30% της συνολικής επιφάνειας του αγρού Η συνολική ποσότητα δ.ο./ έτος δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 15 γραμ. δ.ο./ στρ. Για τις επιτραπέζιες ελιές επιτρέπεται η συλλογή τους μόνο από το δένδρο. Να μη συλλέγονται ελιές από το έδαφος προκειμένου να αποφευχθούν υπολείμματα. <p>Καταπολεμούμενα ζιζάνια: Ευαίσθητα ζιζάνια (>85%): Βλήτα (<i>Amaranthus blitoides</i> – AMABL), (<i>Amaranthus retroflexus</i> – AMARE) Καλεντούλα (<i>Calendula arvensis</i>) CLDAR, Λουβουδιά (<i>Chenopodium album</i> – CHEAL) Περιπλοκάδα (<i>Convolvulus arvensis</i> - CONAR, (<i>Convolvulus althaeoides</i> –CONAL) (<i>Diploaxis erucoides</i> –DIPER), (<i>Diploaxis muralis</i> –DIPMU) Μουχρίτσα (<i>Echinochloa crus-galli</i> – ECHCG) Αναρριχώμενο πολίγωνο (<i>Fallopia convolvulus</i> – POLCO) Ήρες (<i>Lolium multiflorum subsp. gaudini</i> – LOLMG), (<i>Lolium rigidum</i> – LOLRI) Μολόχα (<i>Malva sylvestris</i> – MALSΙ), Κοινή πόα (<i>Poa annua</i> – POAAN) Πολυκόμπι (<i>Polygonum aviculare</i> – POLAV) Αντράκλα (<i>Portulaca oleracea</i>) POROL) Μαρτιάκος (<i>Senecio vulgaris</i> – SENVU) Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια (70-85%): Ζοχός (<i>Sonchus sp.</i> – SONSS)</p>					

6 Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Διαχείριση Ανθεκτικότητας

Το σκεύασμα περιέχει οξυfluorfen, ένα ζιζανιοκτόνο που ανήκει στην **ομάδα Ε κατά HRAC**.

Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας συνιστάται η εναλλαγή ζιζανιοκτόνων με διαφορετικό τρόπο δράσης ή/ και εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα).

7 Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προ-στατευόμενης καλλιέργειας:
- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

--

Στο ίδιο χωράφι μπορεί να σπαρούν/ φυτευτούν, οι εξής καλλιέργειες:

- τομάτα, βρώμη, ζαχαρότευτλα μετά την παρέλευση 2 χρόνων και 4 μηνών (840 ημερών).
- κρεμμύδι μετά την παρέλευση 4 χρόνων και 8 μηνών (1680 ημερών).
- ελαιοκράμβη μετά την παρέλευση 1 χρόνου και 6 μηνών (540 ημερών).


- της πρόσβασης του ανθρώπου
ή των ζώων στην καλλιέργεια
στην οποία έχει εφαρμοστεί το
σκεύασμα:

Μην εισέρχετε στον αγρό για 7 ημέρες μετά την εφαρμογή του
σκευάσματος.

8 Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας
ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας
στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Σε ευαίσθητες καλλιέργειες, μπορεί να προκληθεί
φυτοτοξικότητα από την διασπορά σταγονιδίων του
ψεκαστικού υγρού. Στον ηλιάνθο μπορεί να παρατηρηθούν
παροδικά συμπτώματα φυτοτοξικότητας (χλώρωσης).

9 Εικονογράμματα Κινδύνου:



10 Δηλώσεις
Επικινδυνότητας:

H304: Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης
στις αναπνευστικές οδούς.

H319: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.

H336: Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.

H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες
επιπτώσεις.

EUH066: Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή
σκάσιμο.

EUH401: Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το
περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

11 Δηλώσεις προφύλαξης

P405 + P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.

P261: Αποφεύγετε να αναπνέετε συγκεντρώσεις σταγονιδίων/ εκνεφώματα.

P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα
ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο.

*Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση και
τον ψεκασμό.*

Φοράτε μάσκα κατά την ανάμιξη/ φόρτωση.

*Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια φοράτε ολόσωμη προστατευτική
ενδυμασία και γάντια.*

P501: Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Sp1: Μη ρυπαίνεται τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

SPe3: Για να προστατέψετε τους **υδρόβιους οργανισμούς** να αφήσετε από τα
επιφανειακά ύδατα:

- **αψέκαστη ζώνη προστασίας 30 μέτρων που να συμπεριλαμβάνει 20 μέτρα φυτική ζώνη ανάσχεσης** σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50% στην ελιά και στο αμπέλι.
- **μία φυτική ζώνη ανάσχεσης 20 μέτρων στον ηλιάνθο.**

- **μία φυτική ζώνη ανάσχεσης 20 μέτρων** σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50% στα εσπεριδοειδή και μηλοειδή

SPe3: Για να προστατέψετε τα **αρθρόποδα μη στόχους** να αφήσετε μια αφέκαστη ζώνη προστασίας από μη γεωργική γη:

- **5 μέτρων** στον ηλιάνθο.
- **5 μέτρων** σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50% στα εσπεριδοειδή, μηλοειδή, στην ελιά και στο αμπέλι.

SPe3: Για να προστατέψετε τα **φυτά μη στόχους** να αφήσετε μια αφέκαστη ζώνη προστασίας από μη γεωργική γη:

- **10 μέτρων** σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 75% ή **5 μέτρων** σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 90% στον ηλιάνθο.
- **10 μέτρων** σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 90% στα εσπεριδοειδή, μηλοειδή, στην ελιά και στο αμπέλι.

12 Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο:

P301+P310+P331: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: καλέστε αμέσως το Κέντρο Δηλητηριάσεων ή ένα γιατρό. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.

P312: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΔΙΑΘΕΣΙΑΣ: Καλέστε το Κέντρο Δηλητηριάσεων ή ένα γιατρό.

P337+P313: Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Σε περίπτωση δηλητηρίασης ακολουθείται συμπτωματική θεραπεία.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 - 7793777

13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Πορτοκάλια (0110020) Μανταρίνια (0110050) Λεμόνια (0110030) Γκρέιπ φρούτ (0110010) Κίτρο (0110020-002) Ελιά επιτραπέζια (0161030) Ελιά ελαιοποιήσιμη (0402010)	21
Μηλιά (0130010) Αχλαδιά (0130020) Κυδωνιά (0130030) Μουσμουλιά (0130040) Αχλαδόμηλα (0130020-001) Σταφύλια οινοποιήσιμα (0151020) Σταφύλια επιτραπέζια (0151010) Ηλιάνθος (0401050)	Δεν ορίζεται λόγω του χρόνου εφαρμογής.

- 14** Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:

Στην αρχική απαραβίαστη συσκευασία του, καλά κλειστό, σε μέρος ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο, μακριά από άμεση έκθεσή στο ηλιακό φως, παραμένει σταθερό για 2 (δύο) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.

15 Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

16 Κατάλογος προστατευομένων μελετών

Στο Παράρτημα ΙΙΙ του πανομοιότυπου φυτοπροστατευτικού (ζιζανιοκτόνο) SMERCH (δ.ο. oxyfluorfen 24 % β/ο), με αριθμό έγκρισης 70362 και αριθμό πρωτ. 12661/303050/25.11.2019 όπως ισχύει, καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

17 Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών

--

B Γενικές υποχρεώσεις:

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική Επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίζει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ

**Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

ΔΡ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ