



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 07.04.2022
Αριθ. πρωτ: 2387/72062

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Δ. Καραμάνου
Τηλέφωνο: 210 92 87 228
e-mail: dkaramanou@minagric.gr

Προς: SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μον. Α.Ε.
Βασιλέως Κωνσταντίνου 32
Τ.Κ. 19400 Κορωπί
email: info@sipcam.gr

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) BIOLID UP (δ.ο. paraffin oil (CAS 97862-82-3) 80 % β/ο)»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον υπ' αρ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) Κανονισμό (ΕΚ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 40 αυτού.
2. Το ν. 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Τον υπ' αρ. 540/2011 Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τον υπ' αρ. 2021/1449 Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) της Επιτροπής της 3ης Σεπτεμβρίου 2021 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών 2-phenylphenol (συμπεριλαμβανομένων των αλάτων της, όπως του άλατος νατρίου), 8-hydroxyquinoline, amidosulfuron, bifenox, chlormequat, chlorotoluron, clofentezine, clomazone, cypermethrin, daminozide, deltamethrin, dicamba, difenoconazole, diflufenican, dimethachlor, etofenprox, fenoxaprop-P, fenpropidin, fludioxonil, flufenacet, fosthiazate, indoxacarb, lenacil, MCPA, MCPB, nicosulfuron, **παραφινέλαια**, παραφινέλαιο, penconazole, picloram, propaquizafop, prosulfocarb, quizalofop-P-ethyl, quizalofop-P-tefuryl, sulphur, tetraconazole, tri-allate, triflurosulfuron και tritosulfuron.
5. Τον υπ' αρ. 547/2011 Κανονισμό (ΕΕ) της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
6. Τον υπ' αρ. 396/2005 Κανονισμό (ΕΚ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Τον υπ' αρ. 1272/2008 Κανονισμό (ΕΚ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των

μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.

8. Τη από 4/2019 σχετική Έκθεση Αξιολόγησης της Αρμόδιας Αρχής Αξιολόγησης της Ιταλίας για το σκεύασμα BIOLID UP (αρ. έγκρισης: 014636).
9. Το ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
10. Το ν. 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
11. Τη με αριθ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β' 4612/19-10-20).
12. Τις με αρ. πρωτ. 13153/314150/04.12.2019 και 2387/72062/17.03.2022 αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

A Χορηγούμε άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 40 του Κανονισμού 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) **BIOLID UP (δ.ο. paraffin oil (CAS 97862-82-3) 80 % β/ο)**, της εταιρείας **SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μον. ΕΠΕ**, με τα ακόλουθα στοιχεία:

ς

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης:
- 1.1.β Ημερομηνία λήξης:

14799

07.04.2022

31.12.2023

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

- 1.2.α Εμπορικό όνομα:
- 1.2.β Μορφή:

BIOLID UP

Εναιώρημα, λάδι σε νερό (EO)

1.3 Δραστικές ουσίες

Δραστική ουσία 1

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO:

Paraffin oil (Cas 97862-82-3)

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

100 % β/β

Χημική ομάδα:

Υδρογονάνθρακες

Παρασκευαστής της δ.ο. :

TOTAL Fluides S.A.S

24 cours Michelet, 92800 Puteaux, Γαλλία

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1. Refinery OUDALLE –TOTAL Fluides Z.I.

du Havre Route du canal de Tancarville 76430 St Romain-de-Colbosc, Γαλλία

2. Petrochemical Industrial Distillation BU

Odfjell Terminals Rotterdam B.V. Oude Maasweg 6, Port 40403197 KJ BOTLEK Rotterdam, Ολλανδία

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας προσδιορίζονται στο με αριθ. πρωτ. 13153/314151/04.12.2019 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μον. Α.Ε.
Βασιλέως Κωνσταντίνου 32
Τ.Κ. 19400 Κορωπί
Τηλ.: 210 5223 834
Fax: 210 5223 139
E-mail: info@sipcam.gr

α) Υπεύθυνος επικοινωνίας:

SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μον. Α.Ε.
Βασιλέως Κωνσταντίνου 32
Τ.Κ. 19400 Κορωπί
Τηλ.: 210 5223 834
Fax: 210 5223 139
E-mail: info@sipcam.gr

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μον. Α.Ε.
Βασιλέως Κωνσταντίνου 32
Τ.Κ. 19400 Κορωπί
Τηλ.: 210 5223 834
Fax: 210 5223 139
E-mail: info@sipcam.gr

Σε περίπτωση μελλοντικής τροποποίησης της παρούσας άδειας ως προς το εν λόγω σημείο, ο ανωτέρω υπεύθυνος διάθεσης θα έχει και την ευθύνη για τα υπάρχοντα αποθέματα του σκευάσματος που παρήχθησαν ή/και κυκλοφόρησαν στην ελληνική αγορά μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής απόφασης τροποποίησης. Για τις ποσότητες του σκευάσματος που θα παραχθούν και θα κυκλοφορήσουν στην αγορά από την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης τροποποίησης και μετά, την ευθύνη θα φέρει ο νέος υπεύθυνος διάθεσης.

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

SIPCAM OXON S.p.A.
Via Vittorio Veneto, 81,
26857 Salerano sul Lambro (LO), Ιταλία

δ) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1. **SIPCAM OXON S.p.A.**
Via Vittorio Veneto 81,
26857 Salerano sul Lambro (LO), Ιταλία
2. **ΤΕΧΝΟΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε.**
Νέα Σάντα Κιλκίς, Τ.Κ. 56403

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος:

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1. **SIPCAM OXON S.p.A.**
Via Vittorio Veneto 81,
26857 Salerano sul Lambro (LO), Ιταλία

2. ΤΕΧΝΟΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε.
 Νέα Σάντα Κιλκίς, Τ.Κ. 56403
3. ΕΛΛΑΓΡΕΤ Α.Β.Ε.Ε.
 Θέση Ξηροπήγαδο, Μάνδρα Αττικής

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία: paraffin oil (CAS 97862-82-3) 80% β/β
Βοηθητικές ουσίες: 20 % β/β

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως αυτή κατατέθηκε με το με αριθ. πρωτ. 13153/314151/04.12.2019 έγγραφο της ενδιαφερομένης εταιρείας είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

2 Συσκευασίες:

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1.	Φιάλη	50 κ.εκ. έως 1 λίτρα	HDPE
2.	Δοχείο	1.2 λίτρα έως 50 λίτρα	HDPE
3.	Βαρέλι	200 λίτρα, 1000 λίτρα	HDPE

3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής: Ομοιόμορφος ψεκασμός φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Ανακινήστε καλά το προϊόν πριν τη χρήση. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος κατά 30-50%. Προσθέστε την συνιστώμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό και συνεχίστε την ανάδευση καθ'όλη την διάρκεια του ψεκασμού.

Καθαρισμός ψεκαστήρα: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού μηχανήματος με καθαρό νερό (200-400 λίτρα). Επαναλάβετε δύο φορές.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα: --

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Εντομοκτόνο-ακαρεοκτόνο επαφής. Δρα με φυσικό τρόπο δημιουργώντας ένα φιλμ το οποίο προκαλεί ασφυξία των εντόμων στόχων (ακμαίων, προνυμφών και αυγών).

5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών
		Κ.εκ./ στρέμμα (max)	κ.εκ/ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λιτρα / στρέμμα		
Μηλοειδή: Μηλιά MABSD Αχλαδιά PYUCO	Ψώρα Σαν Ζοζέ <i>Quadraspidiotu s perniciosus</i> (QUADPE)	1500-3000	1500-2000	150	Με την έναρξη του ανοίγματος των οφθαλμών έως το στάδιο της προχωρημένης ωρίμανσης – χρωματισμού των καρπών BBCH 7-85	1
		2500	2500	100		1-2/15
Πυρηνόκαρπα: Ροδακινιά PRNPS Δαμασκηλιά PRNDO Κερασιά PRNAV Βερικοκιά PRNAR	Ψώρα Σαν Ζοζέ <i>Quadraspidiotu s perniciosus</i> (QUADPE)	1000-2250	1000-1500	150	Με την έναρξη του ανοίγματος των οφθαλμών έως το στάδιο της προχωρημένης ωρίμανσης – χρωματισμού των καρπών BBCH 7-85	1
		1000	1000	100		1-2/20
Εσπεριδοειδή: Πορτοκαλιά CIDSI Μανταρινιά CIDRE Λεμονιά CIDLI	Τετράνυχος <i>Panonychus citri</i> (METTCI) Κοκκοειδή (Κόκκινη ψώρα και άλλες ψώρες) <i>Aonidiella aurantii</i> (AONDAU) Ψώρα Σαν Ζοζέ <i>Quadraspidiotu s perniciosus</i> (QUADPE)	1000-2250	1000-1500	200	Από το άνοιγμα των οφθαλμών μέχρι την προχωρημένη ωρίμανση BBCH 1-85	1
		740-1500	370-750			1-2/15

Ανθοκομικά, Καλλωπιστικά	Κηροπλάστης <i>Ceroplastes sp.</i> (CERPSP)	1200- 1800	1200- 1800	100	Εφαρμόζεται Άνοιξη (με την έναρξη της βλάστησης). Καλοκαίρι.- Φθινοπώρου. Χειμώνα BBCH 1-89	1-2/15
Ακρόδρυα: Φουντουκιά CYLAV Καρυδιά IUGRE Αμυγδαλιά PRNDU	Κοκκοειδή (Κόκκινη ψώρα και άλλες ψώρες) <i>Aonidiella aurantii</i> (AONDAU) Τετράνυχοι <i>Panonychus ulmi</i> (METTUL)	1000- 2250	1000- 1500	150	Από την πτώση των σεπάλων έως την έναρξη χρωματισμού των καρπών BBCH 7-85 .	1
		1000	1000	100		1-2/20
Ακτινιδιά ATICH Συκιά FIUCA Λωτός DOSKA	Κοκκοειδή (Κόκκινη ψώρα και άλλες ψώρες) <i>Aonidiella aurantii</i> (AONDAU) Ψώρα Σαν Ζοζέ <i>Quadraspidiotu s perniciosus</i> (QUADPE)	1000- 2000	1000- 2000	100	Από το στάδιο των μπουμπουκιών έως το περικάρπιο γίνεται διαφανές και χρυσοκίτρινο BBCH 7-85	1
		1000- 1500	1000- 1500			1-2/30
Παρατηρήσεις:						
<ol style="list-style-type: none"> 1. Το εύρος των δόσεων εξαρτάται από τη ένταση της προσβολής. 2. Κατά τη χρήση του σκευάσματος τα δένδρα πρέπει να είναι ποτισμένα. Να ποτίζονται μία εβδομάδα πριν από τον ψεκασμό. 3. Αποφύγετε τον ψεκασμό όταν τα φυτά είναι στρεσαρισμένα, σε περιόδους έντονης ξηρασίας, υπερβολικής υγρασίας, όταν υπάρχει παγετός και όταν φυσάει άνεμος. 4. Να μη γίνεται εφαρμογή με το σκεύασμα όταν η θερμοκρασία ξεπερνάει τους 32-34°C. 						

6 Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

- Δεν συνδυάζεται με ισχυρά αλκαλικά σκευάσματα, θείο, captan, folpet, **fosetyl-aluminium**, **ασβέστη**, **meptyl-dinocap**, **καρβαμιδικά**, **βορδιγάλιο πολτό**, διαφυλλικά λιπάσματα.
- Δεν έχει ελεγχθεί η συνδυαστικότητα του με άλλα σκευάσματα.
- Χρησιμοποιείτε το προϊόν:
 - α) 21 ημέρες μετά από εφαρμογές με θείο, meptyl-dinocap,
 - β) 14 ημέρες μετά από εφαρμογές με captan & fosetyl-aluminium
 - γ) 7 ημέρες μετά από εφαρμογές με dithianon & pirimicarb

Διαχείριση ανθεκτικότητας:

Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική ουσία paraffin oil, η οποία δεν έχει εξειδικευμένο τρόπο δράσης. Δεν αναμένεται ανάπτυξη ανθεκτικότητας.

7 Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προσ-
τατευόμενης καλλιέργειας:

- σποράς ή φύτευσης των
καλλιεργειών που ακολουθούν

- της πρόσβασης του ανθρώπου
ή των ζώων στην καλλιέργεια
στην οποία έχει εφαρμοστεί το
σκεύασμα

Μην εισέρχεστε στην ψεκασμένη περιοχή πριν στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό υγρό από τις επιφάνειες των φύλλων.

8 Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Δεν είναι φυτοτοξικό στις προτεινόμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.

9 Εικονογράμματα κινδύνου:

--

10 Δηλώσεις επικινδυνότητας:

ΕΥΗ208: Περιέχει 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
ΕΥΗ401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης

11 Δηλώσεις
προφύλαξης:

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.
P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

SP1: ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ (Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους).

SPe 3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας από τα επιφανειακά ύδατα ως εξής:

- **12 μέτρων** στην καλλιέργεια των Μηλοειδών
- **10 μέτρων** στις καλλιέργειες Εσπεριδοειδών, Συκιάς, Λωτού, Ακτινιδιάς
- **7 μέτρων** στις καλλιέργειες Πυρηνόκαρπων, Αμυγδαλιάς, Φουντουκιάς, Καρυδιάς

SPe8: Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία ή κατά την περίοδο ανθοφορίας ζιζανίων. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν.

12 Πρώτες βοήθειες –
Αντίδοτο

Γενικές πληροφορίες
 Αφαιρέστε αμέσως όλα τα εμποτισμένα με το προϊόν ρούχα.
 Συμπτώματα δηλητηρίασης μπορεί να εμφανιστούν μετά από αρκετές ώρες, γι' αυτό το λόγο χρειάζεται ιατρική παρακολούθηση για τουλάχιστον 48 ώρες.

Σε περίπτωση εισπνοής: Παρέχετε καθαρό αέρα ή οξυγόνο. Σε περίπτωση συμπτωμάτων συμβουλευτείτε γιατρό. Σε περίπτωση λιποθυμίας τοποθετήστε τον ασθενή σε σταθερή πλάγια θέση για τη μεταφορά .

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα : Πλύνετε αμέσως με νερό και σαπούνι και ξεπλύνετε καλά.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια : Πλύνετε τα μάτια, κρατώντας τα ανοικτά, για αρκετά λεπτά κάτω από τρεχούμενο νερό. Συμβουλευθείτε γιατρό.

Σε περίπτωση κατάποσης: Μην προκαλείτε εμετό για να αποφευχθεί ο κίνδυνος της εισρόφησης από την αναπνευστική οδό. Καλέστε αμέσως γιατρό.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείται συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Καλλιέργειες	Ημέρες
Ανθοκομικά, Καλλωπιστικά	Δεν ορίζεται
Ακτινιδιά (0162010), Συκιά (0161020), Λωτός (0161060) Φουντουκιά (0120060), Καρυδιά (0120110), Αμυγδαλιά (0120010) Πορτοκαλιά (0110020), Μανταρινιά (0110050), Λεμονιά (0110030) Ροδακινιά (0140030), Δαμασκηνιά (0140040), Κερασιά (0140020), Βερικοκιά (0140010) Μηλιά (0130010), Αχλαδιά (0130020)	20

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Διατηρείτε στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία, σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο περιβάλλον,. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.

15 Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

16 Κατάλογος προστατευομένων μελετών

Στο **Παράρτημα III** καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων

17 Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών

Ο κάτοχος της έγκρισης οφείλει εντός 24 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης να προσκομίσει στην ΣΕΑ τις μελέτες/συμπληρωματικά στοιχεία:

1. An analytical method for the determination of Paraffin oil residues in crops and foodstuff of animal origin for monitoring purposes are required, by the renewal of the a.s., according to the residue definition and in line with the MRL.
2. For surface water a method is required for alkanes (chain lengths up to C 31). An analytical is required by the renewal of the a.s.

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει τη ΣΕΑ για οποιοσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στη ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα απόφαση και θα πρέπει να προσκομιστεί εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της παρούσης.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στη ΣΕΑ τελική ετικέτα, μόνο ηλεκτρονικά, πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στη ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ