

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 24.05.2022
Αριθ. πρωτ: 4639/130781

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
FAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Ν. Αβραμίδης
Τηλέφωνο: 210 92 87 224
e-mail: navramidis@minagric.gr

Προς: Certis Europe B.V.
(διά του υπευθύνου επικοινωνίας,
της εταιρείας,
K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Μ.ΑΒΕΕ
ΒΙ.ΠΕ.Θ., Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 57022
e-mail: l.vellis@efthymiadis.gr)

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της με αριθμό 14726 άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) Eradicoat Max (δ.ο. maltodextrin 47,6% β/ο), ως προς το φάσμα δράσης, την ταξινόμηση και επισήμανση, την προστασία των καταναλωτών καθώς επίσης και την κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών του σκευάσματος.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 45 αυτού.
2. Το ν. 4036/2012 (Α' 8/27.) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 540/2011 της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών, στον οποίο έχει συμπεριληφθεί η δραστική ουσία **maltodextrin**, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 547/2011 της Επιτροπής της 8^{ης} Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
5. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1907/2006.
7. Το ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α' 45).
8. Το ν. 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
9. Τη με αριθ. 1881/286212/13.10.2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β' 4612/19.10.20).

10. Την έγκριση και αξιολόγηση (LEX) του όμοιου σκευάσματος Eradicoat Max από την Μάλτα (άδεια με αριθμό έγκρισης: 2020-06-22 P01 (SZ)).
11. Τη με αριθμό πρωτ. 1447/45943/12.02.2021 αίτηση και τα με αριθμό πρωτ. 9041/251654/16.09.2021 και 4639/130781/17.05.2022 συμπληρωματικά στοιχεία της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- I. Τροποποιούμε τη με αριθμό 14726 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) Eradicoat Max (δ.ο. maltodextrin 47,6% β/ο), η οποία χορηγήθηκε με την υπ. αριθ. πρωτ. 7301/175199/23.10.2019, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως προς το φάσμα δράσης, την ταξινόμηση και επισήμανση, την προστασία των καταναλωτών καθώς επίσης και την κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών του σκευάσματος.

Το σημείο **17 απαλείφεται** και τα σημεία **5, 9, 10, 11, 12** και **13** διαμορφώνονται ως εξής:

5 Φάσμα δράσης:

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες
		Λίτρα /στρ. (max)	Λίτρα /100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα		
Καλλιέργειες θερμοκηπίου (Θ)*	Αλευρώδεις (<i>Trialeurodes vaporariorum</i> - TRIAVA, <i>Bemisia tabaci</i> - BEMITA) Τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i> - TETRUR)	6	2	20-300	Ψεκασμοί φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών κατά τη διάρκεια όλης της καλλιεργητικής περιόδου.	20/3
Εσπεριδοειδή : Πορτοκαλιά CIDSΙ, Λεμονιά CIDLI, Μανταρινιά CIDRE, Γκρέιπφρουτ CIDPA, Πράσινο λεμόνι (Λάιμ) CIDAF	Τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i> - TETRUR, <i>Panonychus citri</i> - METTCI) Κοκκοειδή (<i>Planococcus sp.</i> - PLANSP, <i>Icerya purchasi</i> - ICERPU, <i>Delottococcus aberia</i> - DLTCAB)	4,5	1-1,5	100-300	Ψεκασμοί φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το τέλος της άνθησης έως τη συγκομιδή. BBCH 69-89	5/5
Αχλάδια PYUCO	Ψύλλα αχλαδιάς (<i>Cacopsylla pyri</i> - PSYLPI)	3	1,5-2	100-150	Ψεκασμοί φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το τέλος της άνθησης έως τη συγκομιδή. BBCH 69-89	5/5

Αμπέλι (επιτραπέζιες ποικιλίες) VITVI	Κοκκοειδή (<i>Planococcus ficus</i> - PLANFI, <i>Planococcus citri</i> - PSECCI)	2,25	1-1,5	50-150	Ψεκασμοί φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το τέλος της άνθησης έως τη συγκομιδή. BBCH 69-89	5/5
Αμπέλι (οινοποιήσιμες και επιτραπέζιες ποικιλίες) VITVI	Ακάρεα - <i>Eryophiidae</i> (<i>Calepitrimerus vitis</i> - PHYCVI, <i>Colomerus sp.</i> - COOMSP, <i>Colomerus vitis</i> - ERPHVI)				Ψεκασμοί φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από την έναρξη διόγκωσης των οφθαλμών έως την εμφάνιση των ταξιανθιών. BBCH 01-53	
Μαρούλια και σαλατικά (Υ): Μαρούλι (Υ) LACSA, Ρόκα (Υ) ERUVE, Κόκκινο σινάπι (Υ) BRSJR, Κάρδαμο (Υ) LEPSA Γαιοκάρδαμο (Υ) BARVE Σπανάκι (Υ) SPQOL, Σέσκουλα/φύλλα τεύτλων (Υ) BEAVF, Σκαρόλες (πικρίδα)/ πλατύφυλλα αντίδια (Υ) CICEL	Αφίδες (<i>Nasonovia ribisnigri</i> - NASORN, <i>Aphis fabae</i> - APHIFA, <i>Macrosiphum euphorbiae</i> - MACSEU)	3	1,5-2	20-150	Ψεκασμοί φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών κατά τη διάρκεια όλης της καλλιεργητικής περιόδου. BBCH 00-89	5/3
Φράουλα (Υ) FRAAN	Τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i> - TETRUR)	3	1,5-2	20-150	Ψεκασμοί φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών κατά τη διάρκεια όλης της καλλιεργητικής περιόδου. BBCH 00-89	5/3
Σολανώδη: Τομάτα (Υ) LYPES, Μελιτζάνα (Υ) SOLME, Πιπεριά (Υ) CPSAN	Τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i> - TETRUR) Αλευρώδεις (<i>Bemisia tabaci</i> - BEMITA, <i>Trialeurodes vaporariorum</i> - TRIAVA)	3	1,5-2	20-150	Ψεκασμοί φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών κατά τη διάρκεια όλης της καλλιεργητικής περιόδου. BBCH 00-89	5/3

Κολοκυνθοειδή (εδώδιμος φλοιός): Αγγούρι (Υ) CUMSA, Αγγουράκι (Υ) CUMSA, Κολοκύθι (Υ) CUUPG	Αλευρώδεις (<i>Bemisia tabaci</i> - BEMITA, <i>Trialeurodes vaporariorum</i> - TRIAVA)	3	1,5-2	20-150	Ψεκασμοί φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών κατά τη διάρκεια όλης της καλλιεργητικής περιόδου. BBCH 00-89	5/3
Κολοκυνθοειδή (μη εδώδιμος φλοιός): Πεπόνι (Υ) CUMME, Καρπούζι (Υ) CITLA, Κολοκύθα (Υ) CUUPE	Αφίδες (<i>Aphis gossypii</i> - APHIGO, <i>Myzus persicae</i> - MYZUPE) Τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i> - TETRUR) Αλευρώδεις (<i>Bemisia tabaci</i> - BEMITA, <i>Trialeurodes vaporariorum</i> - TRIAVA)	3	1,5-2	20-150	Ψεκασμοί φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών κατά τη διάρκεια όλης της καλλιεργητικής περιόδου. BBCH 00-89	5/3
Ακρόδρυα: Αμυγδαλιά PRNDU, Καρυδιά IUGRE, Φουντουκιά CYLAV, Φιστικιά PIAVE	Κοκκοειδή (<i>Planococcus sp.</i> - PLANSP, <i>Icerya purchasi</i> - ICERPU, <i>Delottococcus aberia</i> - DLTCAB)	4,5	1-1,5	100-300	Ψεκασμοί φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το τέλος της άνθησης έως τη συγκομιδή. BBCH 69-89	5/5
Μπανάνα MUBSS, Αβοκάντο PEBAM, Μάνγκο MNGIN, Παπάγια CIAPA, Ανανάς ANHCO	Κοκκοειδή (<i>Planococcus sp.</i> - PLANSP, <i>Icerya purchasi</i> - ICERPU, <i>Delottococcus aberia</i> - DLTCAB)	4,5	1-1,5	100-300	Ψεκασμοί φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το τέλος της άνθησης έως τη συγκομιδή. BBCH 69-89	5/5

Παρατηρήσεις :

- 1) Η χρήση στη Πορτοκαλιά (CIDSΙ) περιλαμβάνει και τα Περγαμόντα (CIDAB) και τα Νεράντζια (CIDAU). Η χρήση στη Λεμονιά (CIDLI) περιλαμβάνει και τα Κιτρολέμονα (CIDME). Η χρήση στη Μανταρινιά (CIDRE) περιλαμβάνει και τις Κλημεντίνες (CIDDE). Η χρήση στο Γκρέιπφρουτ περιλαμβάνει και τις Φράπες (CIDGR).
- 2) Στο θερμοκήπιο εφαρμόζεται με δοσολογία 2%, δηλαδή με δόση 20 κ.εκ. σκευάσματος ανά 1 λίτρο νερού.
- 3) Στις καλλιέργειες θερμοκηπίου: χρήση μόνο σε θερμοκήπια κλειστού τύπου (που παρέχουν πλήρη κάλυψη μέχρι το επίπεδο του εδάφους). Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής σε θερμοκήπια και μέχρι το στέγνωμα των φύλλων, να παραμένουν κλειστά όλες οι πόρτες και τα παράθυρα.
- 4) Στις καλλιέργειες υπαίθρου: Μαρούλια και άλλα σαλατικά, Σολανώδη, Φράουλα και Κολοκυνθοειδή εφαρμόζεται με δοσολογία 15-20 κ.εκ. σκευάσματος ανά 1 λίτρο νερού.

* Καλλιέργειες θερμοκηπίου (Θ):

Σολανώδη: Τομάτα (LYPES), Μελιτζάνα (SOLME), Πιπεριά (CPSAN), Πιπεριά Chillι (CPSFR), Πεπίνι (SOLMU), Πατάτα (SOLTU).

Κολοκυνθοειδή: Αγγούρι (CUMSA), Κολοκύθι (CUUPG), Πεπόνι (CUMME), Καρπούζι (CITLA), Κολοκύθα (CUUMA, CUUPM).

Κραμβοειδή: Λάχανο Λευκό (BRSOL), Λάχανο Κόκκινο (BRSOR), Λάχανο Savoy (BRSOS), Λαχανάκια Βρυξελλών (BRSEF), Κουνουπίδι (BRSEB), Μπρόκολο (BRSOK), Λάχανο Κινέζικο (BRSPK), Λάχανο Σγουρό /Λαχανίδα (BRSEA), Φυλλώδη Λαχανικά: Αντίδια (CICEN), Αντράκλα (POROS), Βλήτο (AMARE), Γαιοκάρδαμο (BARVE), Κάρδαμο (LEPSA), Καυκαλήθρα (TORAP), Λάπαθο (RUMSS), Λυκοτρίβολο (VLLLO), Μαρούλι (LACSA), Μαρούλι κατσαρό (LACSP), Νεροκάρδαμο (NAAOF), Ραδίκι (CICIN), Ραδίκι witloof (CICIF), Ρόκα (DIPER/ERUVE), Σινάπι Κόκκινο (BRSJU), Σκαρόλες (CICEL), Σπανάκι (SPQOL), Σταμναγκάθι (CICIN).

Ψυχανθή/Όσπρια: Κουκιά (VICFJ, VICFE, VICFM, VICFX), Ρεβίθια (CIEAR), Φακές (LENCU), Φασόλια με & χωρίς λοβό, Χλωρά, Κόκκινα, Λίμα (PHSVX, PHSSS, PHSVN, PHSLU) Μπιζέλια με & χωρίς λοβό (PIBSX, PIBSA), Βίκος (VICAR), Λαθούρι (LTHSA), Λούπινα (LUPSS), Αμπελοφάσουλα (VIGSI), Αραχίδα (ARHHY).

Βολβώδη Λαχανικά: Κρεμμύδι ξηρό (ALLCE), Κρεμμύδι φρέσκο (ALLFI), Σκόρδο (ALLSA), Πράσο (ALLPO), Σχινόπρασο (ALLSC), Ασκαλώνιο (ALLAS), Ραπανάκι (RAPS), Καρότο (DAUCA).

Αρωματικά & Φαρμακευτικά φυτά: Άνηθος (AFEGR), Αρώνια (ABOSS), Βασιλικός (OCIBA), Γιασεμί (IASSS), Γλυκάνισος (PIMAN), Δυόσμος (MENS), Δάφνη (LURSS/KAMSS), Δενδρολίβανο (RMSOF), Δίκταμο (DCMAL), Εστραγκόν (ARTDR), Θυμάρι (THYSS), Κάππαρη (CAPSS), Κορίανδρος (CORSS/CORSA), Κύμινο (CVUCY), Λεβάντα (LAVSS), Μαϊντανός (PARCR), Μάραθος (FOEVU), Μαντζουράνα (MAJHO), Μελισσόχορτο (MLSS/MLSOF), Μέντα (MENS), Ρίγανη (ORISS/ORIVU), Σάλβια (SALOF), Σέλινο (APUGD, APUGV), Σχινόπρασο (ALLSC), Ύσσωπος (HYSOF), Φασκόμηλο (SALSS), Χαμομήλι (ANTSS).

Καλλωπιστικά: Αζαλέα (RHOSI), Αλεξανδρινό (EPHPU), Αφρικανική Βιολέτα (SNPSS), Γαρυφαλλιά (DINCA), Γλαδίολος/Γυψοφίλη (GLASS), Ζέρμπερα (GEBSS), Κυκλάμινα (CYZSS), Μπιγόνια (BEGSS), Ντάλια (DAHNY), Ορτανσία (HYESS), Πελαργόνιο (PELSS), Πριμούλα (PRISS), Τουλίπα (TULSS), Τριανταφυλλιά (ROSSS), Σαμπούκος (SAMNI), Χρυσάνθεμα (CHYIN)

Φράουλα (FRAAN)

Καπνοσπορεία (NIOTA)

9 Προειδοποιητικές λέξεις/ Εικονογράμματα Κινδύνου:



KINΔYNOΣ

9 Δηλώσεις επικινδυνότητας:

H317: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
H318: Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.

EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

11 Δηλώσεις Προφύλαξης:

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.
P270: Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

P261: Αποφεύγετε να αναπνέετε εκνεφώματα.

P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια, μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.

Φοράτε γάντια, ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία και **προσωπίδα** κατά την παρασκευή του ψεκαστικού υγρού.

P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

SP1: ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ. (Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους).

SPe3: Για να προστατέψετε τα αρθρώποδα μη στόχους, να αφήσετε αψέκαστη μία ζώνη προστασίας 5 μέτρων από μη γεωργική γη.

SPe8: Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο ανθοφορίας ζιζανίων. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν γύρη.

12 Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο:

P305+P351+P338+P310: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. **Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό.**

P302+P352: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε με άφθονο νερό και σαπούνι.

P333+P313: Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: **Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.**

P362+P364: Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε το άτομο στον καθαρό αέρα σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.

Σε περίπτωση κατάποσης: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. Μην χορηγήσετε τίποτα στον παθόντα.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777.

13 Προστασία των καταναλωτών:

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Όλες οι καλλιέργειες	Μη εφαρμόσιμο (Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι και την ημέρα της συγκομιδής)

17 Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών

Ο κάτοχος της έγκρισης οφείλει εντός 24 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης να προσκομίσει στη ΣΕΑ τις αιτούμενες μελέτες/συμπληρωματικά στοιχεία: -

- II. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθ. πρωτ. 7301/175199/23.10.2019 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σήμερα.

«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας»

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
κ.α.α.

Χρ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ