



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 11.08.2022  
Αριθ. πρωτ: 7652/222426

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
Πληροφορίες: Δ. Κοτσαρίνη  
Τηλέφωνο: 210 92 87 256  
e-mail: [dkotsarini@minagric.gr](mailto:dkotsarini@minagric.gr)

Προς: Agria S.A., Βουλγαρίας  
(δια του υπεύθυνου επικοινωνίας,  
Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε.  
«Agribiz»  
Μιχαλακοπούλου 157, 115 27, Αθήνα)  
email: [info@agribiz.gr](mailto:info@agribiz.gr)

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) DUX (δ.ο. oxyfluorfen 24% β/ο)»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις:
  - Του ν. 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  - Του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
  - Του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
- Τους κανονισμούς όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν:
  - (ΕΚ) με αριθμ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 34 αυτού.
  - (ΕΕ) 2019/291 της επιτροπής της 19ης Φεβρουαρίου 2019 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών .....oxyfluorfen.....
  - (ΕΕ) με αριθμ. 546/2011 της Επιτροπής της 10<sup>ης</sup> Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
  - (ΕΕ) με αριθμ. 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
  - (ΕΚ) με αριθμ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) με αριθμ. 1907/2006.
- Την αριθμ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε

Προϊσταμένους ιεραρχικά κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση” (Β’ 4612/19-10-20).

4. Το αριθμ. 7261/173922/13.09.2019 έγγραφο της Υπηρεσίας με θέμα «Διάθεση αποθεμάτων μετά από ανακλήσεις ή τροποποιήσεις αδειών διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων».
5. Την αριθμ. 70362 άδεια του πανομοιότυπου φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) SMERCH (oxyfluorfen 24% β/ο) η οποία χορηγήθηκε με την αριθμ. 12661/303050/25.11.2019 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
6. Την αριθμ. 7442/216669/26.07.2022 αίτηση καθώς και την αριθμ. 7652/222426/29.07.2022 συμπληρωματική κατάθεση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

**A** Χορηγούμε άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 34 του Κανονισμού 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) **DUX** της εταιρείας **Agria S.A.**, Βουλγαρίας με τα ακόλουθα στοιχεία:

#### **1** Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

##### Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης:

1.1.β Ημερομηνία λήξης:

**70461**

**11.08.2022**

**31.12.2025**

##### **1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν**

1.2.α Εμπορικό όνομα:

1.2.β Μορφή:

**DUX**

Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)

##### **1.3 Δραστική ουσία**

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO:

**oxyfluorfen**

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

**97 % (β/β) min**

Χημική ομάδα:

**Διφαινυλαιθέρων**

Παρασκευαστής :

**Agria S.A.**

Asenovgradsko Shose 4009, Plovdiv, Βουλγαρία

Mr. Plamen Alexandrov

Τηλ.: +00359 2 9150500

Fax: +00359 2 9150555

Email: [palexandrov@agria.bg](mailto:palexandrov@agria.bg)

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:

**YIFAN BIOTECHNOLOGY GROUP CO., LTD**

No.136 Zhongxing Road,  
Wenzhou Industrial Zone,  
Zhejiang, Κίνα

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας προσδιορίζονται στην αριθμ. πρωτ. 12471/166134/30.11.2018 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας για το πανομοιότυπο προϊόν SMERCH, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

#### 1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

**Agria S.A.**  
Asenovgradsko Shose 4009, Plovdiv, Βουλγαρία  
Mr. Plamen Alexandrov  
Τηλ.: +00359 2 9150500  
Fax: +00359 2 9150555  
Email: [palexandrov@agria.bg](mailto:palexandrov@agria.bg)

α) Υπεύθυνος επικοινωνίας:

**Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε. «Agribiz»**  
Μιχαλακοπούλου 157, 115 27, Αθήνα  
Τηλ.: 210 7471000  
E-mail: [info@agribiz.gr](mailto:info@agribiz.gr)

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

**ΠΡΟΦΑΡΜ Α.Ε.Β.Ε.**  
ΒΙΠΕΘ ΣΙΝΔΟΥ ΟΤ 20  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΚ 57022  
ΤΗΛ.: 2310798021

Σε περίπτωση μελλοντικής τροποποίησης της παρούσας άδειας ως προς το εν λόγω σημείο, ο ανωτέρω υπεύθυνος διάθεσης θα έχει και την ευθύνη για τα υπάρχοντα αποθέματα του σκευάσματος που παρήχθησαν ή/και κυκλοφόρησαν στην ελληνική αγορά μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής απόφασης τροποποίησης. Για τις ποσότητες του σκευάσματος που θα παραχθούν και θα κυκλοφορήσουν στην αγορά από την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης τροποποίησης και μετά, την ευθύνη θα φέρει ο νέος υπεύθυνος διάθεσης.

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

**Agria S.A.**  
Asenovgradsko Shose 4009,  
Plovdiv, Βουλγαρία

δ) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

**1. Agria S.A.**  
Asenovgradsko Shose 4009, Plovdiv, Βουλγαρία  
**2. YIFAN BIOTECHNOLOGY GROUP CO., LTD**  
No.136 Zhongxing Road,  
Wenzhou Industrial Zone, Zhejiang, Κίνα

ε) Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

**1. Agria S.A.**  
Asenovgradsko Shose 4009, Plovdiv, Βουλγαρία  
**2. ΠΡΟΦΑΡΜ Α.Ε.Β.Ε.**  
ΒΙΠΕΘ ΣΙΝΔΟΥ, ΤΚ 57022, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

**Δραστική ουσία:** oxyfluorfen 24% β/ο  
**Βοηθητικές ουσίες:** 76,6% β/β

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως αυτή κατατέθηκε με την αριθμ. πρωτ. 12471/166134/30.11.2018 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας για το πανομοιότυπο προϊόν SMERCH, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

## 2 Συσσκευασίες

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλη	60 κ.εκ. έως 1 λίτρο	Πλαστικό τύπου (HDPE-COEX)
2	Φιάλη μέσα σε κουτί	60 κ.εκ. έως 600 κ.εκ.	Πλαστικό τύπου (HDPE-COEX) Κουτί χάρτινο
3	Δοχεία	1 λίτρο έως 25 λίτρα	Πλαστικό τύπου (HDPE-COEX)

## 3 Οδηγίες χρήσης:

**Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.**

**Τρόπος εφαρμογής:** Εφαρμόζεται με ψεκασμό κοντά στο έδαφος, σε λωρίδες που καλύπτουν το 30% της συνολικής επιφάνειας του αγρού, από το φθινόπωρο έως τις αρχές της άνοιξης, με ακροφύσιο τύπου σκούπας και πίεση 2 - 3 Atm.

**Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:** Ανακινείστε καλά τη φιάλη ή το δοχείο, πριν τη χρήση. Γεμίστε το ψεκαστικό δοχείο μέχρι τη μέση με νερό και προσθέστε τη συνιστώμενη ποσότητα σκευάσματος. Προσθέστε το υπόλοιπο νερό υπό συνεχή ανάδευση. Η εφαρμογή πρέπει να γίνεται υπό συνεχή ανάδευση.

**Καθαρισμός ψεκαστήρα:** Αμέσως μετά την εφαρμογή αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Καθαρίστε σχολαστικά το βυτίο και όλα τα μέρη του ψεκαστικού, γεμίζοντας το βυτίο με νερό (τουλάχιστον 10% του συνολικού όγκου του). Αδειάστε το βυτίο μέσω των ακροφυσίων. Επαναλάβετε τη διαδικασία 2 φορές.

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:** Τα κενά μέσα συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

**Συνδυαστικότητα:** Να μη συνδυάζεται με άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Εφαρμόζεται μόνο του.

## 4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων πλατύφυλλων και αγρωστωδών ζιζανίων, προφυτρωτικά ή νωρίς μεταφυτρωτικά. Εφαρμόζεται με ψεκασμό κοντά στο έδαφος, σε λωρίδες που καλύπτουν το 30% της συνολικής επιφάνειας του αγρού, από το φθινόπωρο έως τις αρχές της άνοιξης.

## 5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο.
		κ.εκ./στρ	Όγκος ψεκ. Υγρού λίτρα/στρ		
<b>Εσπεριδοειδή</b> <b>Πορτοκαλιά</b> (CIDSΙ) <b>Μανταρινιά</b> (CIDRE) <b>Λεμονιά</b> (CIDLI) <b>Γκρέιπφρουτ</b> (CIDPA) <b>Κιτριά</b> (CIDAU)	Ετήσια πλατύφυλλα και αγρωστώδη ζιζάνια*	62,5	20 - 50	Ψεκασμός κοντά στο έδαφος σε λωρίδες που καλύπτουν το 30% της συνολικής επιφάνειας του αγρού, από το φθινόπωρο έως τις αρχές της άνοιξης και όχι μετά τις 30 Απριλίου.	1
<b>Μηλοειδή</b> <b>Μηλιά</b> (MABSD) <b>Αχλαδιά</b> (PYUCO) <b>Κυδωνιά</b> (CYDOB) <b>Μουσμουλιά</b> (MSPGE) <b>Αχλαδομηλιά</b> (PYUPC)	Ετήσια πλατύφυλλα και αγρωστώδη ζιζάνια*	62,5	20 - 50	Ψεκασμός κοντά στο έδαφος σε λωρίδες που καλύπτουν το 30% της συνολικής επιφάνειας του αγρού, από το φθινόπωρο έως τις αρχές της άνοιξης, κατά το λήθαργο (BBCH 00). Μην εφαρμόζετε το σκεύασμα μετά τις 30 Απριλίου.	1
<b>Ελιά</b> (OLVEU)	Ετήσια πλατύφυλλα και αγρωστώδη ζιζάνια*	62,5	20 - 50	Ψεκασμός κοντά στο έδαφος σε λωρίδες που καλύπτουν το 30% της συνολικής επιφάνειας του αγρού, από το φθινόπωρο έως τις αρχές της άνοιξης και όχι μετά τις 30 Απριλίου.	1
<b>Αμπέλι</b> Οινοποιήσιμα, Επιτραπέζια (VITVI)	Ετήσια πλατύφυλλα και αγρωστώδη ζιζάνια*	62,5	20 - 50	Ψεκασμός κοντά στο έδαφος σε λωρίδες που καλύπτουν το 30% της συνολικής επιφάνειας του αγρού, από το φθινόπωρο έως τις αρχές της άνοιξης, κατά το λήθαργο (BBCH 00). Μην εφαρμόζετε το σκεύασμα μετά τις 30 Απριλίου.	1
<b>Ηλιάνθος</b> (HELAN)	Ετήσια πλατύφυλλα και αγρωστώδη ζιζάνια*	62,5	30 - 60	Ψεκασμός προφυτρωτικά κοντά στο έδαφος, στη γραμμή σποράς, σε λωρίδες πάνω στη γραμμή φύτευσης της καλλιέργειας. Μην εφαρμόζετε το σκεύασμα μετά τις 30 Απριλίου.	1

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:**

1. Εφαρμόζεται με ψεκάσμο κοντά στο έδαφος, σε λωρίδες που καλύπτουν το 30% της συνολικής επιφάνειας του αγρού.
2. Η συνολική ποσότητα δ.ο./έτος δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 15 γραμ. δ.ο./στρ.
3. Για τις επιτραπέζιες ελιές επιτρέπεται η συλλογή τους μόνο από το δένδρο.
4. Να μη συλλέγονται ελιές από το έδαφος προκειμένου να αποφευχθούν υπολείμματα.

**\*Καταπολεμούμενα ζιζάνια:****Ευαίσθητα ζιζάνια (>85%):**

Βλήγα (*Amaranthus blitoides* – AMABL), (*Amaranthus retroflexus* – AMARE)  
 Καλεντούλα (*Calendula arvensis*) CLDAR,  
 Λουβουδιά (*Chenopodium album* – CHEAL)  
 Περιπλοκάδα (*Convolvulus arvensis* - CONAR, *Convolvulus althaeoides* –CONAL)  
 (*Diploaxis erucoides* –DIPER), (*Diploaxis muralis* –DIPMU)  
 Μουχρίτσα (*Echinochloa crus-galli* – ECHCG)  
 Αναρριχώμενο πολίγωνο (*Fallopia convolvulus* – POLCO)  
 Ήρες (*Lolium multiflorum subsp. gaudini* – LOLMG), (*Lolium rigidum* – LOLRI)  
 Μολόχα (*Malva sylvestris* – MALSI),  
 Κοινή πόα (*Poa annua* – POAAN)  
 Πολυκόμπι (*Polygonum aviculare* – POLAV)  
 Αντράκλα (*Portulaca oleracea* – POROL)  
 Μαρτιάκος (*Senecio vulgaris* – SENVU)

**Μέτρια ευαίσθητα ζιζάνια (70-85%):**

Ζοχός (*Sonchus sp.* – SONSS)

- 6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτούγειας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

**Διαχείριση Ανθεκτικότητας**

Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική ουσία **oxyfluorfen**, ζιζανιοκτόνο που ανήκει στην **ομάδα E κατά HRAC**.

Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας συνιστάται η εναλλαγή ζιζανιοκτόνων με διαφορετικό τρόπο δράσης ή/και εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα).

- 7** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:
- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας

--

- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν

Στο ίδιο χωράφι μπορεί να σπαρούν/φυτευτούν, οι εξής καλλιέργειες:

- τομάτα, βρώμη, ζαχαρότευτλα μετά την παρέλευση 2 χρόνων και 4 μηνών (840 ημερών).
- κρεμμύδι μετά την παρέλευση 4 χρόνων και 8 μηνών (1680 ημερών).
- ελαιοκράμβη μετά την παρέλευση 1 χρόνου και 6 μηνών (540 ημερών).


- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

Μην εισέρχετε στον αγρό για 7 ημέρες μετά την εφαρμογή του σκευάσματος.

- 8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Σε ευαίσθητες καλλιέργειες, μπορεί να προκληθεί φυτοτοξικότητα από τη διασπορά σταγονιδίων του ψεκαστικού υγρού. Στον ηλιάνθο μπορεί να παρατηρηθούν παροδικά συμπτώματα φυτοτοξικότητας (χλώρωσης).

- 9** Προειδοποιητικές λέξεις/ Εικονογράμματα κινδύνου:



- 10** Δηλώσεις επικινδυνότητας:

**H304:** Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.  
**H319:** Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.  
**H336:** Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.  
**H410:** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.  
**EUH066:** Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.  
**EUH401:** Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

- 11** Δηλώσεις προφύλαξης:

**P 405 + P102:** Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.  
**P261:** Αποφεύγετε να αναπνέετε συγκεντρώσεις σταγονιδίων / εκνεφώματα.  
**P270:** Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.  
**P280:** Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.

*Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και κατάλληλα προστατευτικά γάντια κατά την ανάμειξη / φόρτωση και τον ψεκασμό.  
 Φοράτε κατάλληλη προστατευτική μάσκα κατά την ανάμειξη / φόρτωση.  
 Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια φοράτε ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία και γάντια.*

**P501:** Διάθεση του περιεχομένου / περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

**Sp1:** Μη ρυπαίνεται τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.  
**SPe3:** Για να προστατέψετε τους **υδρόβιους οργανισμούς** να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας από τα επιφανειακά ύδατα:

- **20 μέτρων με φυτική ζώνη ανάσχεσης** στον ηλιάνθο.
- **20 μέτρων με φυτική ζώνη ανάσχεσης** σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50% στα εσπεριδοειδή και μηλοειδή.
- **30 μέτρων** που να συμπεριλαμβάνει **20 μέτρα με φυτική ζώνη ανάσχεσης** σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50% στην ελιά και στο αμπέλι.

**SPe3:** Για να προστατέψετε τα **αρθρόποδα μη στόχους** να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας από μη γεωργική γη:

- **5 μέτρων** στον ηλιάνθο
- **5 μέτρων** σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50%, στα εσπεριδοειδή, μηλοειδή, στην ελιά και στο αμπέλι.

**SPe3:** Για να προστατέψετε τα **φυτά μη στόχους** να αφήσετε μια αφέκαστη ζώνη προστασίας από μη γεωργική γη:

- **10 μέτρων** σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 75% ή **5 μέτρων** σε συνδυασμό με την χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 90% στον ηλιάνθο.
- **10 μέτρων** σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 90% στα εσπεριδοειδή, μηλοειδή, στην ελιά και στο αμπέλι.

**12** Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο

**P301+P310+P331:** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το Κέντρο Δηλητηριάσεων ή ένα γιατρό. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.

**P337+P313:** Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

**P305+P351+P338:** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.

**Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Σε περίπτωση δηλητηρίασης ακολουθείται συμπτωματική θεραπεία.

**Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 - 7793777**

**13** Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Πεδίο Εφαρμογής	PHI (σε ημέρες)
Πορτοκάλια (0110020) Μανταρίνια (0110050) Λεμόνια (0110030) Γκρέιπφρουτ (0110010) Κίτρα (0110020-002) Ελιά επιτραπέζια (0161030) Ελιά ελαιοποιήσιμη (0402010)	21
Μήλα (0130010) Αχλάδια (0130020) Κυδώνια (0130030) Μούσμουλα (0130040) Αχλαδόμηλα (0130020-001) Σταφύλια οινοποιήσιμα (0151020) Σταφύλια επιτραπέζια (0151010) Ηλιάνθος (0401050)	Δεν ορίζεται λόγω του χρόνου εφαρμογής.

**14** Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Στην αρχική απαραβίαστη συσκευασία του, καλά κλειστό, σε μέρος ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο, μακριά από άμεση έκθεση στο ηλιακό φως, παραμένει σταθερό για 2 (δύο) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.



**15 Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης**

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχεθήκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

**16 Κατάλογος προστατευομένων μελετών**

Στην Έκθεση Αξιολόγησης που στηρίχθηκε η απόφαση του πανομοιότυπου προϊόντος SMERCH, καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες βασίστηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

**B Γενικές υποχρεώσεις**

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει τη ΣΕΑ για οποιοδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και δώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στη ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα απόφαση και θα πρέπει να προσκομιστεί εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της παρούσης.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στη ΣΕΑ τελική ετικέτα, μόνο ηλεκτρονικά, πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στη ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας»  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

**Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ**