



## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 31.08.2022  
Αριθ. πρωτ: 5494/155064

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150 Προς: Syngenta Hellas Μονοπρόσωπη Α.Ε.Β.Ε.  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ Λ. Ανθούσας, 15349, Ανθούσα Αττικής  
Πληροφορίες: Δ. Μακρογιάννη  
Τηλέφωνο: 210 9287160  
e-mail: [dmakrogianni@minagric.gr](mailto:dmakrogianni@minagric.gr) e-mail: [voula.kalliakaki@syngenta.com](mailto:voula.kalliakaki@syngenta.com)

**ΘΕΜΑ:** «Τροποποίηση της αριθ. 14803 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) ABEDIN 1,8 EC (abamectin 1,8% β/ο) ως προς το φάσμα δράσης (διεύρυνση σε ήσσονος σημασίας χρήσεις)»

## ΑΠΟΦΑΣΗ

## Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις:
  - Του ν. 4036/2012 (Α'8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  - Του ν. 2690/1999 (Α'45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
  - Του ν. 4622/2019 (Α'133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
- Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 51 αυτού.
- Την αριθμ. 1881/286212/13.10.2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β'4612/19.10.20).
- Το αριθμ. 12862/330936/07.12.2020 έγγραφο της Υπηρεσίας με θέμα «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά».
- Την αριθμ. 2006/60982/20.05.2022 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 14803 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) ABEDIN 1,8 EC (abamectin 1,8% β/ο).
- Την αριθμ. 5494/155064/06.06.2022 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- Τροποποιούμε την αριθ. 14803 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) ABEDIN 1,8 EC (abamectin 1,8% β/ο), που χορηγήθηκε με την αριθμ.

2006/60982/20.05.2022 απόφασή μας, ως προς το φάσμα δράσης (διεύρυνση σε ήσσονος σημασίας χρήσεις).

Το σημείο 5 διαμορφώνεται ως εξής:

5 Φάσμα δράσης						
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μεγ. αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/ Μεσοδιάστημα (ημέρες)
		κ.εκ./ στρέμμα (max)	κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ		
Καλλωπιστικά θερμοκηπίου (φυτά-βολβοί και βολβώδη ανθικά φυτά - δένδρα θάμνοι και φυτώρια δασικών δένδρων)	Τετράνυχος <i>Tetranychus urticae</i> (TETRUR) Λυριόμυζα <i>Liriomyza trifolii</i> (LIRITR) Θρίπας <i>Frankliniella occidentalis</i> (FRANOC) <i>Eriophyes</i> spp. (ERPHSP) Ψύλλα <i>Psylla</i> spp. (PSYLSP)	100	75-100	100	Ψεκασμός φυλλώματος με την έναρξη των προσβολών.	4/7
Μηλιά MABSD Αχλαδιά ΡΥUSS Κυδωνιά CYDOB	Ψύλλα <i>Psylla pyri</i> (PSYLPI) <i>Psylla mali</i> (PSYLMA) <i>Cacopsylla pyri</i> (PSYLPI) <i>Epitrimerus pyri</i> (EPITPI) Φυλλορύκτες <i>Lithocolletis</i> sp. (LITHSP) Θρίπας <i>Frankliniella occidentalis</i> (FRANOC) <i>Thrips</i> sp. (THRISP) Τετράνυχος <i>Tetranychus urticae</i> (TETRUR) Πανόνυγχος <i>Panonychus ulmi</i> (METTUL) <i>Aculus schlechtendali</i>	112,5	75	100-150	Ψεκασμός φυλλώματος πριν την εκκόλαψη των αυγών, σε μείγμα με παραφινικό λάδι 0,25-0,3% ή άλλο προσκολλητικό. Πριν την ανθοφορία (<BBCH60) ή μετά την ανθοφορία (>BBCH 70).	2/7

	(VASASD) <i>Aculus</i> sp. (ACULSP) <i>Eryophyes</i> spp. (ERPHSP)					
Ροδακινιά PRNPS Βερικοκιά PRNAR	Ψύλλα <i>Psylla pyri</i> (PSYLPI) <i>Psylla mali</i> (PSYLMA) <i>Cacopsylla pyri</i> (PSYLPI) <i>Epitrimerus pyri</i> (EPITPI) Θρίπας <i>Frankliniella</i> <i>occidentalis</i> (FRANOC) <i>Thrips</i> sp. (THRISP) Τετράνυχος <i>Tetranychus</i> <i>urticae</i> (TETRUR) Πανόνυγχος <i>Panonychus ulmi</i> (METTUL) <i>Aculus</i> <i>schlechtendali</i> (VASASD) <i>Aculus</i> sp. (ACULSP) <i>Eryophyes</i> spp. (ERPHSP)	100	75-100	100	Ψεκασμός φυλλώματος πριν την εκκόλαψη των αυγών, σε μείγμα με παραφινικό λάδι 0,25-0,3% ή άλλο προσκολλητικό. Από το τέλος της ανθοφορίας έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών (BBCH 69-89).	2/14
Πορτοκαλιά CIDAU Λεμονιά CIDLI Μανταρινιά CIDRE	Φυλλοκνίστης <i>Phyllocnistis</i> <i>citrella</i> (PHYNCI)	60	40	100-150	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων ή με την εμφάνιση των ακάρεων στους νεαρούς βλαστούς σε μείγμα με παραφινικό λάδι 0,25-0,3% ή άλλο μη ιοντικό προσκολλητικό. Από την εμφάνιση των κορυφών των νέων πράσινων φύλλων έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών (δεν	3/10
	Πανόνυγχος <i>Panonychus citri</i> (METTCI) Τετράνυχος <i>Tetranychus</i> spp. (TETRSP)	112,5	75			

					θα πρέπει να εφαρμόζεται κατά την ανθοφορία) (BBCH 09-89).	
Αμπέλι VITVI	Άκαρι της αμπέλου <i>Eriophyes vitis</i> (ERPHVI) Τετράνυχος <i>Eotetranychus carpini</i> (EOTECA)	75	50-75	50-100	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής. Οι μεγάλες δόσεις να εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση μεγάλων πληθυσμών. Από την εμφάνιση του 3 <sup>ου</sup> φύλλου έως το κλείσιμο του τσαμπιού (δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται κατά την ανθοφορία) (BBCH 13-79).	2/14-21
Τομάτα (Α/Θ) LYPES	Τετράνυχος <i>Tetranychus urticae</i> (TETRUR) Λυριόμυζα <i>Liriomyza</i> sp. (LIRISP) Θρίπας <i>Frankliniella occidentalis</i> (FRANOC) <i>Thrips</i> sp. (THRISP)	120	80-100	50-120	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Από την εμφάνιση του 2 <sup>ου</sup> πραγματικού φύλλου στον κύριο βλαστό έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών (δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται κατά την ανθοφορία) (BBCH 12-89).	4/7
Μελιτζάνα (Α/Θ) SOLME	Τετράνυχος <i>Tetranychus urticae</i> (TETRUR) Λυριόμυζα <i>Liriomyza</i> sp. (LIRISP) Θρίπας <i>Frankliniella occidentalis</i> (FRANOC) <i>Thrips</i> sp.	120	80-100	50-120	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Από την εμφάνιση του 2 <sup>ου</sup> πραγματικού φύλλου στον κύριο βλαστό έως την πλήρη	<u>Θερμοκηπίου:</u> 4/7 <u>Αγρού:</u> 3/7

	(THRISP)				ωρίμανση των καρπών (δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται κατά την ανθοφορία) (BBCH 12-89).	
Πιπεριά (Α/Θ) CPSAN	Τετράνυχος <i>Tetranychus urticae</i> (TETRUR) Λυριόμυζα <i>Liriomyza</i> sp. (LIRISP) Θρίπας <i>Frankliniella occidentalis</i> (FRANOC) <i>Thrips</i> sp. (THRISP)	120	80-100	50-120	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Από την εμφάνιση του 2 <sup>ου</sup> πραγματικού φύλλου στον κύριο βλαστό έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών (δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται κατά την ανθοφορία) (BBCH 12-89).	<u>Θερμοκηπίου:</u> 4/7  <u>Αγρού:</u> 3/7
Αγγούρι (Θ) CUMSA Κολοκύθι (Θ) CUUPG	Τετράνυχος <i>Tetranychus urticae</i> (TETRUR) Λυριόμυζα <i>Liriomyza</i> sp. (LIRISP) Θρίπας <i>Frankliniella occidentalis</i> (FRANOC) <i>Thrips</i> sp. (THRISP)	120	80-100	50-120	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και των πρώτων ακαρέων. Από την εμφάνιση των κοτυληδόνων έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών (BBCH 10-89).	4/7
Πεπόνι (Α) CUMME Καρπούζι (Α) CITLA	Τετράνυχος <i>Tetranychus urticae</i> (TETRUR)	120	80-100	50-120	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και των πρώτων ακαρέων. Από την εμφάνιση των κοτυληδόνων έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών (δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται κατά την	3/7

					ανθοφορία) (BBCH 10-89).	
Πεπόνι (Θ) CUMME Καρπούζι (Θ) CITLA	Τετράνυχος <i>Tetranychus urticae</i> (TETRUR) Λυριόμυζα <i>Liriomyza</i> sp. (LIRISP) Θρίπας <i>Frankliniella occidentalis</i> (FRANOC) Thrips sp. (THRISP)	120	80-100	50-120	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και των πρώτων ακαρέων Από την εμφάνιση των κοτυληδόνων έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών (BBCH 10-89).	3/7
Μαρούλι (Θ) LACSA	Θρίπας <i>Frankliniella occidentalis</i> (FRANOC)	50	75-100	50	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και των πρώτων ακάρεων. Από την εμφάνιση του 2 <sup>ου</sup> φύλλου έως την συγκομιδή (BBCH 12-55).	4/7
Μαϊντανός (Θ) PARCR	Θρίπας <i>Frankliniella occidentalis</i> (FRANOC)  <b>Τετράνυχος*</b> <b><i>Tetranychus urticae</i> (TETRUR)</b> <b>Χρήση</b> <b>Ήσσονος</b> <b>Σημασίας</b>	50	75-100	50	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και των πρώτων ακάρεων. Από την εμφάνιση του 2 <sup>ου</sup> φύλλου έως την εμφάνιση των πρώτων ανθέων (παραμένουν κλειστά) (BBCH 12-55).	4/7
Άνηθος (Θ) AFEGR	Θρίπας <i>Frankliniella occidentalis</i> (FRANOC)	50	75-100	50	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και των πρώτων ακάρεων. Από την εμφάνιση του 2 <sup>ου</sup>	4/7

					φύλλου έως την εμφάνιση των πρώτων ανθέων (παραμένουν κλειστά) (BBCH 12-55).	
Δαμασκηιά PRNDO	Τετράνυχος <i>Tetranychus urticae</i> (TETRUR) Πανόνυγχος <i>Panonychus ulmi</i> (METTUL) <i>Aculus schlechtendali</i> (VASASD) <i>Aculus</i> sp. (ACULSP) <i>Eryophyes</i> spp. (ERPHSP)	100	75-100	100	Ψεκασμός φυλλώματος πριν την εκκόλαψη των αυγών, σε μείγμα με παραφινικό λάδι 0,25-0,3% ή άλλο προσκολλητικό. Από το τέλος της ανθοφορίας έως το στάδιο που οι καρποί έχουν αποκτήσει το 50% του τελικού τους μεγέθους (BBCH 69-75).	1
Καρυδιά IUGRE	Τετράνυχος <i>Tetranychus urticae</i> (TETRUR) Πανόνυγχος <i>Panonychus ulmi</i> (METTUL) <i>Aculus schlechtendali</i> (VASASD) <i>Aculus</i> sp. (ACULSP) <i>Eryophyes</i> spp. (ERPHSP)	75	75	100	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής (πριν την ανθοφορία (<BBCH 60) ή μετά την ανθοφορία (>BBCH 70).	1

## Παρατηρήσεις:

1. Οι μεγάλες δόσεις να εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση μεγάλων πληθυσμών.
2. Η χρήση στη Ροδακινιά περιλαμβάνει και τη Νεκταρινιά (PRNPN).

**\*«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα για την καταπολέμηση του τετράνυχου στην καλλιέργεια του μαιντανού θερμοκηπίου από τη χρήση του σκευάσματος. Για τη χρήση αυτή, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα από τη χρήση του σκευάσματος».**

## II. Διάθεση αποθεμάτων

1. Η ετικέτα του σκευάσματος να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
2. Για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, επιτρέπεται η τοποθέτηση στις συσκευασίες του σκευάσματος της μέχρι σήμερα ισχύουσας ετικέτας.
3. Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις συσκευασίες του σκευάσματος θα τοποθετείται υποχρεωτικά η νέα τροποποιημένη ετικέτα.

III. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 2006/60982/20.05.2022 απόφασή μας.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Γεωργίας»  
Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

**Χρ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ**