



## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 25.11.2022  
Αριθ. πρωτ: 5558/156984

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150 Προς: BASF Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Β.Ε.Ε.  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ Παραδείσου 2 & Κηφισίας  
Πληροφορίες: Δ. Μακρογιάννη 15125, Μαρούσι  
Τηλέφωνο: 210 9287160  
e-mail: [dmakrogianni@minagric.gr](mailto:dmakrogianni@minagric.gr) e-mail: [dimitris.theodosiou@basf.com](mailto:dimitris.theodosiou@basf.com)

ΘΕΜΑ: «Διεύρυνση της αριθμ. 60684 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) SERIFEL (*Bacillus amyloliquefaciens* στέλεχος MBI 600) σε ήσσονος σημασίας χρήσεις»

## ΑΠΟΦΑΣΗ

## Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις:
  - Του ν. 4036/2012 (Α'8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  - Του ν. 2690/1999 (Α'45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
  - Του ν. 4622/2019 (Α'133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
- Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 51 αυτού.
- Την αριθμ. 10088/115732/26.09.2013 Υπουργική απόφαση (Β'/2587) σχετικά με την «Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσονος σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσονος σημασίας».
- Την αριθμ. 1881/286212/13.10.2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β'4612/19.10.20).
- Το αριθμ. 12862/330936/07.12.2020 έγγραφο της Υπηρεσίας με θέμα «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά».
- Την αριθμ. 3626/50852/05.06.2018 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η αριθμ. 60684 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) SERIFEL (*Bacillus amyloliquefaciens* στέλεχος MBI 600), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
- Την αριθμ. 5558/156984/07.06.2022 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- Διευρύνουμε την αριθμ. 60684 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) SERIFEL (*Bacillus amyloliquefaciens* στέλεχος MBI 600), που χορηγήθηκε με την αριθμ.

3626/50852/05.06.2018 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε ήσσονος σημασίας χρήσεις.

Το σημείο 5 διαμορφώνεται ως εξής:

**5** Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μεγ. αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/ Μεσοδιάστημα (ημέρες)
		γρ./ στρέμμα	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα/στρ)		
Αμπέλι VITVI (Επιτραπέζιο & Οινοποιήσιμο)	Βοτρύτης <i>Botrytis cinerea</i> BOTRCI	50	50-100	Προληπτικές εφαρμογές ξεκινώντας από το τέλος της άνθησης μέχρι τη συγκομιδή. (BBCH 67-89)	10/7
Φράουλα (Υ+Θ) FRAAN	Βοτρύτης <i>Botrytis cinerea</i> BOTRCI	50	20-200	Προληπτικές εφαρμογές ξεκινώντας από την άνθιση ως και την ωρίμαση των καρπών. (BBCH 55-89)	6/5
Μούρα και μικροί καρποί (Υ+Θ): Φραγκοστάφυλο μαύρο RIBNI Φραγκοστάφυλο κόκκινο RIBRU Φραγκοστάφυλο κόκκινο, πράσινο κίτρινο RIBAU Μούρο-σμέουρο/ <i>Rubus x loganobaccus</i> RUBLO Σμέουρο κόκκινο, κίτρινο RUBID Μύρτιλλο RIBAU, VACMY	Βοτρύτης <i>Botrytis cinerea</i> BOTRCI	50	20-200	Προληπτικές εφαρμογές ξεκινώντας από την άνθιση ως και την ωρίμαση των καρπών. (BBCH 55-89)	6/5
Τομάτα (Θ) LYPES Πιπεριά (Θ) CPSAN Μελιτζάνα (Θ) SOLME	Βοτρύτης <i>Botrytis cinerea</i> BOTRCI	50	20-200	Προληπτικές εφαρμογές ξεκινώντας από την άνθιση ως και την ωρίμαση των καρπών. (BBCH 51-89)	6/5
Τομάτα (Υ) LYPES Πιπεριά (Υ) CPSAN Μελιτζάνα (Υ) SOLME	Βοτρύτης <i>Botrytis cinerea</i> BOTRCI Αλτερναρίωση <i>Alternaria solani</i> ALTESO	50 25	20-200 15-100	Προληπτικές εφαρμογές ξεκινώντας από την άνθιση ως και την ωρίμαση των καρπών. (BBCH 51-89)	6/5

<p>Μαρούλι (Υ+Θ) LACSA και σαλατικά (Υ+Θ): Ρόκα ERUVE, DIPER Λυκοτρίβολο VLLLO, VLLER Σκαρόλες (πικρίδα)/ πλατύφυλλα αντίδια Κιχώριο Κοκκινόχρωμο κιχώριο LACSE, CICEN CICEL, CICIN, CICIF Γαιοκάρδαμο BARVE Κάρδαμο και άλλα βλαστάρια και φύτρες LEPSA, LEPCA Καλλιέργειες νεαρών φύλλων (συμπεριλαμβ. ειδών κράμβης)</p>	<p>Βοτρύτης <i>Botrytis cinerea</i> BOTRCI</p> <p>Σκληρωτίνια <i>Sclerotinia</i> <i>sclerotiorum</i> <i>Sclerotinia minor</i> SCLESP</p>	50	20-200	<p>Προληπτικές εφαρμογές ξεκινώντας κατά την ανάπτυξη του φυλλώματος ως και τη συγκομιδή. (BBCH 10-49)</p>	6/5
<p>Σπανάκι (Υ+Θ) SPQOL</p>	<p>Βοτρύτης <i>Botrytis cinerea</i> BOTRCI</p> <p>Σκληρωτίνια <i>Sclerotinia</i> <i>sclerotiorum</i> <i>Sclerotinia minor</i> SCLESP</p>	50	20-200	<p>Προληπτικές εφαρμογές ξεκινώντας κατά την ανάπτυξη του φυλλώματος ως και τη συγκομιδή. (BBCH 10-49)</p>	6/5
<p>Βότανα και βρώσιμα άνθη (Υ+Θ): Μαϊντανός* PARCR Φραγκομαϊντανός* ANRCE Σχοινόπρασο* ALLSC Φύλλα σέλινου* APUGV Φύλλα άνηθου* AFEGR Φασκόμηλο* SALOF Δενδρολίβανο* RMSOF Θυμάρι* THYSS Βασιλικός* OCIBA Δάφνη*/ Δαφνόφυλλα* LURNO</p>	<p>Βοτρύτης <i>Botrytis cinerea</i> BOTRCI</p>	50	20-200	<p>Προληπτικές εφαρμογές από την εμφάνιση του 1<sup>ου</sup> πραγματικού φύλλου μέχρι το φυτό να αποκτήσει το τυπικό για την καλλιέργεια μέγεθος. (BBCH 10-49)</p>	6/5

Δρακόντιο*/ Εστραγκόν* ARTDR  Χρήσεις Ήσσοнос Σημασίας					
Λαχανάκι Βρυξελλών* (Υ) BRSOF  Χρήση Ήσσοнос Σημασίας	Βοτρύτης <i>Botrytis</i> sp. BOTRSP	50	20-200	Προληπτικές εφαρμογές ξεκινώντας από την εμφάνιση του 1 <sup>ου</sup> πραγματικού φύλλου έως και την πλήρη ανάπτυξη των καρπών. (BBCH 10-49)	6/5
Μπάμια* (Υ) ABMES  Χρήση Ήσσοнос Σημασίας	Βοτρύτης <i>Botrytis</i> sp. BOTRSP	50	20-200	Προληπτικές εφαρμογές, ξεκινώντας από την εμφάνιση του 5 <sup>ου</sup> άνθους, μέχρι και την πλήρη ωρίμανση των καρπών. (BBCH 55-89)	6/5
Πατάτα SOLTU	<u>*Χρήση ήσσοнос σημασίας:</u> Φουζαρίωση <i>Fusarium oxysporum</i> FUSAOX	50	20-200	Προληπτικές εφαρμογές ξεκινώντας από την εμφάνιση του 1 <sup>ου</sup> πραγματικού φύλλου έως και την συγκομιδή. (BBCH 11-89)	6/5
Μπρόκολο* BRSOK  Χρήση Ήσσοнос Σημασίας	Βακτηριώσεις Bacteria 1BACTK	50	20-200	Προληπτικές εφαρμογές ξεκινώντας από την εμφάνιση του 1 <sup>ου</sup> πραγματικού φύλλου και μέχρι η κεφαλή να αποκτήσει το τυπικό μέγεθος και σχήμα. (BBCH 10-49)	6/5
Φασόλι νωπό (Υ) με λοβό και χωρίς λοβό PHSVX	<u>*Χρήση ήσσοнос σημασίας:</u> Βοτρύτης <i>Botrytis</i> sp. BOTRSP	50	20-200	Προληπτικές εφαρμογές ξεκινώντας από την άνθηση μέχρι και την πλήρη ωρίμανση των λοβών. (BBCH 61-89)	6/5
Φασόλι ξερό (Υ) (όσπριο) PHSVX	<u>*Χρήση ήσσοнос σημασίας:</u> Βοτρύτης <i>Botrytis</i> sp. BOTRSP	50	20-200	Προληπτικές εφαρμογές ξεκινώντας από την άνθηση μέχρι και την πλήρη ωρίμανση των λοβών. (BBCH 61-89)	6/5

Αρακάς* (Υ) PIBSX  Χρήση Ήσσοнос Σημασίας	Ασκοχύτωση <i>Ascochyta pinodes</i> MYCOPI <i>Ascochyta pisi</i> ASCOPI	50	20-200	Προληπτικές εφαρμογές ξεκινώντας από την άνθηση μέχρι και την πλήρη ωρίμανση των λοβών. (BBCH 61-89)	6/5
Φακή* (Υ) (όσπριο) LENCU  Χρήση Ήσσοнос Σημασίας	Αλτερνάρια <i>Alternaria sp.</i> ALTESP	50	20-200	Προληπτικές εφαρμογές ξεκινώντας από την άνθηση μέχρι και την πλήρη ωρίμανση των λοβών. (BBCH 61-89)	6/5

Παρατηρήσεις:

1. Χρησιμοποιήστε το σε συνδυασμό ή σε εναλλαγή με άλλα εγκεκριμένα προϊόντα εναντίον του βοτρώτη.
2. Συστήνεται η εφαρμογή του ψεκαστικού διαλύματος μέχρι απορροής, αποφεύγοντας τις ώρες με υψηλή θερμοκρασία ή χαμηλή σχετική υγρασία.
3. Να μην χρησιμοποιείται κατά την διάρκεια ή εάν αναμένεται βροχόπτωση.
4. Χρησιμοποιήστε τον μεγαλύτερο όγκο ψεκαστικού υγρού για μεγαλύτερα ή πυκνότερα πρέμνα.
5. Για καλύτερα αποτελέσματα εφαρμόστε πριν την προσβολή. Το Serifel® παρέχει προληπτική προστασία. Επαναλάβετε συχνά την εφαρμογή.

\*Για τις χρήσεις ήσσοнос σημασίας:

Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες ήσσοнос σημασίας από τη χρήση του σκευάσματος. Για την χρήση του σκευάσματος στις καλλιέργειες αυτές ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του.

**II. Διάθεση αποθεμάτων**

1. Η ετικέτα του σκευάσματος να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
2. Για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, επιτρέπεται η τοποθέτηση στις συσκευασίες του σκευάσματος της μέχρι σήμερα ισχύουσας ετικέτας.
3. Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις συσκευασίες του σκευάσματος θα τοποθετείται υποχρεωτικά η νέα τροποποιημένη ετικέτα.

- III. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 3626/50852/05.06.2018 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας»  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ