



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Λεωφ. Α. Συγγρού 150
176 71 Καλλιθέα, Αθήνα

Πληροφορίες : Μ. Γάσπαρη

Τηλέφωνο : 210 - 9287250

E-mail : mgaspari@minagric.gr

Αθήνα, 12/1/2023

Αριθ. Πρωτ.: 221/9463

Προς: CORTEVA AGRISCIENCE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Ύδρας 2 και Λ. Κηφισίας 280

ΤΚ 15232 Χαλάνδρι, Αθήνα

e-mail: fotini.tsali@corteva.com

athanasios.lysandropoulos@corteva.com

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθμ. 14749/ΕΡ άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) TRACER (δ.ο. spinosad) ως προς το φάσμα δράσης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή λόγω αλλαγής των ανωτάτων ορίων υπολειμμάτων».

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις :

α) του ν. 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β) του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α'45).

γ) του ν. 4622/2019 (Α'133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.

2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 45 αυτού.

3. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2022/1406 της Επιτροπής της 3^{ης} Αυγούστου 2022 για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για τις ουσίες methoxyfenozide, proroxur, **spinosad** και thiram μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα.

4. Τη με αριθ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β' 4612/19-10-20).

5. Τη με αριθμ. πρωτ. 5587/150477/23-6-2020 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 14749/ΕΡ άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) TRACER 24 SC (δ.ο. spinosad), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

6. Τη με αριθ. πρωτ. 12347/365132/1-12-2022 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και τα από 6/12/2022 συμπληρωματικά στοιχεία.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

A

Τροποποιούμε τη με αριθμ. 14749/ΕΡ άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) TRACER 24 SC (δ.ο. spinosad), που χορηγήθηκε με τη με αριθ. πρωτ. 5587/150477/23-6-2020 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς το φάσμα δράσης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή, λόγω αλλαγής των ανωτάτων ορίων υπολειμμάτων.

Συγκεκριμένα, τα σημεία 5 και 13 διαμορφώνονται ως εξής:

5		5.1 Φάσμα δράσης			
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/μεσοδιάστημα μεταξύ εφαρμογών σε ημέρες.
		κ.εκ./ 1 λίτρο ψεκ. Υγρού/10 τετραγωνικά μέτρα	Όγκος ψεκ. υγρού λιτρα / 10 τετρ. μέτρα		
Αγκινάρα (Υ) (CYUSC)	Πράσινο σκουλήκι <i>Helicovera armigera</i> (HELIAR) Θρίπας <i>Frankliniella occidentalis</i> (FRANOC)	4	0.3-1	Από το στάδιο του πρώτου πραγματικού φύλλου μέχρι την εμφάνιση των πρώτων ανθέων. BBCH 11-59	1-3 ανά 14 ημέρες
Κεφαλωτές κράμβες (Υ): Λάχανο (BRSOL) Λαχανάκι Βρυξελλών (BRSOF)	Θρίπες <i>Frankliniella occidentalis</i> (FRANOC) <i>Thrips sp.</i> (THRISP) Μαμέστρα <i>Mamestra brassicae</i> (BARABR)	4	0.2-1	Από την εμφάνιση του πρώτου πραγματικού φύλλου μέχρι τον σχηματισμό του κεφαλιού. BBCH 11-49	1-2 ανά 10 ημέρες
Ανθοκράμβες (Υ): Μπρόκολο (BRSOK) Κουνουπίδι (BRSOB)	Θρίπες <i>Frankliniella occidentalis</i> (FRANOC) <i>Thrips sp.</i> (THRISP) Μαμέστρα <i>Mamestra brassicae</i> (BARABR)	4	0.2-1	Από την εμφάνιση του πρώτου πραγματικού φύλλου μέχρι τον σχηματισμό του κεφαλιού. BBCH 11-49	1-2 ανά 10 ημέρες
Αγγούρι (Υ+ Θ) (CUMSA) Κολοκυθάκι (Υ+ Θ) (CUUPE) Αγγουράκι (Υ+ Θ) (CUMSA)	Πράσινο σκουλήκι <i>Helicovera armigera</i> (HELIAR) Σποντόπτερα <i>Spodoptera sp.</i> (SPODSP) Θρίπες <i>Thrips sp.</i> (THRISP)	4	0.3-1	Από την εμφάνιση του 4 ου φύλλου μέχρι την πλήρη ωρίμανση. BBCH 14-89	2 ανά 7 ημέρες

Καλλωπιστικά (Θ)	Θρίπες <i>Thrips sp.</i> (THRISP)	4	0.4-1	Με την εμφάνιση των πρώτων φύλλων – κατά την περίοδο όπου τα φυτά αναπτύσσονται (Μάρτιος έως Οκτώβριος) BBCH 10-85	2 ανά 7 ημέρες.
Αρωματικά φυτά και βρώσιμα άνθη (Υ): Βασιλικός (OCIBA) Σέλινο (APUGV) ANCRE Άνηθος (AFEGR) Εστραγκόν (ARTDR) Φασκόμηλο (SALOF) Θυμάρι (THYVU) Σχοινόπρασο (ALLSC) Δάφνη (LURNO) Δεντρολίβανο (RMSOF)	Πράσινο σκουλήκι <i>Helicovera armigera</i> (HELIAR) Σποντόπτερα <i>Spodoptera sp.</i> (SPODSP) Θρίπες <i>Thrips sp.</i> (THRISP)	4	0.2-1	Από την εμφάνιση των πρώτων φύλλων μέχρι και πριν την άνθηση. BBCH 11-49	2 ανά 7 ημέρες
Φράουλα (Υ) (FRAAN)	Πράσινο σκουλήκι <i>Helicovera armigera</i> (HELIAR) Σποντόπτερα <i>Spodoptera sp.</i> (SPODSP) Δροσόφυλλα <i>Drosophila suzukii</i> (DROSSU) Θρίπες <i>Thrips sp.</i> THRISP	4	0.2-1	Από την εμφάνιση του 4 ^{ου} φύλλου μέχρι και τη συγκομιδή. BBCH 14-89	2 ανά 7 ημέρες
Φασόλι και αρακάς με λοβό, φρέσκος (Υ) (PHSVX) (PIBSX)	Πράσινο σκουλήκι <i>Helicovera armigera</i> (HELIAR) Σποντόπτερα <i>Spodoptera sp.</i> (SPODSP)	4	0.1-0.4	Από την εμφάνιση του πρώτου φύλλου μέχρι το πλήρες μέγεθος του λοβού BBCH 11-79	1-2 ανά 7 ημέρες
Φασόλι και αρακάς με λοβό, φρέσκος	Πράσινο σκουλήκι <i>Helicovera</i>	4	0.1-0.4	Από την εμφάνιση του 5 ^{ου} φύλλου	1-2 ανά 7 ημέρες

(Υ+Θ) (PHSVX) (PIBSX)	<i>armigera</i> (HELIAR) Σποντόπτερα <i>Spodoptera sp.</i> (SPODSP) Θρίπες <i>Thrips sp.</i> (THRISP)			μέχρι την πλήρη ωρίμανση. BBCH 15-89	
Μαρούλι και άλλες σαλάτες (Μαρούλι (Υ) LACSA Λυκοτρίβολο (Υ+Θ) VLLLO Ροκα (Υ+Θ) ERUVE)	Πράσινο σκουλήκι <i>Helicovera armigera</i> (HELIAR) Σποντόπτερα <i>Spodoptera sp.</i> (SPODSP) Θρίπες <i>Thrips sp.</i> (THRISP)	4	0.2-1	Από την εμφάνιση του πρώτου φύλλου μέχρι που η κεφαλή φτάνει το επιθυμητό μέγεθος BBCH 11-49	2 ανά 7 ημέρες
Γλυκό καλαμπόκι (ZEAMS)	Πράσινο σκουλήκι <i>Helicovera armigera</i> (HELIAR) Πυραλίσ <i>Ostrinia nubilalis</i> (PYRUNU)	4	0.1-0.4	Από την εμφάνιση του τέταρτου φύλλου μέχρι το σημείο όπου οι σπόροι στο μέσον του σπάδικα αποκτούν κιτρινο-άσπρο χρώμα, το περιεχόμενο τους είναι γαλακτώδες και η περιεκτικότητα τους σε ξηρή ουσία φτάνει το 40% BBCH 14-75	1-2 ανά 21 ημέρες
Πεπόνι (Υ+Θ) (CUMME) Καρπούζι (Υ+Θ) (CITLA)	Πράσινο σκουλήκι <i>Helicovera armigera</i> (HELIAR) Σποντόπτερα <i>Spodoptera sp.</i> (SPODSP) Θρίπες <i>Thrips sp.</i> (THRISP)	4	0.3-1	Από την εμφάνιση του τέταρτου φύλλου μέχρι την ωρίμανση του καρπού. BBCH 14-89	2 ανά 7 ημέρες

Πιπεριές (Υ+Θ) (CPSAN)	Πράσινο σκουλήκι <i>Helicovera armigera</i> (HELIAR) Σποντόπτερα <i>Spodoptera sp.</i> (SPODSP) Δορυφόρος <i>Leptinotarsa decemlineata</i> (LPTNDE) Τούτα <i>Tuta absoluta</i> (GNORAB)	3	0.2-1	Από την εμφάνιση του τέταρτου φύλλου μέχρι και την ωρίμανση του καρπού. BBCH 14-89	2 ανά 7 ημέρες
	Θρίπες <i>Thrips sp.</i> (THRISP)	4			
Πατάτα (SOLTU)	Δορυφόρος <i>Leptinotarsa decemlineata</i> (LPTNDE)	1.5	0.2-1	Από την εμφάνιση των 9 πρώτων φύλλων μέχρι την ωρίμανση του κονδύλου BBCH 19-89	1-2 ανά 10 ημέρες
Τομάτα (Υ+Θ) (LYPES)	Πράσινο σκουλήκι <i>Helicovera armigera</i> (HELIAR) Σποντόπτερα <i>Spodoptera sp.</i> (SPODSP) Τούτα <i>Tuta absoluta</i> (GNORAB)	3	0.2-1	Από το τέταρτο φύλλο μέχρι και την ωρίμανση BBCH 14-89	2 ανά 7 ημέρες
	Θρίπες <i>Thrips sp.</i> (THRISP)	4			
	Δορυφόρος <i>Leptinotarsa decemlineata</i> (LPTNDE)	1.5			
Αμπέλι (επιτραπέζιες και οινοποιήσιμες ποικιλίες) (VITVI)	Ευδεμίδα <i>Lobesia botrana</i> (POLYBO) Κοχυλίδα <i>Eupoecilia ambiguella</i> (CLYSAM)	2	0.15-0.6	Από το δεύτερο φύλλο μέχρι το μαλάκωμα της ράγας. BBCH 12-85	1-2 ανά 14 ημέρες

	Πυραλίδα <i>Sparganothis pilleriana</i> (SPARPI) Δροσόφυλλα <i>Drosophila melanogaster</i> (DROSME)				
--	--	--	--	--	--

13**Προστασία των καταναλωτών**

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Πεδίο Εφαρμογής	ΡΗΙ (σε ημέρες)
Καλλωπιστικά	Μη εφαρμόσιμο
Κεφαλωτές κράμβες (Λάχανο, Λαχανάκι Βρυξελλών) (Υ), Ανθοκράμβες (Μπρόκολο, Κουνουπίδι) (Υ) Αγγούρι (Υ+Θ), Αγγουράκι (Υ+Θ), Κολοκυθάκι (Υ+Θ) Αρωματικά φυτά και βρώσιμα άνθη (Βασιλικός, Σέλινο, Άνηθος, Εστραγκόν, Φασκόμηλο, Θυμαρί, Σχοινόπρασο, Δάφνη, Δενδρολίβανο) (Υ) Φράουλα (Υ) Μαρούλι (Υ), Λυκοτρίβολο (Υ+Θ), Ρόκα (Υ+Θ) Τομάτα (Υ+Θ), Πιπεριές (Υ+Θ), Πεπόνι (Υ+Θ), Καρπούζι (Υ+Θ),	3
Αγκινάρα (Υ), Φασόλι και Αρακάς με λοβό, φρέσκος (Υ+Θ) Πατάτα	7
Αμπέλι (επιτραπέζιες και οινοποιήσιμες ποικιλίες), Γλυκό καλαμπόκι	14

- Β**
1. Η ετικέτα του σκευάσματος να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
 2. Για τις ποσότητες του σκευάσματος που έχουν διατεθεί σε καταστήματα χονδρικής ή λιανικής πώλησης, ο υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά, οφείλει να χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο μέσο επιδεχόμενο ελέγχου, ώστε να ειδοποιεί για τις τροποποιήσεις που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση, τα εν λόγω καταστήματα.
 3. Κατά την πώληση συσκευασιών με παλαιές ετικέτες, ο υπεύθυνος επιστήμονας των καταστημάτων χονδρικής ή λιανικής πώλησης οφείλει να ενημερώσει εγγράφως για την παρούσα απόφαση τους χρήστες.

Γ Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθ. πρωτ. 5587/150477/23-6-2020 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Γεωργίας
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ