



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 23.01.2023
Αριθ. πρωτ: 719/20713

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Δ. Μακρογιάννη
Τηλέφωνο: 210 9287160
e-mail: dmakrogianni@minagric.gr

Προς: W. NEUDORFF GmbH KG, Γερμανίας
(Δια του υπεύθυνου επικοινωνίας
ΤΟΥΤΟΥΤΖΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ και ΣΙΑ Ε.Ε –
“AGRIBIZ”)
e-mail: info@agribiz.gr

ΘΕΜΑ: «Διεύρυνση της με αριθ. 14484 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) PROMANAL AGRO [paraffin oil (CAS 8042-47-5) 83% β/ο] σε ήσσονος σημασίας χρήσεις»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις:
 - Του ν. 4036/2012 (Α'8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - Του ν. 2690/1999 (Α'45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 - Του ν. 4622/2019 (Α'133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
- Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 51 αυτού.
- Την αριθμ. 10088/115732/26.09.2013 Υπουργική απόφαση (Β'/2587) σχετικά με την «Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσονος σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσονος σημασίας».
- Την αριθμ. 1881/286212/13.10.2020 Απόφαση Υπουργού “Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση” (Β'4612/19.10.20).
- Το αριθμ. 12862/330936/07.12.2020 έγγραφο της Υπηρεσίας με θέμα «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά».
- Την αριθμ. 7850/85216/01.07.2014 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 14484 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) PROMANAL AGRO [paraffin oil (CAS 8042-47-5) 83% β/ο], όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

7. Την αριθμ. 7079/206598/18.07.2022 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Διευρύνουμε τη με αριθ. 14484 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) PROMANAL AGRO [paraffin oil (CAS 8042-47-5) 83% β/ο], που χορηγήθηκε με την αριθμ. 7850/85216/01.07.2014 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε ήσσονος σημασίας χρήσεις.

Τα σημεία **5**, **11** και **13** διαμορφώνονται ως εξής:

5 Φάσμα δράσης						
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μεγ. αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/ Μεσοδιάστημα (ημέρες)
		κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ.	κ.εκ./ στρέμμα		
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ Λεμονιά Μανταρινιά (Κλημεντίνες) Πορτοκαλιά	Κόκκινη ψώρα <i>Aonidiella aurantii</i>	1000-1500	100-220	1000-2240	Εφαρμογές πριν την αλλαγή χρώματος των καρπών.	1-2 />60
	Παρλατόρια <i>Parlatoria pergandei</i> και άλλες ψώρες	1000-1500	50-220	500-2240	Εφαρμογές πριν την αλλαγή χρώματος των καρπών ή μία φθινοπωρινή.	1-2 />60
ΜΗΛΟΕΙΔΗ Μηλιά Αχλαδιά	Ψώρα Σαν-Ζοζέ <i>Quadraspidiotus perniciosus</i>	750-1000	80-100	600-1000	Εφαρμογές πριν την αλλαγή χρώματος των καρπών.	1
	και άλλες ψώρες Κόκκινος τετράνυχος <i>Panonychus ulmi</i>	750-1000	125-150	940-1500	Εφαρμογή πριν την άνθηση.	
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ Βερικοκιά Κερασιά Ροδακινιά Νεκταρινιά Δαμασκηινιά	Ψώρα Σαν-Ζοζέ <i>Quadraspidiotus perniciosus</i>	750-1000	80-100	600-1000	Εφαρμογές πριν την αλλαγή χρώματος των καρπών.	1
	Κόκκινος και κίτρινος τετράνυχος <i>Panonychus ulmi</i>	750-1000	125	940-1250	Εφαρμογή πριν την άνθηση.	

<p>Ελιά OLVEU</p>	<p>*Χρήσεις ήσσονος σημασίας: Παρλατόρια <i>Parlatoria oleae</i> PARLOL</p> <p>Λεκάνιο <i>Saissetia oleae</i> SAISOL</p> <p>Πολλίνια <i>Pollinia pollini</i> POLNPO</p> <p>Άσπρη ψώρα <i>Aspidiotus nerii</i> ASPDNE</p> <p>Μυτιλόμορφη ψώρα <i>Lepidosaphes ulmi</i> LEPSUL</p> <p>Ψώρες <i>Leucaspis riccae</i> LEUARI <i>Chrysomphalus dictyospermi</i> CHRYDI</p> <p>Ακάρια <i>Eriophyes vitis</i> ERPHVI <i>Tegolophus hassani</i> TEGLSP <i>Oxycenus maxwelli</i> OXYNMA <i>Eotetranychus carpini</i> EOTECA</p>	750-1000	80-150	600-1500	<p>Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής, από την πτώση των πετάλων ως το στάδιο των μικρών καρπών. BBCH 68-71</p>	1
<p>Ακτινιδιά* ATIDE</p> <p>Χρήση Ήσσονος Σημασίας</p>	<p>Ψώρα Σαν Ζοζέ <i>Quadraspidotus perniciosus</i> QUADPE</p> <p>Βαμβακάδα ή Διάσπις <i>Pseudaulacaspis pentagona</i> PSEAPE</p> <p>Μετκάλφα <i>Metcalfa pruinosa</i> METFPR</p>	750-1000	80-150	600-1500	<p>Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής, πριν την άνθηση και μετά τη συγκομιδή. BBCH <60 BBCH >85</p>	2

	<p>Βαμβακάδα <i>Euphyllura</i> sp. EUPHSP</p> <p>Κίτρινος Τετράνυχος <i>Tetranychus urticae</i> TETRUR</p> <p>Κόκκινος Τετράνυχος <i>Metatetranychus ulmi</i> METTUL</p>					
<p>Αμυγδαλιά* PRNDU Καρυδιά* IUGRE Φιστικιά* PIAVE</p> <p>Χρήσεις Ήσσονος Σημασίας</p>	<p>Κοκκοειδή Ψώρα Σαν Ζοζέ <i>Quadraspidiotus perniciosus</i> QUADPE</p> <p>Βαμβακάδα ή Διάσπις <i>Pseudalacaspis pentagona</i> PSEAPE <i>Planococcus / Pseudococcus</i> sp. PSECSP</p> <p>Μυτιλόμορφη ψώρα <i>Lepidosaphes ulmi</i> LEPSUL</p> <p>Κόκκινη ψώρα <i>Aonidiella aurantii</i> AONDAU</p> <p>κ.α. ψώρες <i>Sphaerolecanium prunastri</i> LECAPN <i>Eulecanium persicae</i> LECAPE <i>Melanaspis inopinata</i> MELAIN</p> <p>Κίτρινος τετράνυχος <i>Tetranychus urticae</i> TETRUR</p>	750-1000	80-150	600-1500	Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής από την ροζ κορυφή και μετά τη συγκομιδή. (BBCH 57-69 και BBCH 99)	2

Παρατηρήσεις:

1. Το εύρος των δόσεων και ο όγκος ψεκαστικού υγρού είναι ανάλογα με το ύψος των φυτών και την ένταση της προσβολής.
2. Στα Εσπεριδοειδή η συνιστώμενη δόση θα πρέπει να συνδυαστεί με τον κατάλληλο όγκο ψεκαστικού υγρού ώστε να μην υπερβαίνεται η μέγιστη δόση/στρ.
3. Κατά τη χρήση του PROMANAL AGRO τα δένδρα πρέπει να είναι ποτισμένα. Ποτίζουμε μία εβδομάδα πριν από τον ψεκασμό.
4. Αποφύγετε τον ψεκασμό όταν τα φυτά είναι μισομαραμένα, σε περιόδους έντονης ξηρασίας, υπερβολικής υγρασίας και όταν υπάρχει παγετός.
5. Να μη γίνεται εφαρμογή με το σκεύασμα, την περίοδο της ανθοφορίας ή όταν η θερμοκρασία ξεπερνάει τους 32°C γιατί μπορεί να εμφανιστούν προβλήματα φυτοτοξικότητας.
6. Να μη γίνεται εφαρμογή με το σκεύασμα επί 30 ημέρες πριν ή μετά την εφαρμογή θείου ή θειασβεστίου.
7. Να μην προηγείται ή έπεται εφαρμογή σκευασμάτων με δ.ο. captan, folpet και dithianon σε διάστημα τουλάχιστον 1 εβδομάδας.

*«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες ελιάς, ακτινιδιάς, αμυγδαλιάς, καρυδιάς και φιστικιάς από τη χρήση του σκευάσματος. Για την χρήση του σκευάσματος στις καλλιέργειες αυτές ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του».

11

Δηλώσεις
προφύλαξης

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.

P202: Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφύλαξης.

P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

SP1: Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα/ Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω του συστήματος αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.

Spe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μian απέκαστη ζώνη προστασίας από τα επιφανειακά ύδατα:

- 10 μέτρων σε εσπεριδοειδή και σε όψιμες εφαρμογές σε μηλοειδή, πυρηνόκαρπα, **ελιά, ακτινιδιά, αμυγδαλιά, καρυδιά και φιστικιά**
- 20 μέτρων σε πρώιμες εφαρμογές σε μηλοειδή, πυρηνόκαρπα, **ελιά, ακτινιδιά, αμυγδαλιά, καρυδιά και φιστικιά.**

EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Καλλιέργεια (Κωδικός προϊόντος με βάση το Παράρτημα Ι του Καν. (ΕΚ) 396/2005)	Ημέρες
Λεμονιά, Μανταρινιά (Κλημεντίνες) Πορτοκαλιά, Μηλιά, Αχλαδιά, Βερικοκιά Κερασιά, Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Δαμασκηλιά, Ελιά (0161030, 0402010) Ακτινιδιά (0162010), Αμυγδαλιά (0120010), Καρυδιά (0120110), Φιστικιά	Καθορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του σκευάσματος

(0120100)	
-----------	--

- II. Διάθεση αποθεμάτων
1. Η ετικέτα του σκευάσματος να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
 2. Για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, επιτρέπεται η τοποθέτηση στις συσκευασίες του σκευάσματος της μέχρι σήμερα ισχύουσας ετικέτας.
 3. Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις συσκευασίες του σκευάσματος θα τοποθετείται υποχρεωτικά η νέα τροποποιημένη ετικέτα.
- III. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 7850/85216/01.07.2014 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ