



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 06.04.2023
Αριθ. πρωτ: 1339/36226

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Δ. Μακρογιάννη
Τηλέφωνο: 210 9287160
e-mail: dmakrogianni@minagric.gr

Προς: BASF Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Β.Ε.Ε.
Παραδείσου 2 & Κηφισίας
15125, Μαρούσι
e-mail: dimitris.theodosiou@basf.com

ΘΕΜΑ: «Διεύρυνση της αριθμ. 60684 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) SERIFEL (*Bacillus amyloliquefaciens* στέλεχος MBI 600) σε ήσσονος σημασίας χρήσεις»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις:
 - Του ν. 4036/2012 (Α'8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - Του ν. 2690/1999 (Α'45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 - Του ν. 4622/2019 (Α'133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
- Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 51 αυτού.
- Την αριθμ. 10088/115732/26.09.2013 Υπουργική απόφαση (Β'/2587) σχετικά με την «Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσονος σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσονος σημασίας».
- Την αριθμ. 1881/286212/13.10.2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β'4612/19.10.20).
- Το αριθμ. 12862/330936/07.12.2020 έγγραφο της Υπηρεσίας με θέμα «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά».
- Την αριθμ. 3626/50852/05.06.2018 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η αριθμ. 60684 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) SERIFEL (*Bacillus amyloliquefaciens* στέλεχος MBI 600), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
- Την αριθμ. 3959/103304/04.04.2023 (ΕΜΠ 562/31.03.2023) Εισήγηση του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου.

8. Την αριθμ. 5809/164656/15.06.2022 αίτηση και τα αριθμ. 1339/36226/03.02.2023 συμπληρωματικά στοιχεία της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Διευρύνουμε την αριθμ. 60684 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) SERIFEL (*Bacillus amyloliquefaciens* στέλεχος MBI 600), που χορηγήθηκε με την αριθμ. 3626/50852/05.06.2018 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε ήσσονος σημασίας χρήσεις.

Το σημείο 5 διαμορφώνεται ως εξής:

5 Φάσμα δράσης					
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μεγ. αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/ Μεσοδιάστημα (ημέρες)
		γρ./ στρέμμα	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα/στρ)		
Αμπέλι VITVI (Επιτραπέζιο & Οινοποιήσιμο)	Βοτρύτης <i>Botrytis cinerea</i> BOTRCI	50	50-100	Προληπτικές εφαρμογές ξεκινώντας από το τέλος της άνθησης μέχρι τη συγκομιδή. (BBCH 67-89)	10/7
Φράουλα (Υ+Θ) FRAAN	Βοτρύτης <i>Botrytis cinerea</i> BOTRCI	50	20-200	Προληπτικές εφαρμογές ξεκινώντας από την άνθιση ως και την ωρίμαση των καρπών. (BBCH 55-89)	6/5
Μούρα και μικροί καρποί (Υ+Θ): Φραγκοστάφυλο μαύρο RIBNI Φραγκοστάφυλο κόκκινο RIBRU Φραγκοστάφυλο κόκκινο, πράσινο κίτρινο RIBAU Μούρο-σμέουρο/ <i>Rubus x loganobaccus</i> RUBLO Σμέουρο κόκκινο, κίτρινο RUBID Μύρτιλλο RIBAU, VACMY	Βοτρύτης <i>Botrytis cinerea</i> BOTRCI	50	20-200	Προληπτικές εφαρμογές ξεκινώντας από την άνθιση ως και την ωρίμαση των καρπών. (BBCH 55-89)	6/5
Τομάτα (Θ) LYPES Πιπεριά (Θ) CPSAN Μελιτζάνα (Θ) SOLME	Βοτρύτης <i>Botrytis cinerea</i> BOTRCI	50	20-200	Προληπτικές εφαρμογές ξεκινώντας από την άνθιση ως και την ωρίμαση των καρπών. (BBCH 51-89)	6/5

Τομάτα (Υ) LYPES Πιπεριά (Υ) CPSAN Μελιτζάνα (Υ) SOLME	Βοτρύτης <i>Botrytis cinerea</i> BOTRCI Αλτερναρίωση <i>Alternaria solani</i> ALTESO	50 25	20-200 15-100	Προληπτικές εφαρμογές ξεκινώντας από την άνθιση ως και την ωρίμαση των καρπών. (BBCH 51-89)	6/5
Μαρούλι (Υ+Θ) LACSA και σαλατικά (Υ+Θ): Ρόκα ERUVE, DIPER Λυκοτρίβολο VLLLO, VLLER Σκαρόλες (πικρίδα)/ πλατύφυλλα αντίδια Κιχώριο Κοκκινόχρωμο κιχώριο LACSE, CICEN CICEL, CICIN, CICIF Γαιοκάρδαμο BARVE Κάρδαμο και άλλα βλαστάρια και φύτρες LEPSA, LEPCA Καλλιέργειες νεαρών φύλλων (συμπεριλαμβ. ειδών κράμβης)	Βοτρύτης <i>Botrytis cinerea</i> BOTRCI Σκληρωτίνια <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> <i>Sclerotinia minor</i> SCLESP	50	20-200	Προληπτικές εφαρμογές ξεκινώντας κατά την ανάπτυξη του φυλλώματος ως και τη συγκομιδή. (BBCH 10-49)	6/5
Σπανάκι (Υ+Θ) SPQOL	Βοτρύτης <i>Botrytis cinerea</i> BOTRCI Σκληρωτίνια <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> <i>Sclerotinia minor</i> SCLESP	50	20-200	Προληπτικές εφαρμογές ξεκινώντας κατά την ανάπτυξη του φυλλώματος ως και τη συγκομιδή. (BBCH 10-49)	6/5
Βότανα και βρώσιμα άνθη (Υ+Θ): Μαϊντανός* PARCR Φραγκομαϊντανός* ANRCE Σχοινόπρασο* ALLSC Φύλλα σέλινου* APUGV Φύλλα άνηθου* AFEGR Φασκόμηλο* SALOF Δενδρολίβανο* RMSOF Θυμάρι*	Βοτρύτης <i>Botrytis cinerea</i> BOTRCI	50	20-200	Προληπτικές εφαρμογές από την εμφάνιση του 1 ^{ου} πραγματικού φύλλου μέχρι το φυτό να αποκτήσει το τυπικό για την καλλιέργεια μέγεθος. (BBCH 10-49)	6/5

<p>THYSS Βασιλικός* OCIBA Δάφνη*/ Δαφνόφυλλα* LURNO Δρακόντιο*/ Εστραγκόν* ARTDR</p> <p>Χρήσεις Ήσσοнос Σημασίας</p>					
<p>Λαχανάκι Βρυξελλών* (Υ) BRSOF</p> <p>Χρήση Ήσσοнос Σημασίας</p>	<p>Βοτρύτης <i>Botrytis</i> sp. BOTRSP</p>	50	20-200	<p>Προληπτικές εφαρμογές ξεκινώντας από την εμφάνιση του 1^{ου} πραγματικού φύλλου έως και την πλήρη ανάπτυξη των καρπών. (BBCH 10-49)</p>	6/5
<p>Μπάμια* (Υ) ABMES</p> <p>Χρήση Ήσσοнос Σημασίας</p>	<p>Βοτρύτης <i>Botrytis</i> sp. BOTRSP</p>	50	20-200	<p>Προληπτικές εφαρμογές, ξεκινώντας από την εμφάνιση του 5^{ου} άνθους, μέχρι και την πλήρη ωρίμανση των καρπών. (BBCH 55-89)</p>	6/5
<p>Πατάτα SOLTU</p>	<p>Χρήση ήσσοнос σημασίας: Φουζαρίωση* <i>Fusarium</i> <i>oxysporum</i> FUSAOX</p>	50	20-200	<p>Προληπτικές εφαρμογές ξεκινώντας από την εμφάνιση του 1^{ου} πραγματικού φύλλου έως και την συγκομιδή. (BBCH 11-89)</p>	6/5
<p>Μπρόκολο* BRSOK</p> <p>Χρήση Ήσσοнос Σημασίας</p>	<p>Βακτηριώσεις Bacteria 1BACTK</p>	50	20-200	<p>Προληπτικές εφαρμογές ξεκινώντας από την εμφάνιση του 1^{ου} πραγματικού φύλλου και μέχρι η κεφαλή να αποκτήσει το τυπικό μέγεθος και σχήμα. (BBCH 10-49)</p>	6/5
<p>Φασόλι νωπό (Υ) με λοβό και χωρίς λοβό PHSVX</p>	<p>Χρήση ήσσοнос σημασίας: Βοτρύτης* <i>Botrytis</i> sp. BOTRSP</p>	50	20-200	<p>Προληπτικές εφαρμογές ξεκινώντας από την άνθηση μέχρι και την πλήρη ωρίμανση των λοβών. (BBCH 61-89)</p>	6/5
<p>Φασόλι ξερό (Υ) (όσπριο) PHSVX</p>	<p>Χρήση ήσσοнос σημασίας: Βοτρύτης* <i>Botrytis</i> sp.</p>	50	20-200	<p>Προληπτικές εφαρμογές ξεκινώντας από την άνθηση μέχρι και την πλήρη</p>	6/5

	BOTRSP			ωρίμανση των λοβών. (BBCH 61-89)	
Αρακάς* (Υ) PIBSX Χρήση Ήσσοнос Σημασίας	Ασκοχύτωση <i>Ascochyta pinodes</i> MYCOPI <i>Ascochyta pisi</i> ASCOPI	50	20-200	Προληπτικές εφαρμογές ξεκινώντας από την άνθηση μέχρι και την πλήρη ωρίμανση των λοβών. (BBCH 61-89)	6/5
Φακή* (Υ) (όσπριο) LENCU Χρήση Ήσσοнос Σημασίας	Αλτερνάρια <i>Alternaria</i> sp. ALTESP	50	20-200	Προληπτικές εφαρμογές ξεκινώντας από την άνθηση μέχρι και την πλήρη ωρίμανση των λοβών. (BBCH 61-89)	6/5
Μηλιά MABSD Αχλαδιά PYUCO	<u>Χρήση ήσσοнос σημασίας:</u> Αλτερνάρια* <i>Alternaria alternata</i> ALTEAL	50	20-150	Προληπτικές εφαρμογές ξεκινώντας από την άνθηση ως και την ωρίμανση των καρπών. (BBCH 60-89)	6/7
Κυδωνιά* CYDOB Μουσμουλιά* MSPGE Χρήσεις Ήσσοнос Σημασίας	Αλτερνάρια <i>Alternaria alternata</i> ALTEAL Βακτηριακό κάψιμο <i>Erwinia amylovora</i> ERWIAM	50	20-150	Προληπτικές εφαρμογές ξεκινώντας από την άνθηση ως και την ωρίμανση των καρπών. (BBCH 60-89)	6/7
Ροδακινιά PRNPS, PRNPN Βερυκοκιά PRNAR Δαμασκηνιά PRNDO	<u>Χρήσεις ήσσοнос σημασίας:</u> Κλαδοσπόριο* <i>Venturia carpophila</i> VENTCA Σκωρίαση* <i>Tranzschelia pruni-spinosae</i> var. <i>pruni-spinosae</i> TRANPS Βακτηριώσεις* <i>Xanthomonas</i> sp XANTSP	50	20-150	Προληπτικές εφαρμογές ξεκινώντας από την άνθηση ως και την ωρίμανση των καρπών. (BBCH 60-89)	6/7
Κερασιά* PRNAV Βυσσινιά* PRNCE Χρήσεις Ήσσοнос	Κλαδοσπόριο <i>Venturia carpophila</i> VENTCA Σκωρίαση	50	20-150	Προληπτικές εφαρμογές ξεκινώντας από την άνθηση ως και την ωρίμανση των καρπών.	6/7

Σημασία	<i>Tranzschelia pruni-spinosae</i> var. <i>pruni-spinosae</i> TRANPS Βακτηριώσεις <i>Xanthomonas</i> sp XANTSP Φαιά σήψη <i>Monilia</i> sp. MONISP			(BBCH 60-89)	
Πορτοκαλιά CIDSΙ Μανταρινιά CIDRE Λεμονιά CIDLI	<u>Χρήση ήσσονος σημασίας:</u> Βακτηριώσεις* <i>Xanthomonas</i> sp XANTSP	50	20-150	Προληπτικές εφαρμογές ξεκινώντας από την άνθηση ως και την ωρίμαση των καρπών. (BBCH 60-89)	6/7
Ελιά OLVEU (επιτραπέζια κι ελαιοποιήσιμη)	<u>Χρήσεις ήσσονος σημασίας:</u> Γλοιοσπόριο* <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> COLLGL <i>Colletotrichum acutatum</i> COLLAC <i>Colletotrichum clavatum</i> COLLCL	50	20-150	Προληπτικές εφαρμογές μέχρι την πλήρη ωρίμαση των καρπών. (BBCH 15-89)	6/7
Ακτινίδιο* ATIDE Χρήση Ήσσονος Σημασίας	Τεφρά σήψη <i>Botrytis cinerea</i> BOTRCI	50	20-150	Προληπτικές εφαρμογές ξεκινώντας από την άνθηση ως και την ωρίμαση των καρπών. (BBCH 60-89)	6/7

Παρατηρήσεις:

- Χρησιμοποιήστε το σε συνδυασμό ή σε εναλλαγή με άλλα εγκεκριμένα προϊόντα εναντίον του βοτρώτη.
- Συστήνεται η εφαρμογή του ψεκαστικού διαλύματος μέχρι απορροής, αποφεύγοντας τις ώρες με υψηλή θερμοκρασία ή χαμηλή σχετική υγρασία.
- Να μην χρησιμοποιείται κατά την διάρκεια ή εάν αναμένεται βροχόπτωση.
- Χρησιμοποιήστε τον μεγαλύτερο όγκο ψεκαστικού υγρού για μεγαλύτερα ή πυκνότερα πρέμνα.
- Για καλύτερα αποτελέσματα εφαρμόστε πριν την προσβολή. Το Serifel® παρέχει προληπτική προστασία. Επαναλάβετε συχνά την εφαρμογή.
- Η χρήση στη Ροδακινιά περιλαμβάνει και τη Νεκταρινιά.**

***Για τις χρήσεις ήσσονος σημασίας:**

Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες ήσσονος σημασίας από τη χρήση του σκευάσματος. Για την χρήση του σκευάσματος στις καλλιέργειες αυτές ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του.

- II. Διάθεση αποθεμάτων
1. Η ετικέτα του σκευάσματος να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
 2. Για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, επιτρέπεται η τοποθέτηση στις συσκευασίες του σκευάσματος της μέχρι σήμερα ισχύουσας ετικέτας.
 3. Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις συσκευασίες του σκευάσματος θα τοποθετείται υποχρεωτικά η νέα τροποποιημένη ετικέτα.
- III. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 3626/50852/05.06.2018 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ