



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 31.03.2023
Αριθ. πρωτ: 3187/84570

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Αθήνα
Πληροφορίες: Α. Μπρατίδου Παρλαπάνη
Τηλέφωνο: 210 9287228
e-mail: abratidou@minagric.gr

Προς: Syngenta Hellas Μονοπρόσωπη ΑΕΒΕ,
Λ. Ανθούσας, Τ.Κ. 153 49,
Ανθούσα Αττικής
email: voula.kalliakaki@syngenta.com

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθμ. 14459 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) PROVEC 1.8 EC (abamectin 1,8% β/ο) ως προς το φάσμα δράσης, τα στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους, τις δηλώσεις προφύλαξης και την προστασία των καταναλωτών»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις:
 - Του ν. 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - Του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 - Του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
- Τους κανονισμούς, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν:
 - (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 45 αυτού.
 - (ΕΕ) 2023/515 της Επιτροπής της 8^{ης} Μαρτίου 2023 για την ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας abamectin, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής.
- Την αριθμ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β' 4612/19-10-20).
- Την αριθμ. 7803/85931/07.08.2013 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμ. 14459 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) PROVEC 1.8 EC (abamectin 1,8% β/ο), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
- Την αριθμ. 3187/84570/20.03.2023 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- Τροποποιούμε την αριθμ. **14459** άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (**εντομοκτόνο**) **PROVEC 1.8 EC (abamectin 1,8% β/ο)**, που χορηγήθηκε με την αριθμ. 7803/85931/07.08.2013 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς το φάσμα δράσης, τα στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους, τις δηλώσεις προφύλαξης και την προστασία των καταναλωτών.
Τα σημεία **5, 8, 11, και 13** διαμορφώνονται ως εξής:

5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		κ.εκ./στρ.	κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ.		
Καλλωπιστικά (Θ) (φυτά-βολβοί και βολβώδη ανθικά φυτά – δένδρα θάμνοι και φυτώρια δασικών δένδρων)	Τετράνυχος <i>Tetranychus urticae</i> (TETRUR) Λυριόμυζα <i>Liriomyza trifolii</i> (LIRITR) Θρίπας <i>Frankliniella occidentalis</i> (FRANOC) <i>Eriophyes spp.</i> (ERPHSP) Ψύλλα <i>Psylla spp</i> (PSYLSP)	100	75-100	100	Ψεκασμός φυλλώματος με την έναρξη των προσβολών.	Μέχρι 4 εφαρμογές με 7 ημέρες Μεσοδιάστημα.
Τομάτα (Θ) (LYPES)	Τετράνυχος <i>Tetranychus urticae</i> (TETRUR) Λυριόμυζα <i>Liriomyza sp.</i> (LIRISP) Θρίπας <i>Frankliniella occidentalis</i> (FRANOC) <i>Thrips sp</i> (THRISP)	120	80-100	50-120	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Από την εμφάνιση του 2^{ου} πραγματικού φύλλου στον κύριο βλαστό έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών. (BBCH 12-89)	Μέχρι 4 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες.
Μελιτζάνα (Θ) (SOLME)	Τετράνυχος <i>Tetranychus urticae</i> (TETRUR) Λυριόμυζα <i>Liriomyza sp.</i> (LIRISP) Θρίπας <i>Frankliniella occidentalis</i> (FRANOC) <i>Thrips sp</i> (THRISP)	120	80-100	50-120	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Από την εμφάνιση του 2^{ου} πραγματικού φύλλου στον κύριο βλαστό έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών. (BBCH 12-89).	Μέχρι 4 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες.
Πιπεριά (Θ) (CPSAN)	Τετράνυχος <i>Tetranychus urticae</i>	120	80-100	50-120	Ψεκασμός φυλλώματος με την	Μέχρι 4 εφαρμογές

	<p>(TETRUR) Λυριόμυζα <i>Liriomyza sp.</i> (LIRISP) Θρίπας <i>Frankliniella occidentalis</i> (FRANOC) <i>Thrips sp</i> (THRISP)</p>				<p>εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Από την εμφάνιση του 2^{ου} πραγματικού φύλλου στον κύριο βλαστό έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών. (BBCH 12-89)</p>	<p>με μεσοδιάστημα 7 ημέρες.</p>
<p>Αγγούρι (Θ) (CUMSA) Κολοκύθι (Θ) (CUUPG)</p>	<p>Τετράνυχος <i>Tetranychus urticae</i> (TETRUR) Λυριόμυζα <i>Liriomyza sp.</i> (LIRISP) Θρίπας <i>Frankliniella occidentalis</i> (FRANOC) <i>Thrips sp</i> (THRISP)</p>	120	80-100	50-120	<p>Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και των πρώτων ακάρεων. Οι μεγάλες δόσεις να εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση μεγάλων πληθυσμών. Από την εμφάνιση των κοτυληδόνων έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών. (BBCH 10-89)</p>	<p>Μέχρι 4 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες.</p>
<p>Πεπόνι (Θ) (CUMME) Καρπούζι (Θ) (CITLA)</p>	<p>Τετράνυχος <i>Tetranychus urticae</i> (TETRUR) Λυριόμυζα <i>Liriomyza sp</i> (LIRISP) Θρίπας <i>Frankliniella occidentalis</i> (FRANOC) <i>Thrips sp</i> (THRISP)</p>	120	80-100	50-120	<p>Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και των πρώτων ακάρεων. Οι μεγάλες δόσεις να εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση μεγάλων πληθυσμών. Από την εμφάνιση των κοτυληδόνων έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών. (BBCH 10-89)</p>	<p>Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες.</p>

Μαρούλι (Θ) (LACSA)	Θρίπας <i>Frankliniella occidentalis</i> (FRANOC)	50	75-100	50	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και των πρώτων ακάρεων. Οι μεγάλες δόσεις να εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση μεγάλων πληθυσμών. Από την εμφάνιση του 2^{ου} φύλλου έως τη συγκομιδή. (BBCH 12-55)	Μέχρι 4 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες.
Μαϊντανός (Θ) (PARCR)	Θρίπας <i>Frankliniella occidentalis</i> (FRANOC)	50	75-100	50	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και των πρώτων ακάρεων. Οι μεγάλες δόσεις να εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση μεγάλων πληθυσμών. Από την εμφάνιση του 2^{ου} φύλλου έως την εμφάνιση των πρώτων ανθέων (παραμένουν κλειστά). (BBCH 12-55)	Μέχρι 4 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες.
Άνηθος (Θ) (AFEGR)	Θρίπας <i>Frankliniella occidentalis</i> (FRANOC)	50	75-100	50	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και των πρώτων ακάρεων. Οι μεγάλες δόσεις να εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση μεγάλων	Μέχρι 4 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες.

					<p>πληθυσμών. Από την εμφάνιση του 2^{ου} φύλλου έως την εμφάνιση των πρώτων ανθέων (παραμένουν κλειστά). (BBCH 12-55)</p>	
--	--	--	--	--	---	--

8 Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις εγκεκριμένες καλλιέργειες και στις συνιστώμενες δόσεις εφαρμογής.

11 Δηλώσεις προφύλαξης:

P405+102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.
 P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
 P260: Μην αναπνέετε σταγονίδια.
 P264: Πλένετε το δέρμα σχολαστικά μετά τον χειρισμό.
 P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.

«Φοράτε ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία, μπότες και γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση και τον ψεκασμό».

«Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας κατά την επανείσοδο στην καλλιέργεια πριν στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό».

P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

SP1: Μην μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα.

Spe8: Πιθανώς επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία τους ή κατά την περίοδο ανθοφορίας των ζιζανίων. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν.

Για την προστασία των μελισσών θα πρέπει οι μελισσοκόμοι της περιοχής να ενημερωθούν ώστε τα μελίσινα να απομακρυνθούν από την περιοχή για τουλάχιστον 96 ώρες από την ώρα εφαρμογής στις καλλιέργειες θερμοκηπίου για εξαπόλυση βομβίνων / μελισσών στα θερμοκήπια.

13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Τομάτες (Θ) (0231010), Μελιτζάνες(Θ) (0231030), Πιπεριές (Θ) (0231020), Αγγούρια (Θ) (0232010), Κολοκύθια (Θ) (0232030), Πεπόνια (Θ) (0233010), Καρπούζια (Θ) (0233030)	3
Μαρούλια (Θ) (0251020), Μαϊντανός (Θ) (0256040), Άνηθος (Θ) (0256030-006)	14
Καλλωπιστικά (Θ) (φυτά, βολβοί και βολβώδη ανθικά φυτά, δένδρα, θάμνοι και φυτώρια δασικών δένδρων)	Δεν ορίζεται

II. Διάθεση αποθεμάτων

1. Η τιμολόγηση των υπαρχόντων αποθεμάτων με την παλιά ετικέτα από τον κάτοχο της έγκρισης προς τα καταστήματα εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων επιτρέπεται έως και **01.04.2023**.
2. Η πώληση των υπαρχόντων αποθεμάτων με την παλιά ετικέτα από τα καταστήματα χονδρικής και λιανικής πώλησης επιτρέπεται έως και **01.09.2024**.
3. Η χρήση των υπαρχόντων αποθεμάτων με την παλιά ετικέτα από τους επαγγελματίες χρήστες επιτρέπεται έως και **01.10.2024**.

III. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 7803/85931/07.08.2013 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ