



## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 26.04.2023  
Αριθ. πρωτ: 3366/89645

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Αθήνα  
Πληροφορίες: Α. Μπρατίδου Παρλαπάνη  
Τηλέφωνο: 210 9287228  
e-mail: [abratidou@minagric.gr](mailto:abratidou@minagric.gr)

Προς: W. NEUDORFF GmbH KG, Γερμανίας  
(δια του υπεύθυνου επικοινωνίας της  
εταιρείας Τουτουτζιδάκης Αντώνιος & ΣΙΑ  
Ε.Ε.- «AGRIBIZ»)  
email: [a.toutoutzidakis@agribiz.gr](mailto:a.toutoutzidakis@agribiz.gr)

**ΘΕΜΑ:** «Διεύρυνση της αριθμ. 14685 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) ERGON-NI (Paraffin oil 83% β/ο, CAS 8042-47-5) σε ήσσονος σημασίας χρήσεις»

## ΑΠΟΦΑΣΗ

## Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις:
  - Του ν. 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  - Του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
  - του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
- Τον κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 51 αυτού.
- Την αριθμ. 10088/115732/26.09.2013 Υπουργική απόφαση (Β'/2587) σχετικά με την «Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσονος σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσονος σημασίας».
- Την αριθμ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β' 4612/19-10-20).
- Το αριθμ. 12862/330936/07.12.2020 έγγραφο της Υπηρεσίας με θέμα «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά».
- Την αριθμ. 11759/157750 π.ε./06.02.2019 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμ. 14685 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) ERGON-NI (Paraffin oil 83% β/ο, CAS 8042-47-5), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
- Την αριθμ. 3366/89645/23.03.2023 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- Διευρύνουμε την αριθμ. **14685** άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (**εντομοκτόνο**) ERGON-NI (Paraffin oil 83% β/ο, CAS 8042-47-5), που χορηγήθηκε με την αριθμ. 11759/157750 π.ε./06.02.2019 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε ήσσονος σημασίας χρήσεις.

Τα σημεία **5, 11 και 13** διαμορφώνονται ως εξής:

## 5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Χρόνος εφαρμογής	Μέγ. αριθμός εφαρμ/ ανά καλλ. περίοδο Μεσοδιάστ. Εφαρμογών σε ημέρες
		κ.εκ. σκευάσματος /100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα/ στρ.)	κ.εκ. σκευάσματος / στρ		
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ Λεμονιά CIDLI, Μανταρινιά (Κλημεντίνες) CIDRE, Πορτοκαλιά CISDI	Κόκκινη ψώρα ( <i>Aonidiella aurantii</i> ) AONDAU	1000-1500	100-220	1000-2240	Εφαρμογές πριν την αλλαγή χρώματος των καρπών (BBCH 00-81)	1 – 2 />60
	Παρλατόρια ( <i>Parlatoria pergandei</i> ) PARLPE και άλλες ψώρες					
	Αλευρώδεις ( <i>Dialeurodes citri</i> ) DIALCI, ( <i>Aleurothrix floccosus</i> ) ALTHFL	1000-1500	50-220	500-2240	Εφαρμογή πριν την αλλαγή χρώματος των καρπών (BBCH 00-81) ή μία φθινοπωρινή.	1 – 2 />60
ΜΗΛΟΕΙΔΗ: Μηλιά MABSD, Αχλαδιά PYUCO	Ψώρα Σαν-Ζοζέ ( <i>Quadraspidiotus perniciosus</i> ) QUADPE	750-1000	80-100	600-1000	Εφαρμογή πριν την αλλαγή χρώματος των καρπών. (BBCH 00-81)	1
	Κόκκινος τετράνυχος ( <i>Panonychus ulmi</i> ) METTUL	750-1000	125-150	940-1500	Εφαρμογή πριν την άνθηση (BBCH 54-56)	
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ Βερικοκιά PRNAR Κερασιά PRNAV Ροδακινιά PRNPS Δαμασκηλιά PRNDO	Ψώρα Σαν-Ζοζέ και άλλες ψώρες ( <i>Quadraspidiotus perniciosus</i> ) QUADPE	750-1000	80-100	600-1000	Εφαρμογή πριν την αλλαγή χρώματος των καρπών (BBCH 00-81)	1
	Κόκκινος και κίτρινος τετράνυχος ( <i>Panonychus ulmi</i> ) METTUL	750-1000	125	940-1250	Εφαρμογή πριν την άνθηση (BBCH 51-53)	
Ελιά (OLVEU)	<u>Χρήσεις Ήσσονος Σημασίας:</u> Παρλατόρια ( <i>Parlatoria oleae</i> *- PARLOL)	750-1000	80 - 150	600 - 1500	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής, από την πτώση των	1

	<p>Λεκάνιο (<i>Saissetia oleae</i>*- SAISOL)</p> <p>Πολλίνια (<i>Pollinia pollini</i>*- POLNPO)</p> <p>Άσπρη ψώρα (<i>Aspidiotus nerii</i>*- ASPDNE)</p> <p>Μυτιλόμορφη ψώρα (<i>Lepidosaphes ulmi</i>*-LEPSUL)</p> <p>Ψώρες (<i>Leucaspis riccae</i>*- LEUARI) (<i>Chrysomphalus dictyospermi</i>*- CHRYDI)</p> <p>Ακάρεα (<i>Eriophyes vitis</i>*- ERPHVI) (<i>Tegolophus hassani</i>*-TEGLSP) (<i>Oxycenus maxwelli</i>*- OXYNMA) (<i>Eotetranychus carpini</i>*-EOTECA)</p>				πετάλων ως μικρούς καρπούς (BBCH 67-79)	
<p>Ακτινιδιά* (ATIDE)</p> <p>Χρήση Ήσσοнос Σημασίας</p>	<p>Ψώρα Σαν Ζοζέ (<i>Quadraspidotus perniciosus</i>) QUADPE</p> <p>Βαμβακάδα ή Διάσπις (<i>Pseudaulacaspis pentagona</i>) PSEAPE)</p> <p>Μετκάλφα (<i>Metcalfa pruinosa</i>) METFPR)</p> <p>Βαμβακάδα (<i>Euphyllura sp.</i>)- EUPHSP)</p> <p>Κίτρινος Τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i>) TETRUR)</p>	750-1000	80 - 150	600 - 1500	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής, πριν την άνθηση και μετά τη συγκομιδή (BBCH 50-90)	1

	Κόκκινος Τετράνυχος ( <i>Metatetranychus ulmi</i> ) METTUL)					
<b>Αμυγδαλιά*</b> PRNDU	<b>Κοκκοειδή Ψώρα Σαν Ζοζέ <i>Quadraspidiotus perniciosus</i> QUADPE</b>	<b>750-1000</b>	<b>80-150</b>	<b>600- 1500</b>	<b>Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής από την ροζ κορυφή και μετά τη συγκομιδή. (BBCH 57-69 και BBCH 99)</b>	<b>2</b>
<b>Καρυδιά*</b> IUGRE						
<b>Φιστικιά*</b> PIAVE	<b>Βαμβακάδα ή Διάσπιν <i>Pseudalacaspis pentagona</i> PSEAPE <i>Planococcus / Pseudococcus</i> sp. PSECSP</b>					
<b>Χρήσεις Ήσσανος Σημασίας</b>	<b>Μυτιλόμορφη ψώρα <i>Lepidosaphes ulmi</i> LEPSUL</b>					
	<b>Κόκκινη ψώρα <i>Aonidiella aurantii</i> AONDAU</b>					
	<b>κ.α. ψώρες <i>Sphaerolecanium prunastri</i> LECAPN <i>Eulecanium persicae</i> LECAPE <i>Melanaspis inopinata</i> MELAIN</b>					
	<b>Κίτρινος τετράνυχος <i>Tetranychus urticae</i> TETRUR</b>					

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :**

1. Το εύρος των δόσεων και ο όγκος ψεκαστικού υγρού είναι ανάλογα με το ύψος των φυτών και την ένταση της προσβολής.
2. Στα εσπεριδοειδή η συνιστώμενη δόση θα πρέπει να συνδυαστεί με τον κατάλληλο όγκο ψεκαστικού υγρού ώστε να μην υπερβαίνεται η μέγιστη δόση/στρ.
3. Κατά τη χρήση του ERGON-NI τα δένδρα πρέπει να είναι ποτισμένα. Ποτίζουμε μία εβδομάδα πριν από τον ψεκασμό.
4. Αποφύγετε τον ψεκασμό όταν τα φυτά είναι στρεσαρισμένα, σε περιόδους έντονης ξηρασίας, υπερβολικής υγρασίας και όταν υπάρχει παγετός.
5. Να μην γίνεται εφαρμογή με το σκεύασμα, την περίοδο ανθοφορίας ή όταν η θερμοκρασία ξεπερνάει τους 32°C γιατί μπορεί να εμφανιστούν προβλήματα φυτοτοξικότητας.

6. Να μη γίνεται εφαρμογή με το σκεύασμα επί 30 ημέρες πριν ή μετά την εφαρμογή θείου ή θειασβεστίου.
7. Να μην προηγείται ή έπεται εφαρμογή σκευασμάτων με δ.ο. captan, folpet και dithianon σε διάστημα τουλάχιστον 1 εβδομάδας.

\*«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες ελιάς, ακτινιδιάς, **αμυγδαλιάς, καρυδιάς και φιστικιάς** από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του»

### 11 Δηλώσεις προφύλαξης:

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.  
 P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείται αυτό το προϊόν.  
 P202: Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφύλαξης.  
 P501: Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Spr1: Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. (Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα/ Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω του συστήματος αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους).

Spr3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια απξέκαστη ζώνη προστασίας από τα επιφανειακά ύδατα:

-10 μέτρων σε εσπεριδοειδή και σε όψιμες εφαρμογές σε μηλοειδή, πυρηνόκαρπα, ελιά, ακτινιδιά, **αμυγδαλιά, καρυδιά και φιστικιά.**

-20 μέτρων σε πρώιμες εφαρμογές σε μηλοειδή, πυρηνόκαρπα, ελιά, ακτινιδιά, **αμυγδαλιά, καρυδιά και φιστικιά.**

### 13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Καλλιέργεια	Ημέρες
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ Λεμονιά , Μανταρινιά (Κλημεντίνες), Πορτοκαλιά	Καθορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του σκευάσματος
ΜΗΛΟΕΙΔΗ Μηλιά , Αχλαδιά	Καθορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του σκευάσματος
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ Βερικοκιά, Κερασιά, Ροδακινιά, Δαμασκηλιά	Καθορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του σκευάσματος
Ελιά, Ακτινιδιά, <b>Αμυγδαλιά (0120010), Καρυδιά (0120110), Φιστικιά(0120100)</b>	Καθορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του σκευάσματος

- II.** Διάθεση αποθεμάτων
1. Η ετικέτα του σκευάσματος να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
  2. Για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, επιτρέπεται η τοποθέτηση στις συσκευασίες του σκευάσματος της μέχρι σήμερα ισχύουσας ετικέτας.
  3. Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις συσκευασίες του σκευάσματος θα τοποθετείται υποχρεωτικά η νέα τροποποιημένη ετικέτα.
- III.** Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 11759/157750 π.ε./06.02.2019 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας»  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

**Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ**