



**ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ** ως προς τον μέγιστο αριθμό εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο στην καλλιέργεια της μηλιάς, 14.06.2023

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**  
**ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**  
**Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ**  
**ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

**Αθήνα, 02.06.2023**  
**Αριθ. πρωτ: 6031/163148**

**Ταχ. Δ/ση:** Λ. Συγγρού 150 **Προς:** BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ  
**Ταχ. Κώδικας:** 176 71 - ΑΘΗΝΑ **Σωρού 18-20, 15125, Μαρούσι**  
**Πληροφορίες:** Δ. Μακρογιάννη  
**Τηλέφωνο:** 210 9287160  
**e-mail:** [dmakrogianni@minagric.gr](mailto:dmakrogianni@minagric.gr) **e-mail:** [ioannis.tsoutsanis@bayer.com](mailto:ioannis.tsoutsanis@bayer.com)

**ΘΕΜΑ:** «Διεύρυνση της αριθμ. 6955 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) FLINT 50 WG (trifloxystrobin 50% β/β) σε ήσσονος σημασίας χρήσεις»

#### **ΑΠΟΦΑΣΗ**

#### **Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
  - α) Του ν. 4036/2012 (Α'8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  - β) Του ν. 2690/1999 (Α'45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
  - γ) Του ν. 4622/2019 (Α'133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 51 αυτού.
3. Την αριθμ. 10088/115732/26.09.2013 Υπουργική απόφαση (Β'/2587) σχετικά με την «Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσονος σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσονος σημασίας».
4. Την αριθμ. 1881/286212/13.10.2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β'4612/19.10.20).
5. Το αριθμ. 12862/330936/07.12.2020 έγγραφο της Υπηρεσίας με θέμα «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά».
6. Την αριθμ. 100997/30.04.2004 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η αριθμ. 6955 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) FLINT 50 WG (trifloxystrobin 50% β/β), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
7. Την αριθμ. 6031/163148/29.05.2023 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ**

1. Διευρύνουμε την αριθμ. 6955 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) FLINT 50 WG (trifloxystrobin 50% β/β), που χορηγήθηκε με την αριθμ. 100997/30.04.2004 απόφασή μας, σε ήσσονος σημασίας χρήσεις.

Το σημείο 5 διαμορφώνεται ως εξής:

5 Φάσμα δράσης						
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα επεμβάσεων σε ημέρες
		γρ. σκευάσμ. / στρέμμα (max)	γρ. σκευάσμ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα		
Αμπέλι (Οινοποιήσιμες ποικιλίες, Επιτραπέζιες ποικιλίες, Σταφίδα) VITVI	Ωίδιο <i>Uncinula necator</i> UNCINE	12,5	12,5	30-100	Προληπτικές επεμβάσεις από το στάδιο μήκους βλαστού 10 εκ. μέχρι το κλείσιμο της σταφυλής. Το προϊόν εμφανίζει δευτερεύουσα δράση εναντίον του περονόσπορου ( <i>Plasmopara viticola</i> ). (BBCH 14 – 79)	3/10-14
Μηλιά MABSD	Φουζικλάδιο <i>Venturia inaequalis</i> VENTIN	7,5-10	7,5-10	100-150	Προληπτικές επεμβάσεις από το στάδιο της πράσινης κορυφής μέχρι μέγεθος καρπού ημίσειας του τελικού. Για το φουζικλάδιο και το ωίδιο θεραπευτικές επεμβάσεις με τη δόση των 10 γρ. σκευάσματος / 100 λίτρα νερό και μόνο κατόπιν σύστασης από τις γεωργικές προειδοποιήσεις. (BBCH 09 - 75)	3/10-12
	Ωίδιο <i>Podosphaera leucotricha</i> PODOLE	10	10	100-150		
Αχλαδιά PYUCO	Φουζικλάδιο <i>Venturia inaequalis</i> VENTIN	7,5-10	7,5-10	100-150		
	Ωίδιο <i>Podosphaera leucotricha</i> PODOLE	10-15	10	100-150		
	Στεμφύλιο <i>Stemphylium spp.</i> STEMSP	15	15	100		
Ροδακινιά PRNPS Νεκταρινιά PRNPN Βερικοκιά PRNAR	Ωίδιο <i>Sphaerotheca pannosa</i> SPHRPA	15	15	100	Από την πτώση των πετάλων μέχρι το μέγεθος του καρπού να φτάσει το 90% τελικού μεγέθους. (BBCH 69 - 79)	3/10-14
Ροδακινιά PRNPS	<u>Χρήση ήσσονος σημασίας:</u> Κλαδοσπορίωση* <i>Venturia carophila</i>	15	15	100	Από την πτώση των πετάλων μέχρι το μέγεθος του καρπού να φτάσει το 90% τελικού	3/10-14

	( <i>Cladosporium carophilum</i> ) VENTCA				μεγέθους. (BBCH 69 - 79)	
Ελιά OLVEU	Κυκλοκόνιο <i>Cycloconium oleaginum</i> CYCLOL  <u>Χρήση ήσσονος σημασίας:</u> Γλοιοσπόριο * <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> COLLGL <i>Colletotrichum acutatum</i> COLLAC <i>Colletotrichum clavatum</i> COLLCL	10-15	10	100-150	Από το στάδιο όπου οι βλαστοί φτάνουν το 70% του τελικού μεγέθους μέχρι και το στάδιο όπου ο καρπός αποκτάει ανοιχτό πράσινο-κίτρινο χρώμα. (BBCH 37 - 79)	2 / Μόνο 1 εφαρμογή επιτρέπεται κατά τη διάρκεια του Φθινοπώρου.
Τομάτα (Θ) LYPES	Ωίδιο <i>Leveillula taurica</i> LEVETA	12,5	12,5	100	Προληπτικές επεμβάσεις (πριν την εμφάνιση των συμπτωμάτων). (BBCH 21 - 89)	3/10-14
Πεπόνι (Α,Θ) CUMME	Ωίδιο <i>Erysiphe cichoracearum</i> ERYSCI <i>Sphaerotheca fuliginea</i> SPHRFU	12,5 25**	12,5 25**	100	Προληπτικές επεμβάσεις (πριν την εμφάνιση των συμπτωμάτων). (BBCH 21 - 89)	3/10-14
Ρύζι ORYSA	Καφέ κηλίδωση φύλλων <i>Bipolaris sp.</i> BIOPSP  Πυρικούλάρια <i>Pyricularia oryzae</i> PYRIOR	25	---	30-60	Προληπτικές επεμβάσεις (πριν την εμφάνιση των συμπτωμάτων) από την έναρξη επιμήκυνσης του στελέχους έως την έναρξη της άνθησης. (BBCH 30-61)	1

Παρατηρήσεις:

\*«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα στο γλοιοσπόριο της ελιάς και την **κλαδοσπορίωση της ροδακινιάς**. Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα από την εφαρμογή του σκευάσματος».

\*\*Στο πεπόνι προτείνεται η εφαρμογή της μεγαλύτερης δόσης των 25 γρ. σκευάσματος / 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού, υπό συνθήκες υψηλής πίεσης προσβολής και για μεγαλύτερα μεσοδιαστήματα.

- II. Διάθεση αποθεμάτων
1. Η ετικέτα του σκευάσματος να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
  2. Για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, επιτρέπεται η τοποθέτηση στις συσκευασίες του σκευάσματος της μέχρι σήμερα ισχύουσας ετικέτας.
  3. Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις συσκευασίες του σκευάσματος θα τοποθετείται υποχρεωτικά η νέα τροποποιημένη ετικέτα.
- III. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 100997/30.04.2004 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας»  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

**Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ**