



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
Πληροφορίες: Π. Βαχαμίδης  
Τηλέφωνο: 210 9287237  
e-mail: [pvachamidis@minagric.gr](mailto:pvachamidis@minagric.gr)

Αθήνα, 5/7/2023  
Αριθμ. πρωτ: 6833/190709

Προς: **Albaugh TKI d.o.o.**  
(δια του υπεύθυνου επικοινωνίας  
της εταιρείας,  
Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε.-«Agribiz»,  
e-mail: [info@agribiz.gr](mailto:info@agribiz.gr))

**ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθμό 60821 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) DIAGONAL (δ.ο. azoxystrobin 25% β/ο), ως προς το φάσμα δράσης, τις δηλώσεις προφύλαξης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή»**

#### ΑΠΟΦΑΣΗ

#### Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
  - α) του ν. 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  - β) του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α' 45).
  - γ) του ν. 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 45 αυτού.
3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2023/129 της Επιτροπής της 18<sup>ης</sup> Ιανουαρίου 2023 για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων των ουσιών azoxystrobin, prosulfocarb, sedaxane και valifenalate μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα.
4. Τη με αριθ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β' 4612/19-10-20).
5. Το με αριθ. πρωτ. 12862/330936/07.12.2020 έγγραφο της Υπηρεσίας με θέμα «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά».
6. Τη με αριθ. πρωτ. 9636/127239/15.01.2019 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 60821 άδεια διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) DIAGONAL (δ.ο. azoxystrobin 25% β/ο).

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

7. Τη με αριθ. πρωτ. 6833/190709/19.06.2023 αίτηση της εταιρείας Albaugh TKI d.o.o., δια της υπεύθυνης επικοινωνίας εταιρείας Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε.– «AGRIBIZ».

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

**Α** Τροποποιούμε τη με αριθμό 60821 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) **DIAGONAL** (azoxystrobin 25% β/ο), που χορηγήθηκε με την υπ. αριθ. πρωτ. 9636/127239/15.01.2019 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς το φάσμα δράσης, τις δηλώσεις προφύλαξης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή.

Τα σημεία **5**, **11** και **13** διαμορφώνονται ως εξής:

5 Φάσμα δράσης					
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Χρόνος εφαρμογής	Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες
		Όγκος ψεκ. Υγρού (λ./στρ.)	κ.εκ. σκ./στρ.		
Τομάτα LYPES (Θερμοκηπίου)	Ωίδιο ( <i>Leveillula taurica</i> - LEVETA)	50-100	80	Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων, από την έναρξη της άνθησης (BBCH 51-89)	1-2/ 10
Μελιτζάνα (Θερμοκηπίου)* (SOLME)  χρήση ήσσονος σημασίας	Ωίδιο ( <i>Leveillula taurica</i> - LEVETA)	50-100	80	Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων, από την έναρξη της άνθησης (BBCH 51-89)	1-2/ 10
Αγγούρι (CUMSA), Αγγουράκι (CUMSG), Κολοκυθάκι (CUUPG) (Θερμοκηπίου)	Ωίδιο ( <i>Sphaerotheca fuliginea</i> - SPHRFU)	50-100	80	Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων, από την έναρξη της άνθησης (BBCH 31-69)	1-3 /10
Πεπόνι (CUMME), Καρπούζι	Ωίδιο ( <i>Sphaerotheca fuliginea</i> - SPHRFU)	50-100	80	Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων	1-3 /10

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

(CITLA), Κολοκύθα (CUUPE)  (Θερμοκηπίου)				συμπτωμάτων από την έναρξη της άνθησης (BBCH 31-69)	
Ρύζι (ORYSA)	Πυρικούλάρια ( <i>Pyricularia oryzae</i> - PYRIOR) Ελμινθοσπορίωση ( <i>Helminthosporium</i> sp. - HELMSP)	20-40	100	Μία εφαρμογή από το στάδιο φουσκώματος του κολεού – μέχρι το τέλος του ξεσταχυάσματος (BBCH 43-87)	1
Πατάτα (SOLTU)	Αλτερναρίωση ( <i>Alternaria solani</i> - ALTESO)	20-60	50	Ψεκασμός φυλλώματος. Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων, από το στάδιο εμφάνισης της 1 <sup>ης</sup> ταξιανθίας έως τον μεταχρωματισμό των καρπών της 1 <sup>ης</sup> ταξιανθίας (BBCH 51-85)	1-2/14
<u>Ψυχανθή:</u> Μπιζέλια με λοβό (PIBSX) Μπιζέλια χωρίς λοβό (PIBSX),  <u>Όσπρια:</u> Μπιζέλια (PISBX)	Ασκοχύτωση ( <i>Ascochyta pisi</i> - ASCOPI)  <u>Χρήση ήσσονος σημασίας:</u> Σκωρίαση ( <i>Uromyces pisi</i> ** - UROMPS)	15-80	80-100	Ψεκασμοί φυλλώματος. Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων, από την εμφάνιση του 7 <sup>ου</sup> φύλλου/ έλικα έως ότου το 20% των λοβών έχουν φθάσει το τυπικό τους μέγεθος. (BBCH 17-72)	1-2/10
<u>Ψυχανθή:</u> Φασόλια με λοβό (PHSVX) Φασόλια χωρίς λοβό (PHSVX), Κουκιά (φρέσκα) (VICFX)	Ασκοχύτωση ( <i>Ascochyta fabae</i> - ASCOFA)  <u>Χρήση ήσσονος σημασίας:</u> Σκωρίαση ( <i>Uromyces pisi</i> ** - UROMPS)	15-80	80-100	Ψεκασμοί φυλλώματος. Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων, από την εμφάνιση του πρώτου πλάγιου βλαστού έως οι λοβοί αποκτήσουν το	1-2/10

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Όσπρια: Φασόλια (PHSVX), Κουκιά (VICFX)				τυπικό τους μέγεθος. (BBCH 20-79)	
Πιπεριά (Θ) (CPSAN)	Ωίδιο ( <i>Leveillula taurica</i> - LEVETA)	30-60	80-100	Ψεκασμός φυλλώματος. Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων, από την εμφάνιση των πρώτων ταξιανθιών έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών. (BBCH 51-89)	1-2/10
Μπρόκολο* (BRSOK)  (χρήση ήσσονος σημασίας)	Περονόσπορος ( <i>Peronospora parasitica</i> - PEROPA)	30-60	80-100	Ψεκασμός φυλλώματος. Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων, από το στάδιο έναρξης σχηματισμού της κεφαλής έως ότου φθάσει στο 80% του τυπικού μεγέθους και μορφής (BBCH 41-48)	1-2/10
Αγκινάρα* (CYUSC)  (χρήση ήσσονος σημασίας)	Ωίδιο ( <i>Leivulla taurica</i> - LEVETA)	30-60	80-100	Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων, ψεκασμός φυλλώματος μέχρι την εμφάνιση της ανθοταξίας (κεφαλής) (BBCH 41-55)	1-2/10
Λωτός* (DOSKA)  (χρήση ήσσονος σημασίας)	Μυκοσφαιρέλα ( <i>Mycosphaerella nawae</i> -MYCONA)	50-100	80-100	Ψεκασμός φυλλώματος. Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων κατά την περίοδο	1-2/10

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

				της άνθησης (BBCH 60-69)	
<b>Ελαιοκράμβη (BRSNN)</b>	<b>Αλτερναρίωση (<i>Alternaria sp.-</i> ALTESP)</b>	<b>20-40</b>	<b>100</b>	<b>Ψεκασμός φυλλώματος. Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων, από την αρχή της άνθησης μέχρι την πτώση των πετάλων. (BBCH 60-67)</b>	<b>1-2/ 10-14</b>

Παρατηρήσεις:

1. Στο ρύζι, η εφαρμογή να πραγματοποιείται σε χωράφια που δεν είναι πλημμυρισμένα.

2. Μπορεί να παρατηρηθεί διαφοροποίηση στη γεύση του ραφινάρισμένου λαδιού καλλιέργειας ελαιοκράμβης στην οποία εφαρμόστηκε το σκεύασμα.

\*«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στην καλλιέργεια της Μελιτζάνας (Θ), του μπρόκολου, της Αγκινάρας και του λωτού από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις εν λόγω χρήσεις, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος».

\*\*«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα για τη σκωρίαση στα μπιζέλια (ψυχανθή) με και χωρίς λοβό, μπιζέλια (όσπρια), φασόλια (ψυχανθή) με και χωρίς λοβό, κουκιά (φρέσκα), φασόλια (όσπρια) και στα κουκιά (όσπρια). Για τις εν λόγω χρήσεις, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα από τη χρήση του σκευάσματος».

**11** Δηλώσεις  
προφύλαξης

**P405+P102:** Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.

**P270:** Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

**P264:** Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό.

**P280:** Να φοράτε προστατευτικά γάντια και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια.

**P501:** Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

*Φοράτε ολόσωμη φόρμα και κατάλληλα γάντια κατά την ανάμιξη / φόρτωση και κατά την εφαρμογή.*

*Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια φοράτε ολόσωμη φόρμα και κατάλληλα γάντια.*

**SP1:** Μη ρυπαίνετε τα νερά με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

**SPe2:** Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να μην εφαρμόζεται σε αποστραγγιζόμενα εδάφη για τις καλλιέργειες της πατάτας, του φασολιού (όψιμη εφαρμογή) και των κουκιών (όψιμη εφαρμογή).

**SPe3:** Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε:

- μία φυτική ζώνη ανάσχεσης 10 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα για τις καλλιέργειες μπιζελιού, κουκιών (πρώιμη εφαρμογή) και φασολιού (πρώιμη εφαρμογή), αγκινάρας και μπρόκολου

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

- μια φυτική ζώνη ανάσχεσης 20 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα για τις καλλιέργειες της τομάτας (Θ), της μελιτζάνας (Θ), των κολοκυνθοειδών (Θ), της πιπεριάς (Θ), του φασολιού (όψιμη εφαρμογή) και των κουκιών (όψιμη εφαρμογή)
- από τα επιφανειακά ύδατα μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 20 μέτρων ή 10 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μείωσης διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 75% ή χρήση ακροφυσίων μείωσης διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 90 % για την καλλιέργεια του λωτού.
- **μία φυτική ζώνη ανάσχεσης 10 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα για την καλλιέργεια της ελαιοκράμβης.**

**Spe3:** Για να προστατέψετε τα αρθρόποδα μη στόχους να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από μη καλλιεργούμενη γη για την καλλιέργεια του λωτού.

### 13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Τομάτα (Θ) (0231010), Μελιτζάνα (Θ) (0231030), Αγγούρι (Θ) (0232010), Αγγουράκι (Θ) (0232020), Κολοκυθάκι (Θ) (0232030), Πεπόνι (Θ) (0233010), Καρπούζι (Θ)(0233030), Κολοκύθα (Θ) (0233020), Πιπεριά (Θ) (0231020)	3
Πατάτα (0211000) Αγκινάρα (0270050)	7
Μπιζέλια με λοβό (0260030) Μπιζέλια χωρίς λοβό (0260040) Φασόλια με λοβό (0260010) Φασόλια χωρίς λοβό (0260020) Κουκιά (φρέσκα) (0260010) Μπρόκολο (0241010)	14
<b>Ελαιοκράμβη (0401060)</b>	<b>21</b>
Ρύζι (0500060)	28
Μπιζέλια (όσπρια) (0300030) Φασόλια (όσπρια) (0300010) Κουκιά (όσπρια) (0300010)	35
Λωτός (0161060)	Δεν ορίζεται, λόγω του χρόνου εφαρμογής του προϊόντος.

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**Β**

- Η ετικέτα του σκευάσματος να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
- Για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, επιτρέπεται η τοποθέτηση στις συσκευασίες του σκευάσματος της μέχρι σήμερα ισχύουσας ετικέτας.
- Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις συσκευασίες του σκευάσματος θα τοποθετείται υποχρεωτικά η νέα τροποποιημένη ετικέτα.

**Γ**

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθ. πρωτ. 9636/127239/15.01.2019 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας»**

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ κ.α.α**

**Χρ. Αραμπατζής**