



## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 14.07.2023  
Αριθ. πρωτ: 6512/179632

Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
Πληροφορίες: Μ.Παπαλέξη - Δ.Καραμάνου  
Τηλέφωνο: 210 9287247- 210 9287225  
e-mail: [mpapalexi@minagric.gr](mailto:mpapalexi@minagric.gr)  
[dkaramanou@minagric.gr](mailto:dkaramanou@minagric.gr)

Προς: EXCLUSIVAS SARABIA, S.A., Ισπανίας  
(δια του υπεύθυνου επικοινωνίας της  
εταιρείας Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και  
ΣΙΑ Ε.Ε. «Agribiz», Μιχαλακοπούλου 157,  
Τ.Κ. 115 27, Αθήνα)  
e-mail: [info@agribiz.gr](mailto:info@agribiz.gr)

**ΘΕΜΑ:** «Τροποποίηση της αριθμ. 60905 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) PHYTO SARCAN (δ.ο. potassium phosphonate 51% β/ο) ως προς τα στοιχεία του κατόχου της άδειας, του υπεύθυνου επικοινωνίας, του παρασκευαστή του σκευάσματος, ως προς τα εργοστάσια παρασκευής και συσκευασίας του σκευάσματος, το φάσμα δράσης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή»

## ΑΠΟΦΑΣΗ

## Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις:
  - Του ν. 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  - Του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
  - του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
- Τον κανονισμό όπως τροποποιήθηκε και ισχύει:
 

(ΕΚ) με αριθμ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 45.
- Το αριθμ. 79/2023 Π.Δ. "Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών" (Α' 131/27.06.2023).
- Την αριθμ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β' 4612/19-10-20).
- Το αριθμ. 12862/330936/07.12.2020 έγγραφο της Υπηρεσίας με θέμα «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά».
- Την αριθμ. 2281/39729/06.11.2019 μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμ. 60905 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) PHYTO SARCAN (δ. ο. potassium phosphonate 51% β/ο), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

7. Την αριθμ. 6512/179632/12.06.2023 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- II. Τροποποιούμε την αριθμ. **60905** άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (**μυκητοκτόνο**) **PHYTO SARCAN (δ.ο. potassium phosphonate 51% β/ο)**, η οποία χορηγήθηκε με την αριθμ. 2281/39729/06.11.2019 απόφαση μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς τα στοιχεία του κατόχου της άδειας, του υπεύθυνου επικοινωνίας, του παρασκευαστή του σκευάσματος, ως προς τα εργοστάσια παρασκευής και συσκευασίας του σκευάσματος, το φάσμα δράσης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή.

Συγκεκριμένα τα σημεία **1.4α), γ), δ), ε), 5** και **13** διαμορφώνονται ως εξής:

#### 1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

EXCLUSIVAS SARABIA, S.A.  
**Polígono Industrial Fondo de Litera, A2,  
 km 441,6, 22520 Fraga (Huesca), Ισπανία**  
 Josep Martí  
 Τηλ: (+34) 973 73 73 77  
 Fax : (+34) 973 73 66 90  
 Email: [jmarti@sarabia.eu](mailto:jmarti@sarabia.eu)

Υπεύθυνος επικοινωνίας

ΤΟΥΤΟΥΤΖΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. - AGRIBIZ  
**Μιχαλακοπούλου 157, 115 27, Αθήνα**  
 Τηλ.: 210 7471000  
 E-mail: [info@agribiz.gr](mailto:info@agribiz.gr)

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

EXCLUSIVAS SARABIA, S.A.  
**Polígono Industrial Fondo de Litera, A2,  
 km 441,6, 22520 Fraga (Huesca), Ισπανία**

δ) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1. EXCLUSIVAS SARABIA, S.A.  
 Camí de l'Albí – Ptda. Rec Nou s/n  
 25110 Alpicat (Lleida), Ισπανία
2. SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO. LTD.,  
 Binhai Economic Development Area  
 Weifang, Shandong 262737, Κίνα
3. QINGDAO RAINBOW CHEMICAL CO., LTD.  
 Xinhe Eco-Chemical Science and Technology industry Base,  
 Qingdao, Shandong 266717, Κίνα
4. NINGXIA RAINBOW CHEMICAL CO., LTD.  
 Taisha Industrial Park  
 Pingluo, Ningxia 266717, Κίνα

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1. EXCLUSIVAS SARABIA, S.A.  
Camí de l'Albí – Ptda. Rec Nou s/n  
25110 Alpicat (Lleida), Ισπανία
2. SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO. LTD.,  
Binhai Economic Development Area  
Weifang, Shandong 262737, Κίνα
3. QINGDAO RAINBOW CHEMICAL CO., LTD.  
Xinhe Eco-Chemical Science and Technology industry Base,  
Qingdao, Shandong 266717, Κίνα
4. NINGXIA RAINBOW CHEMICAL CO., LTD.  
Taisha Industrial Park  
Pingluo, Ningxia 266717, Κίνα

**5** Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και Χρόνος Εφαρμογής	Μέγ. αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες)
		κ.εκ./ στρ	κ.εκ / 100 λίτρα νερό	Όγκος ψεκ. Υγρού λίτρα/στρ		
Αμπέλι (οινοποιήσιμα και επιτραπέζια σταφύλια) VITVI	Περονόσπορος ( <i>Plasmopara viticola</i> ) PLASVI	75 - 250	150 - 250	50 - 100	Ψεκασμοί φυλλώματος από το τέλος ανάπτυξης του φυλλώματος και επανάληψη εάν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας. BBCH >20	3 / 10
Εσπεριδοειδή Γκρέιπ φρούτ CIDPA Λεμονιά CIDLI Μανταρινιά CIDRE Πορτοκαλιά CIDSI Φράπα CIDGR Λιμμετίες (Πράσινα λεμόνια)	Φυτόφθορα <i>Phytophthora</i> sp. (PHYTSP)	150 - 875	150 - 250	100 - 350	Ψεκασμοί φυλλώματος μετά την έκπτυξη των βλαστών BBCH >40	2/ 20

CIDAF Κιτριά CIDME Νεραντζιά CIDAU Περγαμόντο CIDAB						
Ελιά (επιτραπέζιες και ελαιοποιήσιμες ελιές) OLVEU	Κυκλοκόνιο ( <i>Spilocaea oleaginea</i> ) CYCLOL	120 - 250	150 - 250	80 - 100	Ψεκασμοί φυλλώματος από την έναρξη της βλάστησης έως την έναρξη χρωματισμού του καρπού (BBCH 11-81)	3 / 10 1 ψεκασμός το χειμώνα 2 ψεκασμοί την άνοιξη
Μαρούλι (Υ) LACSA	Περονόσπορος <i>Bremia lactucae</i> (BREMLA)	45 – 250	150 – 250	30 – 100	Ψεκασμοί φυλλώματος από την εμφάνιση του 2 <sup>ου</sup> πραγματικού φύλλου έως ότου η κεφαλή φθάσει στο τυπικό της μέγεθος και μορφή (BBCH 12-49)	3 / 10
Λυκοτρίβολο (Υ) VLLLO Σκαρόλες (πικρίδα) (Υ)/ πλατύφυλλα αντίδια (Υ) CICEL Κάρδαμο & άλλα βλαστάρια & φύτερες (Υ) LEPSA Γαιοκάρδαμο (Υ) BARVE Ρόκα (Υ) ERUVV Κόκκινο σινάπι (Υ) BRSJU Καλλιέργειες νεαρών φύλλων (συμπεριλαμβανομένων ειδών κράμβης) (Υ)	Περονόσπορος <i>Bremia lactucae</i> (BREMLA)	45 – 250	150 – 250	30 – 100	Ψεκασμοί φυλλώματος από την εμφάνιση του 2 <sup>ου</sup> πραγματικού φύλλου έως τα προς συγκομιδή φύλλα να φτάσουν στο τυπικό τους μέγεθος και μορφή (BBCH 12-49)	3 / 10

Φραγκομαϊντανός (Υ) ANRCE Σχοινόπρασο (Υ) ALLSC Φύλλα σέλινου (Υ) APUGS Μαϊντανός (Υ) PARCR Φασκόμηλο (Υ) SALOF Δενδρολίβανο (Υ) RMSOF Θυμάρι (Υ) THYVU Βασιλικός (Υ) OCIBA Δάφνη/ Δαφνόφυλλα (Υ) LURNO Δρακόντιο/ Εστραγκόν (Υ) ARTDR	Περονόσπορος <i>Bremia lactucae</i> (BREMLA)	45 – 250	150 – 250	30 – 100	Ψεκασμοί φυλλώματος από την εμφάνιση του 2 <sup>ου</sup> πραγματικού φύλλου έως τα προς συγκομιδή φύλλα να φτάσουν στο τυπικό τους μέγεθος και μορφή (BBCH 12-49)	3 / 10
Βατόμουρα (Υ) RUBFR Σμέουρα (ερυθρά και κίτρινα) (Υ) RUBID Φραγκοστάφυλα (κόκκινα, μαύρα ή άσπρα) (Υ) RIBNI & RIBRU Φραγκοστάφυλα (κόκκινα, πράσινα, κίτρινα) (Υ) RIBUC Μύρτιλλα (Υ) VACAN, VACCO, VACVG	Φυτόφθορα <i>Phytophthora</i> sp. (PHYTSP)	45 – 250	150 – 250	30 – 100	Ψεκασμοί φυλλώματος όταν οι βλαστοί αποκτήσουν το 30% του τελικού τους μήκους έως το τέλος της άνθισης (BBCH 33-69)	3 / 10
Λωτός DOSKA	Αλτερνάρια <i>Alternaria alternata</i> (ALTEAL)	250	150 – 250	30 – 100	Ψεκασμοί φυλλώματος όταν οι καρποί αποκτήσουν το 60% του τελικού τους μεγέθους έως και την πλήρη ωρίμανση (BBCH 76-89)	3 / 15

Αβοκάντο <b>PEBAM</b>	Φυτόφθορα <i>Phytophthora</i> <i>cinnamomi</i> (PHYTCN)	375	150 – 250	50 – 150	Ψεκασμοί φυλλώματος, αργά την άνοιξη - καλοκαίρι 1 <sup>ος</sup> από την έναρξη της άνθισης έως την πτώση των πετάλων (BBCH 59-67) 2 <sup>ος</sup> όταν ο καρπός έχει μέγεθος 10mm έως όπου αποκτήσει το 50% του τελικού του μεγέθους (BBCH 71-75) 3 <sup>ος</sup> όταν ο καρπός αποκτήσει το 50% του τελικού του μεγέθους έως την ωρίμανση (BBCH 75-85)	3 / 10
Ανανάς ANHCO	Φυτόφθορα <i>Phytophthora</i> <i>nicotianae</i> (PHYTNN) <i>Phytophthora</i> <i>cinnamomi</i> (PHYTCN)	600	-	300 – 400	Ψεκασμοί φυλλώματος από το στάδιο των 10 φύλλων μέχρι τον πλήρη σηματισμό του καρπού (BBCH 10-79)	2* / 20
Ανανάς ANHCO	Φυτόφθορα <i>Phytophthora</i> <i>nicotianae</i> (PHYTNN) <i>Phytophthora</i> <i>cinnamomi</i> (PHYTCN)	-	150	-	1 <sup>η</sup> εφαρμογή με εμβάπτιση κατά τη φύτευση (BBCH 00)	2*
		600	150	300 – 400	2 <sup>η</sup> εφαρμογή με ψεκασμό ένα μήνα μετά τη φύτευση (BBCH 05-10)	
Πατάτα SOLTU	Περονόσπορος <i>Phytophthora</i> <i>infestans</i> (PHYTIN)	250	150 – 250	30 – 100	Ψεκασμοί φυλλώματος από την εμφάνιση του 2 <sup>ου</sup> πραγματικού φύλλου έως την πλήρη ωρίμανση των	3 / 10

					κονδύλων (η επιδερμίδα των κονδύλων δεν αποσπάται με την πίεση του αντίχειρα) (BBCH 12-49)	
Τομάτα (Θ) LYPES Μελιτζάνα (Θ) SOLME	Φυτόφθορα <i>Phytophthora infestans</i> (PHYTIN)	45 – 250	150 – 250	30 – 100	Ψεκασμοί φυλλώματος από την εμφάνιση του 2 <sup>ου</sup> πραγματικού φύλλου έως και την πλήρη ωρίμανση των καρπών (BBCH 12-89)	3 / 10
Πιπεριά (Θ) CPSSS	Φυτόφθορα <i>Phytophthora capsici</i> (PHYTCP)	45 – 250	150 – 250	30 – 100	Ψεκασμοί φυλλώματος από την εμφάνιση του 2 <sup>ου</sup> πραγματικού φύλλου έως και την πλήρη ωρίμανση των καρπών (BBCH 12-89)	3 / 10
Φράουλα (Θ) FRAAN	Φυτόφθορα <i>Phytophthora</i> sp. (PHYTSP)	45 – 250	150 – 250	30 – 100	Ψεκασμοί φυλλώματος από την εμφάνιση του 2 <sup>ου</sup> πραγματικού φύλλου έως οι πρώτοι καρποί να αποκτήσουν το χαρακτηριστικό χρώμα της ποικιλίας (BBCH 12-85)	3 / 10

## ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Το εύρος της δόσης είναι ανάλογο της πίεσης προβολής.
2. Οι εφαρμογές είναι προληπτικές και γίνονται εφόσον οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών.
3. \*Στην καλλιέργεια του ανανά δεν πρέπει οι εφαρμογές να ξεπερνούν τις δύο (2) συνολικά ανά καλλιεργητική περίοδο.

Οι κάτωθι χρήσεις δεν εγκρίνονται αλλά θα χορηγηθούν σύμφωνα με τον παρακάτω φάσμα δράσης όταν καθοριστούν στον Κανονισμό 396/2005 νέα MRLs σύμφωνα με τον παρακάτω φάσμα δράσης. Ο κάτοχος της έγκρισης υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα την αρμόδια αρχή.							
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Χρόνος εφαρμογής	Μέγ. αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική ή περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες)	Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή (ημέρες)
		κ.εκ./στρ	κ.εκ / 100 λίτρα νερό	Όγκος ψεκ. Υγρού λίτρα/στρ			
Αζάρολος (Υ) (μεσογειακά μούσμουλα) CSCAZ Καρποί κουφοξυλιάς (Υ) SAMNI	Φυτόφθορα <i>Phytophthora</i> sp. (PHYTSP)	45 – 250	150 – 250	30 – 100	Ψεκασμοί φυλλώματος όταν οι βλαστοί αποκτήσουν το 30% του τελικού τους μήκους έως το τέλος της άνθισης (BBCH 33-69)	3 / 10	7

**13** Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Γκρέϊπ φρουτ - 0110010 Φράπα – 0110010 - 002 Πορτοκάλια - 0110020 Περγαμόντα – 0110020 - 001 Νεράντζια - 0110020-002 Λεμόνια - 0110030 Κιτριά – 0110030 - 002 Λιμμετίες (πράσινα λεμόνια) - 0110040 Μανταρίνια - 0110050 Αμπέλι (επιτραπέζια) - 0151010 Αμπέλι (οινοποιήσιμα) - 0151020 Ελιά (επιτραπέζιες ελιές) – 0161030 Ελιά (ελαιοποιήσιμες ελιές) – 0402010 Μαρούλι (Υ) - <b>0251020</b> Λυκοτρίβολο (Υ) - 0251010 Σκαρόλες (πικρίδα) / πλατύφυλλα αντίδια (Υ) - 0251030 Κάρδαμο & άλλα βλαστάρια & φύτερες (Υ) - 0251040 Γαιοκάρδαμο (Υ) - 0251050 Ρόκα (Υ) - 0251060 Κόκκινο σινάπι (Υ) - 0251070 Καλλιέργειες νεαρών φύλλων (συμπεριλαμβανομένων ειδών κράμβης) (Υ) - 0251080	15



Φραγκομαϊντανός (Υ) - 0256010	
Σχοινόπρασο (Υ) - 0256020	
Φύλλα σέλινου (Υ) - 0256030	
Μαϊντανός (Υ) - 0256040	
Φασκόμηλο (Υ) – 0256050	
Δενδρολίβανο (Υ) - 0256060	
Θυμάρι (Υ) - 0256070	
Βασιλικός (Υ) - 0256080	
Δάφνη/ δαφνόφυλλα (Υ) - 0256090	
Δρακόντιο/ εστραγκόν (Υ) - 0256100	
Αβοκάντο – 0163010	
Πατάτα - 0211000	
Τομάτα (Θ) - 0231010	
Μελιτζάνα (Θ) - 0231030	
Πυτεριά (Θ) - 0231020	
Λωτός - 0161060	20
Φράουλα (Θ) - 0152000	7
Βατόμουρα (Υ) - 0153010	
Σμέουρα (ερυθρά και κίτρινα) (Υ) – 0153030	
Μύρτιλλα (Υ) - 0154010	
Φραγκοστάφυλα (Υ) (κόκκινα, μαύρα, άσπρα) - 0154030	
Φραγκοστάφυλα (Υ) (κόκκινα, πράσινα, κίτρινα) - 0154040	
Ανανάς - 0163080	30

## II. Διάθεση αποθεμάτων

1. Η ετικέτα του σκευάσματος να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
2. Για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, επιτρέπεται η τοποθέτηση στις συσκευασίες του σκευάσματος της μέχρι σήμερα ισχύουσας ετικέτας.
3. Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις συσκευασίες του σκευάσματος θα τοποθετείται υποχρεωτικά η νέα τροποποιημένη ετικέτα.

- III. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 2281/39729/06.11.2019 απόφασή μας όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας»  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

**Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ**