



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 28-7-2023
Αριθ. πρωτ: 7580/212229

Ταχ. Δ/ση Λεωφ. Α. Συγγρού 150
176 71 Καλλιθέα, ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες Μ.Γάσπαρη
Τηλέφωνο 210 – 928 7250
e-mail mgaspari@minagric.gr

ΠΡΟΣ: Syngenta Hellas Μονοπρόσωπη ΑΕΒΕ
Λ. Ανθούσας, 15349 Ανθούσα Αττική
voula.kalliakaki@syngenta.com

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθμ. 14585 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο-ακαρεοκτόνο) VOLIAM TARGO 063 SC (δ.ο. abamectin) ως προς το φάσμα δράσης, την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή και τη χρήση των αποθεμάτων λόγω αλλαγής των ανωτάτων ορίων υπολειμμάτων (Mrls)».

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις :
 - του ν. 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α' 45).
 - του ν. 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
- Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 45 αυτού.
- Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2023/198 της Επιτροπής της 30ής Ιανουαρίου 2023, για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων της ουσίας **abamectin** μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα.
- Το αριθμ. 79/2023 Π.Δ. "Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών" (Α' 131/27.06.2023).
- Τη με αριθ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β' 4612/19-10-20).
- Τη με αριθμ. 9542/104669/16-11-2016 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό **14585** άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο-ακαρεοκτόνο) **VOLIAM TARGO 063 SC** (δ.ο. abamectin), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
- Τις με αριθμ. 7580/212229/05-7-2023 και 8326/233938/24-7-2023 εισηγήσεις της αρμόδιας αρχής αξιολόγησης.

8. Τη με αριθμ. 2693/72468/9-3-2023 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και τα με αριθμ. 5135/133911/4-5-2023, 6343/173420/6-6-2023 και 6575/182149/13-6-2023 συμπληρωματικά στοιχεία.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούμε τη με αριθ. 14585 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος **(εντομοκτόνο-ακαρεοκτόνο) VOLIAM TARGO 063 SC (δ.ο. abamectin)**, που χορηγήθηκε με τη με αριθμ. 9542/104669/16-11-2016 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς το φάσμα δράσης και τη χρήση των αποθεμάτων λόγω αλλαγής των ανωτάτων ορίων υπολειμμάτων.

Συγκεκριμένα, τα σημεία 5, 13, II και III της με αριθ. 3176/84312/31-3-2023 απόφασης διαμορφώνονται ως εξής:

5 Φάσμα δράσης		Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μεγ. αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/ Μεσοδιάστημα (ημέρες)
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	κ.εκ./ στρέμμα (max)	κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/ Στρ.		
Τομάτα (Θ) (LYPES) , Μελιτζάνα(Θ) (SOLME) , Πιπεριά (Θ) (CPSAN) , Αγγούρι (Θ) (CUMSA) , Κολοκύθι (Θ) (CUUPG) , Κολοκύθα (Θ) (CUUPE) , Πεπόνι (Θ) (CUMME) , Καρπούζι (Θ) (CITLA) Φράουλα (Θ) (FRAAN)	Πράσινο σκουλήκι Φυλλοφάγες κάμπιες <i>Helicoverpa armigera (HELIAR)</i> , <i>Spodoptera exigua (LAPHEG)</i> , <i>Spodoptera littoralis (SPODLI)</i> , <i>Ostrinia nubilalis (PYRUNU)</i> , Λυριόμιζα (<i>Liriomyza spp.</i>) (LIRISP) , Τετράνυχτοι (<i>Tetranychus urticae</i>) (TETRUR) , Φυλλορύκτης (<i>Tuta absoluta</i>) (GNORAB)	80	80	20-100	Ψεκασμός φυλλώματος (BBCH 12-89) Για τα λεπιδόπτερα εφαρμόστε κατά τη διάρκεια της ωστοκίας ή με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφών. Για τα ακάρεα εφαρμόστε με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών στα φύλλα. Για τη λυριόμιζα εφαρμόστε όταν είναι εμφανείς οι πρώτες στοές ή ανάλογα με τις συλλήψεις στις παγίδες.	2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-14 ημέρες
Παρατήρηση: - Ανεξάρτητα από τους όγκους νερού που χρησιμοποιούνται, να τηρείτε τις δόσεις/στρέμμα για κάθε καλλιέργεια.						

13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Μελιτζάνες(Θ) (0231030), Τομάτες (Θ) (0231010),	7
Αγγούρια (Θ) (0232010), Πεπόνια (Θ) (0233010), Καρπούζια (Θ) (0233030), Πιπεριές (Θ) (0231020), Κολοκύθια (Θ) (0232030), Κολοκύθες (Θ) (0233020) Φράουλα (Θ) (0152000)	3

II Διάθεση αποθεμάτων

1. Η τιμολόγηση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τον κάτοχο της έγκρισης προς τα καταστήματα εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων απαγορεύεται από την ανάρτηση της απόφασης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
2. Η πώληση των υπαρχόντων αποθεμάτων με την παλιά ετικέτα από τους υπεύθυνους διάθεσης, τα καταστήματα χονδρικής και λιανικής πώλησης επιτρέπεται έως και **01.09.2024**.
3. Η χρήση των υπαρχόντων αποθεμάτων επιτρέπεται από τους επαγγελματίες χρήστες έως και τις **30.9.2024** ως εξής:

5. Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο	Τελευταία Επέμβαση πριν τη Συγκομιδή (ημέρες)
		κ.εκ/ στρέμμα (max)	κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα/ στρέμμα)			
Μηλοειδή Μηλιά (MABSD), Αχλαδιά (PYUSS)	Καρπόκαψα (<i>Cydia pomonella</i> , <i>Grapholita molesta</i>) Φυλλορύκτες (<i>Leucoptera scitella</i> , <i>Phyllonorycter spp.</i> , <i>Nepticula spp.</i> , <i>Lyonetia spp</i>) Φυλλοδετες (<i>Argyrotaenia sp</i> <i>Pandemis sp.</i> <i>Adoxophyes sp.</i> <i>Archips sp.</i>) Πυραλίσ (<i>Ostrinia nubilalis</i>) Τετράνυχοι (<i>Eriophyes pyri</i> , <i>Epitrimerus urticae</i> , <i>Panonychus ulmi</i> , <i>Tetranychus urticae</i> , <i>Aculus sp</i>) Ψύλλα (<i>Cacopsylla pyri</i>)	75	50-75	100-150	Ψεκασμός φυλλώματος BBCH 69-89 Από το τέλος της πτώσης των πετάλων. Για τα λεπιδόπτερα εφαρμόστε κατά τη διάρκεια της ωοτοκίας και πριν την εκκόλαψη των πρώτων αυγών. Για τα ακάρεα εφαρμόστε μετά την άνθηση στην έναρξη της προσβολής. Για τη ψύλλα στην αχλαδιά, εφαρμόστε όταν τα αυγά πάρουν χρώμα κίτρινο /εμφάνιση πρώτων νυμφών.	2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες	28

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο	Τελευταία Επέμβαση πριν τη Συγκομιδή (ημέρες)
		κ.εκ/ στρέμμα (max)	κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα/ στρέμμα)			
Πυρηνό-καρπα Ροδακινιά (PRNPS) Νεκταρίνια (PRNPN)	Καρπόκαψα (<i>Cydia pomonella</i> , <i>Grapholita molesta</i>) Ανάρσια (<i>Anarsia lineatella</i>) Πυραλίσ (<i>Euzophera bigella</i> , <i>Ostrinia nubilalis</i>) Τετράνυχτοι (<i>Panonychus ulmi</i> , <i>Tetranychus urticae</i> , <i>Aculus spp</i>) Θρίπες (<i>Frankliniella occidentalis</i> , <i>taeniothrips spp</i> , <i>thrips spp</i>).	100-120	75	100-150	Ψεκασμός φυλλώματος BBCH 69-89 Από το τέλος της πτώσης των πετάλων. Για τα λεπιδόπτερα εφαρμόστε κατά τη διάρκεια της ωοτοκίας και πριν την εκκόλαψη των πρώτων αυγών. Για τους θρίπες/ τετρανύχτους εφαρμόστε στην έναρξη της προσβολής	2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10-14 ημέρες	14
Τομάτα (Θ) (LYPES), Μελιτζάνα (Θ) (SOLME), Πιπεριά (Θ) (CPSAN), Αγγούρι (Θ) (CUMSA), Κολοκύθι (Θ) (CUUPG), Πεπόνι (Θ) (CUMME), Καρπούζι (Θ) (CITLA), Κολοκύθα (Θ) (CUUPE) Φράουλα (Θ) (FRAAN)	Πράσινο σκουλήκι Φυλλοφάγες κάμπιες (<i>Helicoverpa armigera</i> , <i>Spodoptera exigua</i> , <i>Spodoptera littoralis</i> , <i>Ostrinia nubilalis</i>), Λυριόμιζα (<i>Liriomyza spp.</i>), Τετράνυχτοι (<i>Tetranychus urticae</i>) Φυλλορύκτης (<i>Tuta absoluta</i>)	80	80	20-100	Ψεκασμός φυλλώματος BBCH 12-89 Για τα λεπιδόπτερα εφαρμόστε κατά τη διάρκεια της ωοτοκίας ή με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφών. Για τα ακάρεα εφαρμόστε με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών στα φύλλα. Για τη λυριόμιζα εφαρμόστε όταν είναι εμφανείς οι πρώτες στοές ή ανάλογα με τις συλλήψεις στις παγίδες.	2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-14 ημέρες	Τομάτα: 7 Μελιτζάνα: 7 Πιπεριά: 3 Αγγούρι: 3 Κολοκύθι: 3 Πεπόνι: 3 Καρπούζι: 3 Κολοκύθα: 3 Φράουλα: 3
Παρατήρηση: -Ανεξάρτητα από τους όγκους νερού που χρησιμοποιούνται, να τηρείτε τις δόσεις / στρέμμα για κάθε καλλιέργεια. - Προσοχή όταν χρησιμοποιείτε χαμηλό όγκο ψεκαστικού υγρού, να μην υπερβαίνετε τη μέγιστη δόση σκευάσματος ανά στρέμμα.							

Β

1. Για τις ποσότητες του σκευάσματος που έχουν διατεθεί σε καταστήματα χονδρικής ή λιανικής πώλησης, ο υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά, οφείλει να χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο μέσο επιδεχόμενο ελέγχου, ώστε να ειδοποιεί για τις τροποποιήσεις που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση, τα εν λόγω καταστήματα.
2. Κατά την πώληση συσκευασιών με παλαιές ετικέτες, ο υπεύθυνος επιστήμονας των καταστημάτων χονδρικής ή λιανικής πώλησης οφείλει αφενός να ενημερώνει για την παρούσα απόφαση τους επαγγελματίες χρήστες και αφετέρου να αναγράφει ότι πραγματοποιήθηκε η ενημέρωση αυτή στο αντίστοιχο πεδίο των παρατηρήσεων του εντύπου ηλεκτρονικής καταγραφής της πώλησης.
3. Οι επαγγελματίες χρήστες που έχουν ήδη προμηθευτεί ποσότητες του σκευάσματος οφείλουν να συμμορφώνονται με την παρούσα απόφαση τροποποίηση του φάσματος δράσης.

Γ

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθ. **14585** άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος **VOLIAM TARGO 063 SC**.

«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας»
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ κ.α.α.

ΧΡ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ