



## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 21.07.2023  
Αριθ. πρωτ: 2556/69406

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150 Προς: BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ Αγησιλάου 6-8, Τ.Κ. 151 23, Μαρούσι  
Πληροφορίες: Δ. Μακρογιάννη  
Τηλέφωνο: 210 9287160  
e-mail: [dmakrogianni@minagric.gr](mailto:dmakrogianni@minagric.gr) e-mail: [ioannis.tsoutsanis@bayer.com](mailto:ioannis.tsoutsanis@bayer.com)

**ΘΕΜΑ:** «Τροποποίηση της αριθμ. 14670 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) SIVANTO PRIME (flupyradifurone 20% β/ο) ως προς τα στοιχεία επικοινωνίας του κατόχου της άδειας, του υπεύθυνου επικοινωνίας και του υπεύθυνου για την τελική διάθεση στην αγορά, το φάσμα δράσης, τις ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί, το χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα, τις δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης, την προστασία των καταναλωτών και την κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών»

## ΑΠΟΦΑΣΗ

## Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις:
  - Του ν. 4036/2012 (Α'8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  - Του ν. 2690/1999 (Α'45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
  - Του ν. 4622/2019 (Α'133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
- Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα τα άρθρα 45 και 33 αυτού.
- Το αριθμ. 79/27.06.2023 Π.Δ. «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.» (Α'131/27.06.2023).
- Την αριθμ. 1881/286212/13.10.2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β'4612/19.10.20).
- Το αριθμ. 12862/330936/07.12.2020 έγγραφο της Υπηρεσίας με θέμα «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά».
- Την αριθμ. 8067/106364 Ο.Ε./09.08.2018 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η αριθμ. 14670 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) SIVANTO PRIME (flupyradifurone 20% β/ο), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

7. Την αριθμ. 2556/69406/07.03.2023 (ΕΜΠ 671/03.03.2023) Έκθεση Αξιολόγησης του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου.
8. Τις αριθμ. 12531/346837/03.12.2021 και 6319/173093/06.06.2023 αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Διευρύνουμε την αριθμ. 14670 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) SIVANTO PRIME (flupyradifurone 20% β/ο), που χορηγήθηκε με την αριθμ. 8067/106364 Ο.Ε./09.08.2018 απόφασή μας, ως προς τα στοιχεία επικοινωνίας του κατόχου της άδειας, του υπεύθυνου επικοινωνίας και του υπεύθυνου για την τελική διάθεση στην αγορά, το φάσμα δράσης, τις ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί, το χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα, τις δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης, την προστασία των καταναλωτών και την κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών.

Τα σημεία **1.4α, 1.4β, 5, 6, 7, 11, 13** και **17** διαμορφώνονται ως εξής:

#### 1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας

Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ  
**Αγησιλάου 6-8, Τ.Κ. 151 23, Μαρούσι**  
 Τηλ.: 210 6166000  
[www.cropscience.bayer.gr](http://www.cropscience.bayer.gr)

Υπεύθυνος επικοινωνίας

Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ  
**Αγησιλάου 6-8, Τ.Κ. 151 23, Μαρούσι**  
 Τηλ.: 210 6166000  
[www.cropscience.bayer.gr](http://www.cropscience.bayer.gr)

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά

Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ  
**Αγησιλάου 6-8, Τ.Κ. 151 23, Μαρούσι**  
 Τηλ.: 210 6166000  
[www.cropscience.bayer.gr](http://www.cropscience.bayer.gr)

#### 5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής	Μεγ. αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες
		κ.εκ./ στρ.	κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ		
Ελιά (επιτραπέζιες & ελαιοποιήσιμες ποικιλίες) OLVEU	Δάκος <i>Bactrocera oleae</i> DACUOL  Λεκάνιο <i>Saissetia oleae</i> SAISOL	75	-	80-100	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής από το στάδιο της πλήρους έκπτυξης των ανθοταξιών μέχρι πριν από την πλήρη ωρίμανση των καρπών (το	1 εφαρμογή τον χρόνο

					<p>χρώμα των καρπών έχει σχεδόν αλλάξει) (BBCH 55-85).</p> <p>Ειδικά για τον δάκο, ο ψεκασμός να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις συλλήψεις των ακμαίων στις παγίδες παρακολούθησης του δακοπληθυσμού.</p>	
<p>Εσπεριδοειδή Πορτοκαλιά CIDSΙ Γκρέιπφρουτ CIDPA Φράπα CIDGR Νεραντζιά CIDAU</p>	<p>Αφίδες Aphididae 1APHIF</p>	75	-	120-150	<p>Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής από το τέλος της άνθησης μέχρι το στάδιο ανάπτυξης του 50% του τελικού μεγέθους των καρπών. BBCH 69-75</p>	1
<p>Αμπέλι VITVI</p>	<p>Τζιτζικάκια <i>Empoasca vitis</i> EMPOFL</p>	<p>20 για ύψος κόμης 80 εκ.  25 για ύψος κόμης 100 εκ.  30 για ύψος κόμης 120 εκ.</p>	-	50-100	<p>Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής όταν οι ταξιανθίες είναι πλήρως αναπτυγμένες, ως την έναρξη της ωρίμανσης των καρπών (BBCH 57-81)</p>	1
	<p>Κοκκοειδή <i>Scaphoideus titanus</i> SCAPLI <i>Metcalfa pruinosa</i> METFPR</p> <p>Αφίδες <i>Aphis gossypii</i> APHIGO</p> <p>Φυλλοξήρα <i>Viteus vitifoliae</i> VITEVI</p> <p>Ψευδόκοκκος</p>	50	-	50-100		

	<i>Planococcus ficus</i> PLANFI					
Σολανώδη Υπαίθρου (Υ) Τομάτα LYPES Πιπεριά CPSAN Μελιτζάνα SOLME	Αφίδες <i>Aphis gossypii</i> APHIGO <i>Myzus persicae</i> MYZUPE <i>Macrosiphum euphorbiae</i> MACSEU	45	-	45-100	Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής από την εμφάνιση του δεύτερου πραγματικού φύλλου μέχρι την πλήρη ωρίμανση (BBCH 12-89)	1
Κολοκυνθοειδή Υπαίθρου (Υ) Αγγούρι CUMSA Κολοκύθι CUUPG Καρπούζι CITLA Κολοκύθα CCUMA	Αφίδες <i>Aphis gossypii</i> APHIGO	56	-	45-100	Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής από την εμφάνιση του δεύτερου πραγματικού φύλλου μέχρι την πλήρη ωρίμανση (BBCH 12-89)	1
Μαρούλι (Υ) LACSA	Αφίδες <i>Nasonovia ribisnigri</i> NASORN <i>Macrosiphum euphorbiae</i> MACSEU <i>Myzus persicae</i> MYZUPE <i>Uroleucon sonchi</i> DACTSN <i>Aulacorthum solani</i> AULASO <i>Acyrtosiphon</i> sp. ACYRSP <i>Aphis gossypii</i> APHIGO	62,5	-	50-100	Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής από το 10% της ανάπτυξης της φυλλικής επιφάνειας μέχρι να ολοκληρωθεί η ανάπτυξη του προς κατανάλωση μέρους του φυτού (BBCH 41-49)	1

Μπιζέλια με ή χωρίς λοβό (Υ) PIBSX  Μπιζέλια ξηρά (Υ) PIBSA	Αφίδες <i>Acyrtosiphon pisum</i> ACYRON	37,5	-	10-40	Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής από την εμφάνιση του δεύτερου πραγματικού φύλλου μέχρι τον σχηματισμό των 9 πρώτων φύλλων και ελίκων. (BBCH 12-19)	1 εφαρμογή κάθε 2 χρόνια
					Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής από την έναρξη επιμήκυνσης του βλαστού μέχρι την ωρίμανση του 70% των λοβών (BBCH 30-87)	1 εφαρμογή τον χρόνο
Φασόλι χλωρό με ή χωρίς λοβό (Υ) PHSVX Κουκί χλωρό με ή χωρίς λοβό (Υ) VICFX  ΟΣΠΡΙΑ Φασόλι (Υ) PHSVX Κουκί (Υ) VICFX	Αφίδες <i>Aphis fabae</i> APHIFA	37,5	-	20-75	Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής από το τέλος της άνθησης μέχρι το στάδιο ανάπτυξης του 50% του τελικού μεγέθους των λοβών. BBCH 69-75	1 εφαρμογή τον χρόνο
					Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής προβολής κατά το στάδιο ανάπτυξης των πλευρικών βλαστών. BBCH 21-29	1 εφαρμογή κάθε 2 χρόνια

Καπνός ΝΙΟΤΑ	Αφίδες <i>Myzus nicotianae</i> MYZUNI <i>Myzus persicae</i> MYZUPE	50	-	50-100	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής από το στάδιο του δεύτερου πραγματικού φύλλου μέχρι τα συγκομίσιμα φύλλα φτάσουν το τελικό τους μέγεθος (BBCH 12-49)	1
Βαμβάκι GOSHI	Αφίδες <i>Aphis gossypii</i> APHIGO  <u>Χρήση ήσσονος σημασίας:</u> Τζιτζικάκια* <i>Empoasca</i> sp. EMPOSP	37,5	-	20-60	Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής από την εμφάνιση του δεύτερου πραγματικού φύλλου μέχρι την έναρξη αποξήρανσης του φυλλώματος (BBCH 12-90)	1 εφαρμογή τον χρόνο
Καλλωπιστικά Βολβώδη (NNNZL) (Θ)	Αφίδες <i>Aphis fabae</i> APHIFA	50	-	50-100	Ψεκασμοί με την εμφάνιση της προσβολής από το πρώτο πραγματικό φύλλο/ζεύγος φύλλων (από BBCH 11)	4/7
Καλλωπιστικά (Θ): Ανθοκομικά και Πολυετή Καλλωπιστικά, Φυτώρια Δένδρων	Αφίδες <i>Aulacorthum solani</i> AULASO <i>Aphis fabae</i> APHIFA <i>Macrosiphum euphorbiae</i> MACSEU <i>Macrosiphum rosae</i> MACSRO <i>Myzus persicae</i> MYZUPE <i>Myzus ascalonicus</i> MYZUAS <i>Brachycaudus helichrysi</i>	50	-	50-150	Ψεκασμοί με την εμφάνιση της προσβολής από το πρώτο πραγματικό φύλλο/ζεύγος φύλλων (από BBCH 11)	4/7

	ANURHE					
	Αλευρώδεις <i>Trialeurodes vaporariorum</i> TRIAVA	75	-	50-150		
Κολοκυνθοειδή (Θ): Αγγούρι CUMSA Κολοκύθι CCUPG Καρπούζι CITLA Κολοκύθα CCUMA  Σολανώδη (Θ): Τομάτα LYPES Πιπεριά CPSAN Μελιτζάνα SOLME	Αφίδες <i>Myzus persicae</i> MYZUPE <i>Macrosiphum euphorbiae</i> MACSEU  Αφίδες <i>Aphis gossypii</i> APHIGO  Αλευρώδεις <i>Bemisia tabaci</i> BEMITA <i>Trialeurodes vaporariorum</i> TRIAVA	45 ανά ύψος φυτού 100 εκ.  56 ανά ύψος φυτού 100 εκ.	60  75	75 λίτρα/ 100 εκ. ύψους φυτού	Ψεκασμοί με την εμφάνιση της προσβολής από την εμφάνιση του δεύτερου πραγματικού φύλλου μέχρι την πλήρη ωρίμανση (BBCH 12-89)  Μέγιστο ύψος καλλιέργειας 200 εκ.	2/10
Φράουλα (Θ) FRAAN	Αφίδες <i>Macrosiphum euphorbiae</i> MACSEU <i>Chaetosiphon fragaefolii</i> CHTSFR <i>Macrosiphum rosae</i> MACSRO  Αλευρώδεις <i>Trialeurodes vaporariorum</i> TRIAVA	50  62,5	-	60-100	Ψεκασμοί φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής από το στάδιο του πέμπτου (5 <sup>ου</sup> ) πραγματικού φύλλου μέχρι την πλήρη ωρίμανση των καρπών (BBCH 15-89)	2/10
Σμέουρο/ Κόκκινο Βατόμουρο (Θ) (Raspberry) RUBID Μαύρο Βατόμουρο (Θ) (Blackberry) RUBFR	Αφίδες <i>Aphis idaei</i> APHIID <i>Aphis gossypii</i> APHIGO	50 για ύψος κόμης 100 εκ.  100 για ύψος κόμης 200 εκ.	100	50  100	Ψεκασμοί φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής από το στάδιο του πέμπτου (5 <sup>ου</sup> ) πραγματικού φύλλου μέχρι την πλήρη ωρίμανση των καρπών (BBCH 15-89)  Μέγιστο ύψος καλλιέργειας 200 εκ.	2/10

## Παρατηρήσεις:

- Πριν την εφαρμογή του σκευάσματος στα καλλωπιστικά να προηγείται δοκιμαστική εφαρμογή του σε μικρή κλίμακα.

\*«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα στα τζιτζικάκια στο βαμβάκι. Για τη χρήση αυτή, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα από την εφαρμογή του σκευάσματος».

**Οι ακόλουθες χρήσεις θα χορηγηθούν όταν καθοριστούν στον κανονισμό 396/2005 MRLs σύμφωνα με τις παρακάτω ΟΓΠ. Ο κάτοχος της έγκρισης υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα την αρμόδια αρχή.**

Κερασιά PRSVX	Μαύρη αφίδα της κερασιάς <i>Myzus cerasi</i> MYZUCE	12,5 για ύψος κόμης 100 εκ.  25 για ύψος κόμης 200 εκ.  37,5 για ύψος κόμης 300 εκ.	-	50  100  150	Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής από το τέλος της άνθησης μέχρι την έναρξη της ωρίμανσης των καρπών. BBCH 69-81  Μέγιστο ύψος καλλιέργειας 300 εκ.	1
Εσπεριδοειδή Πορτοκαλιά CIDSΙ Γκρέιπφρουτ CIDPA Νεραντζιά CIDAU Φράπα CIDGR	Αφίδες Aphididae 1APHIF	75	-	120-150	Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος από το στάδιο εμφάνισης των οφθαλμών μέχρι το στάδιο ανάπτυξης του 50% του τελικού μεγέθους των καρπών. BBCH 55-75	1
Εσπεριδοειδή Μανταρινιά CIDRE Λεμονιά CIDLI Κιτριά CIDME Πράσινη λεμονιά (Λάιμ) CIDAF	Αφίδες Aphididae 1APHIF	75	-	120-150	Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος.  Από το στάδιο εμφάνισης των οφθαλμών μέχρι το στάδιο ανάπτυξης του 50% του τελικού μεγέθους των καρπών. BBCH 55-75 <u>(Αν καθοριστούν MRLs και στα προϊόντα των καλλιεργειών</u>	1



					<u>και το μέλι.)</u> Από το τέλος της άνθησης μέχρι το στάδιο ανάπτυξης του 50% του τελικού μεγέθους των καρπών. <b>BBCH 69-75</b> <u>(Αν καθοριστούν MRLs μόνο στα προϊόντα των καλλιεργειών.)</u>	
Φασόλι χλωρό με ή χωρίς λοβό (Υ) PHSVX Κουκί χλωρό με ή χωρίς λοβό (Υ) VICFX  ΟΣΠΡΙΑ Φασόλι (Υ) PHSVX Κουκί (Υ) VICFX	Αφίδες <i>Aphis fabae</i> APHIFA	37,5	-	20-75	Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής από το στάδιο εμφάνισης των οφθαλμών μέχρι το στάδιο ανάπτυξης του 50% του τελικού μεγέθους των λοβών. BBCH 55-75	1 εφαρμογή τον χρόνο

**Αντιστοίχως θα τροποποιηθούν και τα σχετικά σημεία:**• **Σημείο 11**

**Spe3:** Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε από τα επιφανειακά ύδατα:

- φυτική ζώνη ανάσχεσης 10 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μείωσης διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 75% ή φυτική ζώνη ανάσχεσης 20 μέτρων για τις καλλιέργειες της μανταρινιάς, της λεμονιάς, της κιτριάς και της πράσινης λεμονιάς
- φυτική ζώνη ανάσχεσης 10 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μείωσης διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 90% ή φυτική ζώνη ανάσχεσης 20 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μείωσης διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50% για την καλλιέργεια της κερασιάς

**Spe3:** Για να προστατέψετε τα αρθρόποδα μη-στόχους να αφήσετε:

μία αφέκαστη ζώνη 3 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 90% ή μία αφέκαστη ζώνη 10 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50% για τις καλλιέργειες της μανταρινιάς, της λεμονιάς, της κιτριάς, της πράσινης λεμονιάς και της κερασιάς.

• **Σημείο 13**

**Μανταρινιά (0110050), Λεμονιά-Κιτριά (0110030), Πράσινη λεμονιά (0110040): 30 ημέρες**

**Κερασιά (0140020): 7 ημέρες**

**6**

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να

- Στην καλλιέργεια του μαρουλιού (Υ) να μην χρησιμοποιείται σε εδάφη με τεχνητή στράγγιση.
- Το σκεύασμα να μη χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με μυκητοκτόνα που περιέχουν δραστικές ουσίες που ανήκουν

αποκλειστεί

στη χημική ομάδα των παρεμποδιστών βιοσύνθεσης εργοστερόλης κατά την περίοδο της άνθησης όταν οι μέλισσες επισκέπτονται τα άνθη.

- **Μη χρησιμοποιείτε ως ζωοτροφή χοίρων τα ξερά φασόλια, τα ξερά κουκιά και τα υποπροϊόντα των εσπεριδοειδών που προέρχονται από καλλιέργειες στις οποίες έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα.**

Διαχείριση ανθεκτικότητας

- Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική flupyradifurone, η οποία ανήκει στην ομάδα 4 κατά IRAC.
- Συνιστάται η εναλλαγή με εντομοκτόνα που δεν ανήκουν σε αυτή την ομάδα προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας.

**7** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας

--

- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν

--

- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

**Όταν έχει στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φυτά.**

**11** Δηλώσεις προφύλαξης

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.

P260: Μην αναπνέετε εκνεφώματα.

P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο.

P284: Φοράτε μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής.

*Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας, γάντια, μέσα ατομικής προστασία για πρόσωπο και μάτια κατά την ανάμιξη/φόρτωση και ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια κατά την εφαρμογή του σκευάσματος.*

*Σε περίπτωση επανεισόδου μετά τον ψεκασμό φοράτε γάντια, μακρύ παντελόνι και πουκάμισο με μακριά μανίκια.*

***Σε περίπτωση εντατικής επαφής με το φύλλωμα της καλλιέργειας κατά την εφαρμογή στο θερμοκήπιο, φοράτε αδιαπέραστη προστατευτική ενδυμασία.***

P501: Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

SP1: Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. (Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα/Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις

λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.)

Spe2: Μην εφαρμόζετε το σκεύασμα σε αποστραγγιζόμενα εδάφη.

Spe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε από τα επιφανειακά ύδατα:

- φυτική ζώνη ανάσχεσης 5 μέτρων για την καλλιέργεια τομάτας (Υ), πιπεριάς (Υ), μελιτζάνας (Υ), αγγουριού (Υ), κολοκυθίου (Υ), κολοκύθας (Υ), καρπουζιού (Υ) και καπνού
- φυτική ζώνη ανάσχεσης 10 μέτρων για την καλλιέργεια του αμπελιού
- **φυτική ζώνη ανάσχεσης 10 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μείωσης διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 75% ή φυτική ζώνη ανάσχεσης 20 μέτρων για τις καλλιέργειες της πορτοκαλιάς, του γκρέιπφρουτ, της φράπας και της νεραντζιάς**
- φυτική ζώνη ανάσχεσης 15 μέτρων για την καλλιέργεια του μαρουλιού (Υ)
- φυτική ζώνη ανάσχεσης 20 μέτρων για τις καλλιέργειες ελιάς, ξηρού μπιζελιού, μπιζελιού με ή χωρίς λοβό, **φασολιού (χλωρό και όσπριο) και κουκιού (χλωρό και όσπριο)**
- αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων ή να χρησιμοποιήσετε ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50% για την καλλιέργεια του βαμβακιού.

Spe3: Για να προστατέψετε τα αρθρόποδα μη-στόχους να αφήσετε:

- μια αψέκαστη ζώνη προστασίας από μη γεωργική γη 5 μέτρων για τις καλλιέργειες αμπέλι, τομάτα (Υ), πιπεριά (Υ), μελιτζάνα (Υ), αγγούρι (Υ), κολοκύθι (Υ), κολοκύθα (Υ) και καρπούζι (Υ) ή χρησιμοποιείτε ακροφύσια μείωσης της διασποράς κατά 50%
- μία αψέκαστη ζώνη 5 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 75% ή χρησιμοποιείτε ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 80% για την καλλιέργεια της ελιάς
- **μία αψέκαστη ζώνη 3 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 90% ή μία αψέκαστη ζώνη 10 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50% για τις καλλιέργειες της πορτοκαλιάς, του γκρέιπφρουτ, της φράπας και της νεραντζιάς.**

### 13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Καλλιέργεια (Κωδικός προϊόντος με βάση το Παράρτημα Ι του Καν. (ΕΚ) 396/2005)	Ημέρες
<b>Πορτοκαλιά-Νεραντζιά (0110020) Γκρέιπφρουτ-Φράπα (0100000)</b>	<b>30</b>
Βαμβάκι (0260030)	21
Αμπέλι επιτραπέζιο (0151010) - οινοποιήσιμο (0151020) Ελιά επιτραπέζια (0161030) - ελαιοποιήσιμη (0402010)	14
Μπιζέλι με λοβό (0260030) (Υ) Μπιζέλι χωρίς λοβό (0260040) (Υ) Μπιζέλι ξηρό (0300030) (Υ)	7

<u>1 εφαρμογή κάθε χρόνο</u>	
Μπιζέλι με λοβό (0260030) (Υ) Μπιζέλι χωρίς λοβό (0260040) (Υ) Μπιζέλι ξηρό (0300030) (Υ) <u>1 εφαρμογή κάθε 2 χρόνια</u>	Καθορίζεται από το χρόνο εφαρμογής (ΒΒCΗ 12-19)
<b>Φασόλι με λοβό (Υ)-Κουκί με λοβό (Υ) (0260010)</b> <b>Όσπρια Φασόλι-Κουκί (0300010)</b> <u>1 εφαρμογή κάθε χρόνο</u>	<b>7</b>
<b>Φασόλι χωρίς λοβό (Υ)-Κουκί χωρίς λοβό (Υ) (0260020)</b> <u>1 εφαρμογή κάθε χρόνο</u>	<b>3</b>
<b>Φασόλι με λοβό (Υ)-Κουκί με λοβό (Υ) (0260010)</b> <b>Φασόλι χωρίς λοβό (Υ)-Κουκί χωρίς λοβό (Υ) (0260020)</b> <b>Όσπρια Φασόλι-Κουκί (0300010)</b> <u>1 εφαρμογή κάθε 2 χρόνια</u>	Καθορίζεται από το χρόνο εφαρμογής
Τομάτα (Υ/Θ) (0231010), Πιπεριά (Υ/Θ) (0231020), Μελιτζάνα (Υ/Θ) (0231030) Αγγούρι (Υ/Θ) (0232010), Κολοκύθι (Υ/Θ) (0232030), Κολοκύθα (Υ/Θ) (0233020) Καρπούζι (Υ/Θ) (0233030), Μαρούλι (Υ) (0251020), Φράουλα (Θ) (0632010), Σμέουρο/ Κόκκινο Βατόμουρο (Θ) (0153030), Μαύρο Βατόμουρο (Θ) (0153010)	3
Καπνός, Καλλωπιστικά (Θ)	Μη εφαρμόσιμο

**17** Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών

Ο κάτοχος της έγκρισης οφείλει εντός 24 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης να προσκομίσει στην ΣΕΑ τα ακόλουθα:

- Μία (1) μελέτη υπολειμμάτων στα πορτοκάλια στη νότια ζώνη της ΕΕ.

II. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 8067/106364 Ο.Ε./09.08.2018 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας»  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ