



## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 25-9-2023  
Αριθ. πρωτ: 3663/97367

Ταχ. Δ/ση :Λεωφ. Α. Συγγρού 150  
176 71 Καλλιθέα, ΑΘΗΝΑ  
Πληροφορίες :Μ.Γάσπαρη  
Τηλέφωνο :210 – 928 7250  
e-mail :[mgaspari@minagric.gr](mailto:mgaspari@minagric.gr)

ΠΡΟΣ: GOWAN Crop Protection Limited  
(δια της υπεύθυνης επικοινωνίας  
Ε. Λεφάκη [lefakief@otenet.gr](mailto:lefakief@otenet.gr))

**ΘΕΜΑ:** «Τροποποίηση της με αριθ. 60990 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) DOMARK 10 EC (δ.ο. tetraconazole) ως προς το φάσμα δράσης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή, λόγω αλλαγής των ανωτάτων ορίων υπολειμμάτων (Mrls)».

## ΑΠΟΦΑΣΗ

## Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις :
  - α) του ν. 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  - β) του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α' 45).
  - γ) του ν. 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 45 αυτού.
3. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2023/466 της Επιτροπής της 3<sup>ης</sup> Μαρτίου 2023 για την τροποποίηση των παραρτημάτων II, III και V του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για τις ουσίες isoxaben, novaluron και **tetraconazole** μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα.
4. Το αριθμ. 79/2023 Π.Δ. "Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών" (Α' 131/27.06.2023).
5. Τη με αριθ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β' 4612/19-10-20).
6. Τη με αριθ. πρωτ. 10957/291298/6-11-2020 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 60990 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) DOMARK 10 EC (δ.ο. tetraconazole), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
7. Τη με αριθ. πρωτ. 3663/97367/30-03-2023 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και τα από 1/9/2023 συμπληρωματικά στοιχεία.

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Τροποποιούμε τη με αριθ. 60990 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) DOMARK 10 EC (δ.ο. tetraconazole) (δ.ο. tetraconazole), που χορηγήθηκε με τη με αριθ.

πρωτ. 10957/291298/6-11-2020 απόφασή μας όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς το **φάσμα δράσης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή**.

Συγκεκριμένα, τα σημεία **5 και 13** διαμορφώνονται ως εξής:

5 Φάσμα δράσης						
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγ. αριθμός εφαρμογών ανά καλλ. περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών
		Μεγ. κ.εκ. / στρ.	κ.εκ. / 100 λίτρα ψεκ. υγρού (max)	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/ στρ.		
Μηλιά MABSD	Ωΐδιο ( <i>Podospheera leucotricha</i> – PODOLE)	30	30	100	Προληπτικοί ψεκασμοί μόλις οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για πρωτογενείς μολύνσεις, από τη ρόδινη κορυφή έως την έναρξη της άνθησης ή/και όταν οι καρποί έχουν μέγεθος καρυδιού). (BBCH 57-59 έως BBCH 83)	3/14
	Φουζικλάδιο ( <i>Venturia inaequalis</i> - VENTIN)	30	30	100		
Αχλαδιά PYUCO	Φουζικλάδιο ( <i>Venturia pirina</i> - VENPI)	30	30	100	Προληπτικοί ψεκασμοί μόλις οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για πρωτογενείς μολύνσεις, από τη λευκή κορυφή έως την έναρξη άνθησης, ή και όταν οι καρποί έχουν μέγεθος καρυδιού). (BBCH 57-59 έως 83)	3/14
Ροδακινιά PRNPS Βερικοκιά PRNAR	Ωΐδιο ( <i>Sphaerotheca pannosa</i> - SPHRPA)	40	40	100	Προληπτικοί ψεκασμοί από την πτώση των πετάλων και μέχρι να αποκτήσουν οι καρποί το μισό μέγεθος, ανάλογα με τον κίνδυνο προσβολής και την ευαισθησίας της ποικιλίας. (BBCH 61- BBCH 75)	3 /10-14
ΑΜΠΕΛΙ VITVI (επιτραπέζιες & οινοποιήσιμες ποικιλίες)	Ωΐδιο ( <i>Uncinula necator</i> - UNCINE)	30	30	100	Προληπτικοί ψεκασμοί πριν και μετά την άνθηση από τα 7-8 φύλλα και μέχρι την αλλαγή χρώματος των ραγών. (BBCH 17-18 έως BBCH 79)	2/14
ΦΡΑΟΥΛΑ FRAAN (Θ)	Ωΐδιο ( <i>Sphaerotheca macularis</i> f. <i>sp. fragariae</i> - SPHRMA)	50	50	100	Προληπτικοί ψεκασμοί με τα πρώτα συμπτώματα της ασθένειας, από την άνθηση και μέχρι να αποκτήσουν οι καρποί το τελικό χρώμα. (BBCH 60-90)	3/7-14

ΤΟΜΑΤΑ LYPES (Υ)	Ωΐδιο ( <i>Leveillula taurica-LEVETA</i> )	50	50	100	Προληπτικοί και θεραπευτικοί ψεκασμοί με τα πρώτα συμπτώματα της ασθένειας, από την έναρξη της άνθησης και μέχρι την ωρίμαση. (BBCH 60-89)	3/8-12
	Κλαδοσπορίωση ( <i>Cladosporium fulvum</i> (CLADFU)	75	75	100		
ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ με εδώδιμο φλοιό -Αγγούρι CUMSA (Υ, Θ) -Αγγουράκι CUMGS (Υ,Θ) -Κολοκύθι CUUPE (Υ)	Ωΐδιο <i>Sphaerotheca fuliginea-SPHRFU</i> )	50	50	50-100	Προληπτικοί ψεκασμοί με τα πρώτα συμπτώματα της ασθένειας, από την άνθηση και μέχρι να αποκτήσουν οι καρποί το τελικό χρώμα) (BBCH 60-90)	3/7-12
ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ Με Μη εδώδιμο φλοιό -Καρπούζι CITLA -Πεπόνι CUUME (Υ)	Ωΐδιο <i>Podosphaera xanthii</i> (PODOXA)	50	50	100	Προληπτικοί ψεκασμοί με τα πρώτα συμπτώματα της ασθένειας, από την άνθηση και μέχρι να αποκτήσουν οι καρποί το τελικό χρώμα) (BBCH 60-90)	3/7
ΑΓΚΙΝΑΡΑ CYUCA (Υ)	Ωΐδιο ( <i>Leveillula taurica-LEVETA</i> )	40	40	100	Προληπτικοί ψεκασμοί με τα πρώτα συμπτώματα της ασθένειας και μέχρι την έναρξη ωρίμασης , αν οι συνθήκες ευνοούν την ασθένεια (BBCH 31-49)	3/7-12
-Σιτάρι Μαλακό (TRZAX) -Σιτάρι Σκληρό (TRZDU)	Ωΐδιο ( <i>Erysiphe graminis</i> ERYSGR) Σεπτορίαση ( <i>Septoria tritici</i> -SEPTTR)	70-100	19-60	20-60	Προληπτικός ψεκασμός όταν οι συνθήκες ευνοούν την προσβολή από το στάδιο επιμήκυνσης του στελέχους (1-2 κόμβων) έως την ολοκλήρωση της ανθοφορίας. (BBCH 31-69)	1
	Κίτρινη σκωρίαση <i>Puccinia striiformis</i> (PUCCST) Μαύρη σκωρίαση <i>Puccinia recondia</i> (PUCCRT)	100-125	21-62	20-60		
Σίκαλη (SECCE)	Ωΐδιο ( <i>Erysiphe graminis</i> ERYSGR) Σεπτορίαση ( <i>Septoria tritici</i>	70-100	19-60	20-60	Προληπτικός ψεκασμός όταν οι συνθήκες ευνοούν την προσβολή από το στάδιο επιμήκυνσης του στελέχους (1-2 κόμβων)—έως την ολοκλήρωση της	1

	-SEPTTR)				ανθοφορίας. (BBCH 31-69)	
Ζαχαρότευτλα ΒΕΑΒΑ	Κερκοσπορίωση ( <i>Cercospora beticola- CERCBE</i> )	100	15-20	40-60	Προληπτικός ψεκασμός με τα πρώτα συμπτώματα της ασθένειας κατά την πλήρη κάλυψη του αγρού από την καλλιέργεια. (BBCH 40)	1
Καλλωπιστικά φυτά NNNZZ Καλλωπιστικά δένδρα και θάμνοι NNNZG  (Υ)	Ωΐδιο ( <i>Sphaerotheca rannosa- SPHRPA</i> )	50	25-50	100	Προληπτικοί ψεκασμοί με τα πρώτα συμπτώματα της ασθένειας	3/7-14
Κωνοφόρα NNNWN Φοινικοειδή ΙΡΗΧΓ  (Υ)	Ωΐδιο ( <i>Sphaerotheca rannosa- SPHRPA</i> )  <i>Podosphaera sp (PODOSP)</i>	50	25-50	100	Προληπτικοί ψεκασμοί με τα πρώτα συμπτώματα της ασθένειας	3/7-14

## ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Πριν την εφαρμογή του σκευάσματος στα καλλωπιστικά να προηγείται δοκιμαστική εφαρμογή του σε μικρή κλίμακα
2. Το εύρος των δόσεων είναι ανάλογο με την ένταση της προσβολής και τις περιβαλλοντικές συνθήκες
3. Ρυθμίστε τη δόση ανά εκατόλιτρο ώστε να μην υπερβαίνει τη μέγιστη δόση ανά στρέμμα.
4. Η χρήση στη ροδακινιά περιλαμβάνει και τη νεκταρινιά.
5. Η χρήση στο σιτάρι (μαλακό και σκληρό) περιλαμβάνει και το τριτικάλε.

**13** Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Σταφύλια (επιτραπέζιες και οινοποιήσιμες ποικιλίες)	30
Μήλο, Αχλάδι, Ροδάκινο, Βερίκοκο, Νεκταρίνι, Ζαχαρότευτλα	14
Καρπούζι (Υ), Πεπόνι (Υ), Αγκινάρα (Υ)	7
Αγγούρι (Υ+Θ), Αγγουράκι (Υ+Θ), Κολοκύθι (Υ) Τομάτες (Υ)	3
Φράουλα (Θ)	1
Σιτάρι, Σίκαλη, Τριτικάλε	42
ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΤΕ ΦΥΛΛΑ ΚΑΙ ΚΟΡΥΦΕΣ ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΩΝ ΓΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΗ	

- Β.** 1) Για τις ποσότητες του σκευάσματος που έχουν διατεθεί σε καταστήματα χονδρικής ή λιανικής πώλησης, ο υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά, οφείλει να χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο μέσο επιδεχόμενο ελέγχου, ώστε να ειδοποιεί για τις τροποποιήσεις που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση, τα εν λόγω καταστήματα.
- 2) Κατά την πώληση συσκευασιών με παλαιές ετικέτες, ο υπεύθυνος επιστήμονας των καταστημάτων χονδρικής ή λιανικής πώλησης οφείλει αφενός να ενημερώνει για την παρούσα απόφαση τους επαγγελματίες χρήστες και αφετέρου να αναγράφει ότι πραγματοποιήθηκε η ενημέρωση αυτή στο αντίστοιχο πεδίο των παρατηρήσεων του εντύπου ηλεκτρονικής καταγραφής της πώλησης.
- 3) Οι επαγγελματίες χρήστες που έχουν ήδη προμηθευτεί ποσότητες του σκευάσματος οφείλουν να συμμορφώνονται με την παρούσα απόφαση τροποποίησης του φάσματος δράσης.
- Γ.** Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθ. πρωτ. **10957/291298/6-11-2020 απόφασή μας**, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας»  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

**Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ**