



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 16.10.2023
Αριθ. πρωτ: 8366/235338

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Δ. Μακρογιάννη
Τηλέφωνο: 210 9287160
e-mail: dmakrogianni@minagric.gr

Προς: Syngenta Hellas Μονοπρόσωπη ΑΕΒΕ
Λ. Ανθούσας, 15349, Ανθούσα Αττικής
e-mail: voula.kalliakaki@syngenta.com

ΘΕΜΑ: «Διεύρυνση της με αριθ. 60658 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) MAVITA 250 EC (difenoconazole 25% β/ο) σε ήσσονος σημασίας χρήσεις»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις:
 - Του ν. 4036/2012 (Α'8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - Του ν. 2690/1999 (Α'45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 - Του ν. 4622/2019 (Α'133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
- Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 51 αυτού.
- Το αριθμ. 79/27.06.2023 Π.Δ. «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.» (Α'131/27.06.2023).
- Την αριθμ. 1881/286212/13.10.2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β'4612/19.10.20).
- Το αριθμ. 12862/330936/07.12.2020 έγγραφο της Υπηρεσίας με θέμα «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά».
- Την αριθμ. 13172/128520/23.01.2018 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 60658 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) MAVITA 250 EC (difenoconazole 25% β/ο), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
- Την αριθμ. 8366/235338/24.07.2023 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- Διευρύνουμε τη με αριθ. 60658 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) MAVITA 250 EC (difenoconazole 25% β/ο), που χορηγήθηκε με την αριθμ.

13172/128520/23.01.2018 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε ήσσονος σημασίας χρήσεις.

Τα σημεία **5**, **11** και **13** διαμορφώνονται ως εξής:

5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μεγ. αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο
		κ.εκ./στρέμμα	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ	κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού		
Μηλιά (MABSD)	Φουζικλάδιο <i>Venturia inaequalis</i> (VENTIN)	30	100-150	15-20	Από την έναρξη της ανθοφορίας (περίπου το 10% των ανθέων έχει ανοίξει) έως το στάδιο της προχωρημένης ωρίμανσης (φάση έντονης απόκτησης του τυπικού χρωματισμού της ποικιλίας) BBCH 61-84	3 εφαρμογές με 10 ημέρες μεσοδιάστημα
Αχλαδιά (PYUCO) Μουσμουλιά (MSPGE) Κυδωνιά (CYDOB)	Φουζικλάδιο <i>Venturia pyrina</i> (VENTPI)	30	100-150	15-20	Από την έναρξη της ανθοφορίας (περίπου το 10% των ανθέων έχει ανοίξει) έως το στάδιο της προχωρημένης ωρίμανσης (φάση έντονης απόκτησης του τυπικού χρωματισμού της ποικιλίας) BBCH 61-84	3 εφαρμογές με 10 ημέρες μεσοδιάστημα
Ροδακινιά (PRNPS) Βερυκοκιά (PRNAR)	Φαία σήψη <i>Monilia</i> sp. (MONISP) Ωίδιο <i>Sphaerotheca</i> sp. (SPHRSP) Εξώασκος <i>Taphrina</i> sp. (TAPHSP)	45	100-150	20-30	Από την έναρξη της ανθοφορίας (BBCH 60) μέχρι 7 ημέρες από τη συγκομιδή	2 εφαρμογές με 7 ημέρες μεσοδιάστημα
Δαμασκηνιά (PRNDO) Κερασιά (PRNCE)	Φαία σήψη <i>Monilia</i> sp. (MONISP) Ωίδιο <i>Sphaerotheca</i> sp.	30	100-150	20	Από την έναρξη της ανθοφορίας έως την έναρξη της συγκομιδής BBCH 60-87	3 εφαρμογές με 10 ημέρες μεσοδιάστημα

	(SPHRSP) Εξώασκος <i>Taphrina</i> sp. (TAPHSP)					
Ελιά (OLVEU)	Κυκλοκόνιο <i>Cycloconium</i> sp. (CYCLSP) <u>Χρήσεις ήσσονος σημασίας:</u> Γλοιοσπόριο* <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> (COLLGL) <i>Colletotrichum acutatum</i> (COLLAC) <i>Colletotrichum clavatum</i> (COLLCL)	50	80	50-60	Ο καρπός έχει αποκτήσει το 50% του τελικού του μεγέθους έως την ανάπτυξη του τυπικού χρωματισμού του καρπού BBCH 75-85	2 εφαρμογές με 14 ημέρες μεσοδιάστημα
Αμπέλι (VITVI) (επιτραπέζιο και οινοποιήσιμο)	Ωίδιο <i>Erysiphe necator</i> (UNCINE) Μαύρη σήψη <i>Guignardia bidwellii</i> (GUIGBI)	20	100	12-20	Από την εμφάνιση του 2 ^{ου} φύλλου έως το στάδιο που οι ρώγες μαλακώνουν BBCH 12-85	4 εφαρμογές με 10 ημέρες μεσοδιάστημα
Φράουλα (Α) (FRAAN)	Ωίδιο <i>Podosphaera</i> sp. (PODOSP)	50	50-100	50	Από την εμφάνιση των πρώτων ταξιανθιών έως τη δεύτερη συγκομιδή που οι περισσότεροι καρποί είναι χρωματισμένοι BBCH 51-89	2 εφαρμογές με 7 ημέρες μεσοδιάστημα
Φράουλα (Θ) (FRAAN)	Ωίδιο <i>Podosphaera</i> sp. (PODOSP)	50	50-100	50	Από την εμφάνιση των πρώτων ταξιανθιών έως τη δεύτερη συγκομιδή που οι περισσότεροι καρποί είναι χρωματισμένοι BBCH 51-89	3 εφαρμογές με 7 ημέρες μεσοδιάστημα

Σμέουρα (RUBFR) Βατόμουρα (RUBID)	Ωίδιο <i>Podosphaera</i> sp. (PODOSP) Δρεπανοπεζίζα <i>Drepanopeziza</i> sp. (DREPSP) Μαύρη σήψη <i>Didymella</i> sp. (DIDYSP) Σκωρίαση <i>Phragmidium</i> sp. (PHRASP)	40	50-100	30-40	Από την έναρξη της ανάπτυξης των βλαστών έως την έναρξη του φουσκώματος των ανθοφόρων και φυλλοφόρων οφθαλμών BBCH 31-49	2 εφαρμογές με 7 ημέρες μεσοδιάστημα
Τομάτα (Α+Θ) (LYPES)	Αλτερναρίωση <i>Alternaria</i> sp. (ALTESP) Ωίδιο <i>Leveillula</i> sp. (LEVESP) Κλαδοσπορίωση <i>Cladosporium</i> sp. (CLADSP)	50	50-100	50	Από την έκπτυξη του πρώτου πλάγιου βλαστού έως το 70% των καρπών να αποκτήσουν τυπικό χρώμα ωρίμανσης BBCH 20-87	3 εφαρμογές με 7 ημέρες μεσοδιάστημα
Πεπόνι (CUMME) Καρπούζι (CITLA) Αγγούρι (CUMSA) Κολοκύθι (CUUPG) (Α+Θ)	Ωίδιο <i>Erysiphe</i> sp. (ERYSSP) <i>Sphaerotheca</i> sp. (SPHRSP)	50	50-100	50	Α: Από την εμφάνιση των πρώτων θηλυκών ανθέων έως το 60% των καρπών να έχουν αποκτήσει το τυπικό χρώμα ωρίμανσης BBCH 51-86 Θ: Από την εμφάνιση του πρώτου πλάγιου βλαστού έως τη πλήρη ωρίμανση του καρπού BBCH 21-89	3 εφαρμογές με 8 ημέρες μεσοδιάστημα
Αγκινάρα (CYUSC)	Αλτερναρίωση <i>Alternaria</i> sp. (ALTESP) Έλκος <i>Leptosphaeria maculans</i> (LEPTMA) Μυκοσφαιρέλλα <i>Mycosphaerella</i> sp. (MYCOSP) Ωίδιο <i>Erysiphe</i> sp. (ERYSSP)	50	50-100	50	Από την έναρξη της ανάπτυξης της φυλλικής μάζας έως το 60% της μέγιστης φυλλικής μάζας BBCH 40-46	3 εφαρμογές με 7 ημέρες μεσοδιάστημα

	<i>Leveillula</i> sp. (LEVESP)					
Κουνουπίδι (BR SOB) Λάχανο (BR SOL)	Αλτερναρίωση <i>Alternaria</i> sp. (ALTESP) Μυκοσφαιρέλλα <i>Mycosphaerella</i> <i>brassicicola</i> (MYCOBR)	50	50-100	50	Από την έναρξη σχηματισμού της κεφαλής έως ότου φθάσει το 60% του τελικού της μεγέθους BBCH 40-46	3 εφαρμογές με 10 ημέρες μεσοδιάστημα
Μπρόκολο (BR SOK)	Αλτερναρίωση <i>Alternaria</i> sp. (ALTESP) Ωίδιο <i>Erysiphe</i> sp. (ERYSSP) Έλκος <i>Leptosphaeria</i> <i>maculans</i> (LEPTMA) Μυκοσφαιρέλλα <i>Mycosphaerella</i> <i>brassicicola</i> (MYCOBR)	50	50-100	50	Από την έναρξη σχηματισμού της κεφαλής έως ότου φθάσει το 60% του τελικού της μεγέθους BBCH 40-46	3 εφαρμογές με 10 ημέρες μεσοδιάστημα
Μαϊντανός (Α) (PARCR)	Σεπτόρια <i>Septoria</i> sp. (SEPTSP) Ωίδιο <i>Erysiphe heraclei</i> (ERYSHE) <i>Erysiphe</i> <i>cichoracearum</i> (ERYSCI) Αλτερναρίωση <i>Alternaria</i> sp. (ALTESP)	50	50-100	50	Κατά το στάδιο της φυλλικής ανάπτυξης του φυτού BBCH 40	2 εφαρμογές με 14 ημέρες μεσοδιάστημα
Μαϊντανός (Θ) (PARCR)	Σεπτόρια <i>Septoria</i> sp. (SEPTSP) Ωίδιο <i>Erysiphe heraclei</i> (ERYSHE) <i>Erysiphe</i> <i>cichoracearum</i> (ERYSCI) Αλτερναρίωση <i>Alternaria</i> sp. (ALTESP)	50	50-100	50	Κατά το στάδιο της φυλλικής ανάπτυξης του φυτού BBCH 40	3 εφαρμογές με 14 ημέρες μεσοδιάστημα
Σέλερυ (Α+Θ) (APUGD)	Σεπτόρια <i>Septoria</i> sp. (SEPTSP)	50	50-100	50	Κατά το στάδιο της φυλλικής ανάπτυξης του φυτού BBCH 40-49	Α: 3 εφαρμογές με 14 ημέρες μεσοδιάστημα Θ: 2 εφαρμογές με 14 ημέρες μεσοδιάστημα

Κρεμμύδι (ALLCE) Σκόρδο (ALLSA)	Αλτερναρίωση <i>Alternaria</i> sp. (ALTESP) Σκωρίαση <i>Puccinia allii</i> (PUCCAL)	50	50-100	50	Έναρξη έως λήξη της βολβοποίησης BBCH 40-49	2 εφαρμογές με 12 ημέρες μεσοδιάστημα
Πράσο (ALLPO)	Αλτερναρίωση <i>Alternaria</i> sp. (ALTESP) Σκωρίαση <i>Puccinia allii</i> (PUCCAL)	50	50-100	50	Από έναρξη της ανάπτυξης του συγκομιζόμενου φυτικού μέρους έως το μήκος και η διάμετρος του βλαστού να φτάσουν το τυπικό τους μέγεθος BBCH 40-49	3 εφαρμογές με 12 ημέρες μεσοδιάστημα
Σπαράγγι (ASPSS)	Σκωρίαση <i>Puccinia</i> sp. (PUCCSP) Στεμφύλιο <i>Stemphylium</i> sp. (STEMSP)	50	50-100		Από όταν σταματήσει να αναπτύσσεται ο μακρύτερος βλαστός έως το τέλος της ανάπτυξης των καρπών BBCH 41-89	3 εφαρμογές με 14 ημέρες μεσοδιάστημα
Πατάτα (SOLTU) Γλυκοπατάτα (IPOBA)	Αλτερναρίωση <i>Alternaria</i> sp. (ALTESP)	60	50-100		Από την έναρξη σχηματισμού των κονδύλων έως ότου οι πρώτοι καρποί να αποκτήσουν χαρακτηριστικό χρώμα BBCH 40-85	3 εφαρμογές με 7 ημέρες μεσοδιάστημα
Ζαχαρότευτλα (BEAVA) Παντζάρι (BEAVX)	Κερκοσπορίωση <i>Cercospora beticola</i> (CERCBE) Ραμουλάρια <i>Ramularia beticola</i> (RAMUBE) Ωίδιο <i>Erysiphe betae</i> (ERYSBE), Σκωρίαση <i>Uromyces betae</i> (UROMBE)	40-50	50-100		Από το στάδιο που τα φύλλα καλύπτουν το 10% της επιφάνειας του εδάφους έως να φτάσουν το τελικό μέγεθος για συγκομιδή BBCH 31-49	3 εφαρμογές με 21 ημέρες μεσοδιάστημα
Όσπρια (Ξηρά φασόλια (PHSVX) Φακές (LENCU)	Ασκοχύτωση <i>Ascochyta pisi</i> (ASCOPI) Μυκοσφαιρέλλα <i>Mycosphaerella</i> sp. (MYCOSP)	40	40-50		Από το στάδιο εμφάνισης των πρώτων μπουμπουκιών έως ότου σχεδόν όλοι οι λοβοί	2 εφαρμογές με 21 ημέρες μεσοδιάστημα

Ρεβίθι (CIEAR) Λούπινα (LUPAL))					έχουν φθάσει στο τελικό τους μέγεθος BBCH 51-79	
Μελιτζάνα (A+Θ) (SOLME) Πυτεριά (A+Θ) (CPSAN)	Αλτερναρίωση <i>Alternaria</i> sp. (ALTESP) Ωίδιο <i>Leveillula</i> sp. (LEVESP)	50	50-100	50	Από την έκπτυξη του πρώτου πλάγιου βλαστού έως το 70% των καρπών να αποκτήσουν τυπικό χρώμα ωρίμανσης BBCH 20-87	2 εφαρμογές με 10 ημέρες μεσοδιάστημα
Λαχανάκια Βρυξελλών (BRSOF)	Αλτερναρίωση <i>Alternaria</i> sp. (ALTESP) Ωίδιο <i>Erysiphe</i> sp. (ERYSSP) Έλκος <i>Leptosphaeria maculans</i> (LEPTMA) Μυκοσφαιρέλλα <i>Mycosphaerella brassicicola</i> (MYCOBR)	50	50-100	50	Από την έναρξη ανάπτυξης των κεφαλών έως ότου το 70% των κεφαλών να έχουν κλείσει BBCH 40-47	2 εφαρμογές με 14 ημέρες μεσοδιάστημα
Φύλλα σέλινου** (A) (APUGS) Φύλλα άνηθου** (A) (AFEGR) Χρήσεις ήσσονος σημασίας	Σεπτόρια <i>Septoria</i> sp. (SEPTSP) Ωίδιο <i>Erysiphe heraclei</i> (ERYSHE) <i>Erysiphe cichoracearum</i> (ERYSCI) Αλτερναρίωση <i>Alternaria</i> sp. (ALTESP)	50	50-100	50	Ψεκασμός φυλλώματος κατά το στάδιο της φυλλικής ανάπτυξης του φυτού (BBCH 40)	2 εφαρμογές με 14 ημέρες μεσοδιάστημα
Φύλλα σέλινου** (Θ) (APUGS) Φύλλα άνηθου** (Θ) (AFEGR) Χρήσεις ήσσονος σημασίας	Σεπτόρια <i>Septoria</i> sp. (SEPTSP) Ωίδιο <i>Erysiphe heraclei</i> (ERYSHE), <i>Erysiphe cichoracearum</i> (ERYSCI), Αλτερναρίωση <i>Alternaria</i> sp. (ALTESP)	50	50-100	50	Ψεκασμός φυλλώματος κατά το στάδιο της φυλλικής ανάπτυξης του φυτού (BBCH 40)	3 εφαρμογές με 14 ημέρες μεσοδιάστημα
Καστανιά** (CSNSA)	Φαιά σήψη <i>Gnomoniopsis</i>	45	80-90		Ψεκασμός φυλλώματος.	2 εφαρμογές με 14 ημέρες

Χρήση ήσσονος σημασίας	<i>castaneae</i> (GNMPCA)			Εφαρμογές από το τέλος της άνθησης και μέχρι το 90% των καρπών να πάρουν το τελικό τους μέγεθος. (BBCH 69-79)	μεσοδιάστημα
<p>Παρατηρήσεις:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Εφαρμόζετε την χαμηλότερη δόση όταν η πίεση του μολύσματος είναι χαμηλή και την υψηλότερη δόση όταν η πίεση του μολύσματος είναι μεγάλη (συνθήκες ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας). 2. *«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα στο γλοιοσπόριο της ελιάς. Για τη χρήση αυτή, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα από την εφαρμογή του σκευάσματος». 3. **«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στα φύλλα σέλινου, τα φύλλα άνηθου και την καστανιά από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος». 					

11

Δηλώσεις προφύλαξης

P102: Μακριά από παιδιά.**P270:** Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.**P280:** Να φοράτε προστατευτικά γάντια/μέσα προστασίας για τα μάτια και το πρόσωπο.**P405:** Φυλάσσεται κλειδωμένο.**P501:** Διάθεση περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.**EUH 066:** Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.**EUH 401:** Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.**SP1:** Μην μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα.**SPe3:** Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς:

- Να αφήνετε μια αψέκαστη ζώνη:

- 20 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα για την καλλιέργεια της ελιάς **και της καστανιάς.**

- 10 μέτρων για την καλλιέργεια του αμπελιού

- 15 μέτρων για τις καλλιέργειες των μηλοειδών (όψιμες εφαρμογές)

- 25 μέτρων για τις καλλιέργειες των μηλοειδών (πρώιμες εφαρμογές), της κερασιάς και της δαμασκηλιάς

- 30 μέτρων για τις καλλιέργειες της βερικοκιάς και της ροδακινιάς.

- 12 μέτρων από τα επιφανειακά νερά για τις καλλιέργειες των ζαχαροτεύτλων, του παντζαριού, των ξερών φασολιών, της φακής, των ρεβυθιών και των λούπινων.

- 10-12 μέτρων από τα επιφανειακά νερά σε συνδυασμό με ακροφύσια χαμηλής διασποράς με τα οποία επιτυγχάνεται μείωση της διασποράς τουλάχιστον 50% για τις καλλιέργειες της μελιτζάνας, της πιπεριάς, του αγγουριού, του κολοκυθιού, του πεπονιού, του καρπουζιού, της τομάτας, της φράουλας, της πατάτας, της γλυκοπατάτας, του κρεμμυδιού, του σκόρδου, του πράσου, του μαϊντανού, της αγκινάρας, του λαχάνου, του

κουνουπιδιού, του μπρόκολου, των λαχανάκιων Βρυξελλών, του σέλερυ, των φύλλων σέλινο, των φύλλων άνηθου και του σπαραγγιού.

- Να χρησιμοποιείτε ακροφύσια χαμηλής διασποράς με τα οποία επιτυγχάνεται μείωση της διασποράς τουλάχιστον 50% για τα σμέουρα και τα βατόμουρα.

«Μην εισέρχεστε στον αγρό πριν να έχουν στεγνώσει πλήρως τα φύλλα μετά τον ψεκασμό. Σε περίπτωση που οι εργάτες πρέπει να εισέλθουν στον αγρό σύντομα μετά τον ψεκασμό, θα πρέπει να φοράνε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία»

13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Καλλιέργεια (Κωδικός προϊόντος με βάση το Παράρτημα Ι του Καν. (ΕΚ) 396/2005)	Ημέρες
Φράουλα (Α+Θ) (0152000), Τομάτα (Θ) (0231010), Αγγούρι (Α+Θ) (0232010), Κολοκύθι (Α+Θ) (0232030), Πεπόνι (Α+Θ) (0233010), Καρπούζι (Α+Θ) (0233030), Πατάτα 0211000), Γλυκοπατάτα (0212030), Μελιτζάνα (Α+Θ) (0231030), Πιπεριά (Α+Θ) (0231020)	3
Ροδακινιά (0140030), Κερασιά (0140020), Δαμασκηλιά (0140040), Σμέουρα (0153030), Βατόμουρα (0153010), Τομάτα (Α) (0231010), Βερικοκιά (0140010)	7
Μηλιά (0130010), Αχλαδιά (0130020), Μουσμουλιά (0130040), Κυδωνιά (0130030), Αγκινάρα (Α) (0270050), Μπρόκολο (Α) (0241010), Κουνουπίδι (Α) (0241020), Μαϊντανός(Α+Θ) (0256040), Σέλερυ (Α+Θ) (0270030), Κρεμμύδι (Α) (0220020), Σκόρδο (Α) (0220010), Φύλλα σέλινο (Α+Θ) (0256030), Φύλλα άνηθου (Α+Θ) (0256030-006)	14
Αμπέλι (επιτραπέζιο 0151010 & οινοποιήσιμο 0151020), Πράσο (Α) (0270060), Λάχανο (Α) (0242020), Ζαχαρότευτλο (0900010), Παντζάρι (0213010), Λαχανάκια Βρυξελλών (0242010)	21
Όσπρια (Ξηρά φασόλια 0300010, Φακές 0300020, Ρεβίθι 0300030, Λούπινα 0300040), Καστανιά (0120040)	28
Ελιά (0161030 + 0402010)	30
Σπαράγγι (0270010)	--

II. Διάθεση αποθεμάτων

1. Η ετικέτα του σκευάσματος να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
2. Για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, επιτρέπεται η τοποθέτηση στις συσκευασίες του σκευάσματος της μέχρι σήμερα ισχύουσας ετικέτας.
3. Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις συσκευασίες του σκευάσματος θα τοποθετείται υποχρεωτικά η νέα τροποποιημένη ετικέτα.

- III. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 13172/128520/23.01.2018 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ