



## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 11.12.2023  
Αριθ. πρωτ: 13586/379270

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
Πληροφορίες: Σ. Ολοκτσίδου  
Τηλέφωνο: 210 92 87 256  
e-mail: [soloktsidou@minagric.gr](mailto:soloktsidou@minagric.gr)

Προς: SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μ. Α.Ε.  
Β. Κωνσταντίνου 32,  
Τ.Κ. 19400, Κορωπί  
email: [info@sipcam.gr](mailto:info@sipcam.gr)

ΘΕΜΑ: «Ανανέωση της με αριθ. 70190 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) BUGGY BIO (δ.ο. glyphosate οξύ 36% β/ο)»

## ΑΠΟΦΑΣΗ

## Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
  - α) του ν. 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
  - β) του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α' 45),
  - γ) του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
2. Τους κανονισμούς όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν:
  - α) Τον (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα τα άρθρα 43 και 34 αυτού.
  - β) Τον (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006
  - γ) (Τον ΕΕ) αριθ. 547/2011 της Επιτροπής της 8<sup>ης</sup> Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
  - δ) Τον (ΕΕ) αριθ. 2017/2324 της Επιτροπής, της 12ης Δεκεμβρίου 2017, για την ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας **glyphosate**.
  - ε) Τον (ΕΕ) αριθ. 2022/2364 της Επιτροπής της 2ης Δεκεμβρίου 2022 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση της περιόδου έγκρισης της δραστικής ουσίας **glyphosate**.
  - στ) Τον (ΕΚ) 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το αριθ. 79/2023 Π.Δ. "Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών"

(Α' 131/27.06.2023).

4. Την αριθ. 1881/286212/13.10.2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β' 4612/19.10.20).
5. Την αριθ. 7929 άδεια του πανομοιότυπου φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) ROUNDUP BIO (δ.ο. glyphosate σε οξύ 36% β/ο), η οποία χορηγήθηκε με την αριθ. 7802/206696/04.08.2021 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
6. Την με αρ. πρωτ. 2731/38610/13.03.2018 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

**A** Ανανεώνουμε την αριθ. **70190** άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με τα άρθρα 43 και 34 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (**ζιζανιοκτόνο**) **BUGGY BIO (δ.ο. glyphosate οξύ 36% β/ο)** με τα ακόλουθα στοιχεία:

#### **1** Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

##### Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης  
1.1.β Ημερομηνία 1<sup>ης</sup> ανανέωσης  
1.1.γ Ημερομηνία λήξης

**70190**

**06.12.2016**

**11.12.2023**

**15.12.2024**

##### **1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν**

- 1.2.α Εμπορικό όνομα:  
1.2.β Μορφή:

**BUGGY BIO**

**Πυκνό διάλυμα (SL)**

##### **1.3 Δραστική ουσία**

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO:

**Glyphosate**

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

**95% β/β min**

Χημική ομάδα:

**Φωσφονογλυκινών**

Παρασκευαστής της δ.ο. :

**Bayer AG, Crop Science Division**  
Regulatory Affairs  
Alfred-Nobel-Strasse 50  
40789 Monheim am Rhein, Γερμανία

Εργοστάσια παρασκευής της δ.ο.:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

##### **1. Bayer Agriculture BV**

Haven 627, Scheldelaan 460  
B – 2040 Antwerpen, Βέλγιο

##### **2. Monsanto do Brasil Ltda.**

Av. Carlos Marcondes 1200  
Bairro do Limoeiro, Caixa Postal 941  
Sao Jose dos Campos 12241-900, Βραζιλία

##### **3. Monsanto Zarate plant**

Ruta 12-Km. 83.100  
Zarate 2800, Αργεντινή

**4. Bayer CropScience LP--Luling Plant**  
12501 River Road, Luling, Louisiana 70070, ΗΠΑ

**5. Bayer CropScience LP--Muscatine Plant**  
2500 Wiggins Road  
Muscatine, Iowa 52761, ΗΠΑ

Τεχνικές προδιαγραφές της  
δραστικής ουσίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας glyphosate προσδιορίζονται στην με αριθ. πρωτ. 2439/33798/05.03.2018 αίτηση για το πανομοιότυπο προϊόν ROUNDUP BIO, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.

#### 1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

**SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μ.Α.Ε.**  
Βασιλέως Κωνσταντίνου 32  
Τ.Κ. 19400  
Τηλ.: 210 5223834  
E-mail: [Info@sipcam.gr](mailto:Info@sipcam.gr)

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

**SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μ.Α.Ε.**  
Βασιλέως Κωνσταντίνου 32  
Τ.Κ. 19400  
Τηλ.: 210 5223834  
E-mail: [Info@sipcam.gr](mailto:Info@sipcam.gr)

β) Υπεύθυνος για την τελική  
διάθεση στην αγορά:

**SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μ.Α.Ε.**  
Βασιλέως Κωνσταντίνου 32  
Τ.Κ. 19400  
Τηλ.: 210 5223834  
E-mail: [Info@sipcam.gr](mailto:Info@sipcam.gr)

*Σε περίπτωση μελλοντικής τροποποίησης της παρούσας άδειας ως προς το εν λόγω σημείο, ο ανωτέρω υπεύθυνος διάθεσης θα έχει και την ευθύνη για τα υπάρχοντα αποθέματα του σκευάσματος που παρήχθησαν ή/και κυκλοφόρησαν στην ελληνική αγορά μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής απόφασης τροποποίησης. Για τις ποσότητες του σκευάσματος που θα παραχθούν και θα κυκλοφορήσουν στην αγορά από την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης τροποποίησης και μετά, την ευθύνη θα φέρει ο νέος υπεύθυνος διάθεσης.*

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

**SIPCAM OXON S.p.A.**  
Via Vittorio Veneto, 81,  
26857 Salerano sul Lambro (LO), Ιταλία

δ) Εργοστάσια παρασκευής του  
σκευάσματος:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:

**1.BAYER AGRICULTURE BV**

Haven 627, Scheldelaan 460  
B – 2040 Antwerp, Βέλγιο

**2.SIPCAM OXON S.p.A.**

Via Vittorio Veneto, 81,  
26857 Salerano sul Lambro (LO), Ιταλία

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος:

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

**1.SIPCAM OXON S.p.A.**

Via Vittorio Veneto, 81,  
26857 Salerano sul Lambro (LO), Ιταλία

**2. BAYER AGRICULTURE BV**

Haven 627, Scheldelaan 460  
B-2040 Antwerp, Βέλγιο

**3. ΤΕΧΝΟΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε.**

Νέα Σάντα Κυλικής, Τ.Κ. 56403

**4. ΕΛΛΑΓΡΕΤ Α.Β.Ε.Ε.**

Θέση Ξηροπήγαδο, Μάνδρα Αττικής

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

**Δραστικές ουσίες:** glyphosate σε οξύ 36% β/ο  
(υπό μορφή άλατος ισοπροπυλαμίνης: 48,58% β/ο)  
**Βοηθητικές ουσίες:** 67,61% β/β

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος, όπως αυτή έχει κατατεθεί με την αριθμό πρωτ. 2439/33798/05.03.2018 αίτηση του προϊόντος αναφοράς ROUNDUP BIO , είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

## 2 Συσκευασίες

| A/A | Είδος  | Μέγεθος             | Υλικό                                  |
|-----|--------|---------------------|--|
| 1   | Φιάλες | 100 κ.εκ. - 2 λίτρα | HDPE (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας) |
| 2   | Δοχεία | 2 - 25 λίτρα        | HDPE (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας) |

## 3 Οδηγίες χρήσης

**Προορίζεται για επαγγελματίες χρήστες.**

**Τρόπος εφαρμογής:**

Ομοιόμορφος ψεκασμός του φυλλώματος των ζιζανίων με 20-40 λίτρα νερό ανά στρέμμα και χωρίς να έλθουν σε επαφή τα σταγονίδια του ψεκαστικού διαλύματος με το φύλλωμα, τους τρυφερούς βλαστούς ή τους καρπούς των καλλιεργειών προς αποφυγήν φυτοτοξικότητας ή συσσώρευσης υπολειμμάτων στους καρπούς.

Για την οροβάγχη στον καπνό εφαρμόζεται με 30-40 λίτρα νερό ανά στρέμμα με ψεκασμό καλύψεως της φυτείας.

Χρησιμοποιείτε μπεκ τύπου σκούπας και ψεκάστε με πίεση μικρότερη από 2 ατμόσφαιρες (30 PSI).

**Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:**

Γεμίζετε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό και προσθέστε αναδεύοντας την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό, αναδεύοντας συνεχώς. Να μη χρησιμοποιείτε σκληρό νερό για τη διάλυση του φαρμάκου.

**Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:**

Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και απορρυπαντικό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:**

Τα υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

**Συνδυαστικότητα: --**

**4 Κατηγορία και τρόπος δράσης**

Διασυστηματικό, μη εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων και πολυετών (αγρωστωδών, πλατύφυλλων ζιζανίων) και υδροχαρών ζιζανίων, ξυλωδών φυτών, καθώς και για την καταπολέμηση της οροβάγχης του καπνού. Απορροφάται από τα φύλλα και τους τρυφερούς βλαστούς των ζιζανίων και παρεμποδίζει το ένζυμο EPSPS αναστέλλοντας την βιοσύνθεση των αρωματικών αμινοξέων.

## 5 Φάσμα δράσης

| Πεδίο Εφαρμογής  | Στόχος   | Δόσεις σκευάσματος             |                                  | Τρόπος και χρόνος εφαρμογής  | Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο |
|--|--|--------------------------------|----------------------------------|--|--|
|  |  | κ. εκ/ στρέμμα                 | Όγκος ψεκ. υγρού λιτρα / στρέμμα |  |  |
| <b>Εσπεριδοειδή:</b><br><b>Πορτοκαλιά</b><br>CIDSΙ<br><b>Μανταρινιά</b><br>CIDRE<br><b>Λεμονιά</b><br>CIDLI<br><b>Γκρέιπ φρουτ</b><br>CIDPA<br><b>Κιτριά</b><br>CIDME<br><br><b>Ακρόδρυα:</b><br><b>Αμυγδαλιά</b><br>PRNDU<br><br><b>Μηλοειδή:</b><br><b>Μηλιά</b><br>MABSD<br><b>Αχλαδιά</b><br>PYUCO<br><br><b>Πυρηνόκαρπα:</b><br><b>Βερικοκιά</b><br>PRNAR<br><b>Ροδακινιά</b><br>PRNPS<br><b>Κερασιά</b><br>PRNAV<br><br><b>Αμπέλι</b><br>VITVI<br>(επιτραπέζιο & οينوποιήσιμο) | <b>Ετήσια ζιζάνια (*)</b><br>(αγρωστώδη και πλατύφυλλα)  | 150-200                        | 20 - 40                          | Κατευθυνόμενος ψεκάσμος όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο της ζωηρής τους ανάπτυξης                    | 1 - 2  |
|  | Μολόχα<br>( <i>Malva sp.</i> – MALSS)<br>Τσουκνίδα<br>( <i>Urtica sp.</i> – URTSS)<br>Πολυκόμπι<br>( <i>Polygonum sp.</i> – POLSS)<br>Αντράκλα<br>( <i>Portulaca oleracea</i> – POROL) | 400-600                        | 20 - 40                          |  |  |
| <b>Μηλοειδή:</b><br><b>Μηλιά</b><br>MABSD<br><b>Αχλαδιά</b><br>PYUCO<br><br><b>Πυρηνόκαρπα:</b><br><b>Βερικοκιά</b><br>PRNAR<br><b>Ροδακινιά</b><br>PRNPS<br><b>Κερασιά</b><br>PRNAV<br><br><b>Αμπέλι</b><br>VITVI<br>(επιτραπέζιο & οينوποιήσιμο)   | <b>Πολυετή ζιζάνια (**)</b>  | 500-1000                       | 20 - 40                          | Κατευθυνόμενος ψεκάσμος όταν τα ζιζάνια βρίσκονται κοντά στην άνθηση, κατά την άνθηση ή λίγο μετά από αυτή | 1  |
|  | Αγριάδα<br>( <i>Cynodon dactylon</i> - CYNDA)  | 750-1000                       | 20 - 40                          |  |  |
|  | Βέλιουρας<br>( <i>Sorghum halepense</i> - SORHA)   | 500                            | 20 - 40                          |  |  |
|  | Φτέρη<br>( <i>Pteridium aquilinum</i> – PTEAQ)   | 500                            | 20 - 4 0                         |  |  |
|  | Περικοκλάδα<br>( <i>Convolvulus arvensis</i> - CONAR)  | 1000                           | 20 - 40                          |  |  |
| <b>Αμπέλι</b><br>VITVI<br>(επιτραπέζιο & οينوποιήσιμο)   | Κίρσιο<br>( <i>Cirsium arvense</i> - CIRAR)  | 1000                           | 20 - 40                          | α) 1 <sup>η</sup> εφαρμογή κατά την άνθηση   | 2 εφαρμογές για την κύπερη                           |
|  | Κύπερη<br>( <i>Cyperus sp.</i> –CYPSS)   | 500<br>(1 <sup>η</sup> εφαρμο- | 20 - 40                          |  |  |

|                               |  | γή)                |         | β) 2 <sup>η</sup> εφαρμογή σε περίπτωση αναβλάστησης   |       |
|-------------------------------|--|--------------------|---------|--|-------|
| <b>Ελιά</b><br>OLVEU          | <b>Ετήσια ζιζάνια (*)</b><br>(αγρωστώδη και πλατύφυλλα)  | 150-200            | 20 - 40 | Κατευθυνόμενος ψεκασμός όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο της ζωηρής τους ανάπτυξης                    | 1 - 2 |
|                               | Μολόχα<br>( <i>Malva sp.</i> – MALSS)<br>Τσουκνίδα<br>( <i>Urtica sp.</i> – URTSS)<br>Πολυκόμπι<br>( <i>Polygonum sp.</i> – POLSS)<br>Αντράκλα<br>( <i>Portulaca oleracea</i> – POROL) | 400-600            | 20 - 40 |  |       |
|                               | <b>Πολυετή ζιζάνια (**)</b>  | 500-800            | 20 - 40 | Κατευθυνόμενος ψεκασμός όταν τα ζιζάνια βρίσκονται κοντά στην άνθηση, κατά την άνθηση ή λίγο μετά από αυτή | 1     |
|                               | Αγριάδα<br>( <i>Cynodon dactylon</i> - CYNDA)  | 750-800            | 20 - 40 |  |       |
|                               | Βέλιουρας<br>( <i>Sorghum halepense</i> - SORHA)   | 500                | 20 - 40 |  |       |
|                               | Φτέρη<br>( <i>Pteridium aquilinum</i> – PTEAQ)   | 500                | 20 - 40 |  |       |
|                               | Κύπερη<br>( <i>Cyperus sp.</i> – CYPSS)  | 600                | 20 - 40 | Εφαρμογή κατά την άνθηση   |       |
| <b>Καπνός</b><br>NIOTA        | Οροβάγχη<br>( <i>Orobancha ramosa</i> - ORARA)   | α) 40<br><br>β) 60 | 30 - 40 | Ψεκασμοί καλύψεως:<br>α) 40 ημέρες μετά τη μεταφύτευση<br>β) 60 ημέρες μετά τη μεταφύτευση                 | 2     |
| <b>Βαμβάκι (***)</b><br>GOSHI | <b>Ετήσια ζιζάνια (*)</b><br>(Αγρωστώδη και Πλατύφυλλα)  | 150 - 200          | 20-40   | Κατευθυνόμενος ψεκασμός μεταξύ των γραμμών πριν την έναρξη της άνθησης                                     | 1     |
|                               | <b>Πολυετή ζιζάνια (**)</b><br>(Αγρωστώδη και Πλατύφυλλα)  | 500                |         |  |       |
|                               | Βέλιουρας<br>( <i>Sorghum halepense</i> - SORHA)   | 500                |         |  |       |

|  |  |          |         |  |   |
|--|--|----------|---------|--|---|
| Αγροί μετά τη συγκομιδή της καλλιέργειας ή πριν την κατεργασία του εδάφους για σπορά   | Ετήσια ζιζάνια (*)<br>(αγρωστώδη και πλατύφυλλα)   | 150-200  | 20 - 40 | Όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο της ζωηρής τους ανάπτυξης                    | 1 |
|  | Μολόχα<br>( <i>Malva sp.</i> – MALSS)<br>Τσουκνίδα<br>( <i>Urtica sp.</i> – URTSS)<br>Πολυκόμπι<br>( <i>Polygonum sp.</i> – POLSS)<br>Αντράκλα<br>( <i>Portulaca oleracea</i> – POROL) | 400-600  | 20 - 40 |  |   |
|  | Πολυετή ζιζάνια (**)<br>(ως ανωτέρω)   | 500-1000 | 20 - 40 | Όταν τα ζιζάνια βρίσκονται κοντά στην άνθηση, κατά την άνθηση ή λίγο μετά από αυτή | 1 |
| Ακαλλιέργητες εκτάσεις   | Ετήσια ζιζάνια (*)<br>(αγρωστώδη και πλατύφυλλα)   | 150-200  | 20 - 40 | Όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο της ζωηρής τους ανάπτυξης                    | 2 |
|  | Μολόχα<br>( <i>Malva sp.</i> – MALSS)<br>Τσουκνίδα<br>( <i>Urtica sp.</i> – URTSS)<br>Πολυκόμπι<br>( <i>Polygonum sp.</i> – POLSS)<br>Αντράκλα<br>( <i>Portulaca oleracea</i> – POROL) | 400-600  | 20 - 40 |  |   |
|  | Πολυετή ζιζάνια (**)<br>(ως ανωτέρω)   | 500-1000 | 20 - 40 | Όταν τα ζιζάνια βρίσκονται κοντά στην άνθηση, κατά την άνθηση ή λίγο μετά από αυτή | 1 |
|  | Ξυλώδεις θάμνοι, βάτα<br>( <i>Rubus sp.</i> – RUBSS)   | 500-1000 | 20 - 40 | Όταν βρίσκονται σε πλήρη ανάπτυξη  | 1 |
| Κατά μήκος αρδευτικών και στραγγιστικών καναλιών   | Υδροχαρή ζιζάνια   | 800-1000 | 20 - 40 | Κοντά ή κατά την άνθηση των ζιζανίων   | 1 |
| (*) Για την καταπολέμηση των ετήσιων ζιζανίων απαιτούνται συνήθως μία με δύο εφαρμογές (χειμώνα-άνοιξη) ή/ και (καλοκαίρι-φθινόπωρο) ανάλογα με την εποχή εμφάνισης των ζιζανίων και την καλλιέργεια, όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο της ζωηρής τους ανάπτυξης. |  |          |         |  |   |



(\*\*) Για την καταπολέμηση πολυετών ζιζανίων απαιτείται συνήθως μία εφαρμογή, όταν τα ζιζάνια βρίσκονται κοντά στην άνθηση κατά την άνθηση ή λίγο μετά από αυτή.

(\*\*\*) Στο βαμβάκι ο ψεκασμός πρέπει να είναι κατευθυνόμενος μεταξύ των γραμμών πριν την έναρξη της άνθισης της καλλιέργειας. Τα σταγονίδια του ψεκαστικού διαλύματος δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με τα στελέχη και το φύλλωμα των φυτών.

**Επιβάλλεται η χρήση προστατευτικών καλυμμάτων (καλυπτρών) γύρω από τα μπεκ για την αποφυγή φυτοτοξικότητας στις καλλιέργειες.**

**Παρατηρήσεις:**

1. Στις δενδρώδεις καλλιέργειες και στα αμπέλια ο ψεκασμός των ζιζανίων πρέπει να είναι κατευθυνόμενος αποφεύγοντας επαφή των σταγονιδίων του ψεκαστικού διαλύματος με φύλλωμα, τρυφερούς βλαστούς, παραφυάδες και μη επουλωμένες πληγές κλαδέματος. Ο ψεκασμός επιτρέπεται μόνο σε εγκατεστημένους οπωρώνες ή αμπελώνες από το τρίτο (3<sup>ο</sup>) έτος από την φύτευσή τους και μετά, ανάλογα με την ανάπτυξη των φυτών.
2. Για τα πλατύφυλλα ζιζάνια *Malva* sp. (μολόχα), *Urtica* sp. (τσουκνίδα), *Polygonum* sp., *Portulaca oleracea* (αντράκλα), η δόση κυμαίνεται από 400-600 κυβ. εκ./ στρέμμα, ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης τους.
3. Για την αγριάδα, η εφαρμογή να γίνεται όταν έχει ύψος 15 – 30 εκατοστά.
4. Για την φτέρη η εφαρμογή να γίνεται μετά το ξεδίπλωμα της κορυφής.

**6** **Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί**

- Η εφαρμογή κατά μήκος των αρδευτικών και στραγγιστικών καναλιών να γίνεται όταν δεν υπάρχει νερό στα στραγγιστικά κανάλια. Απαιτείται διάστημα επτά (7) ημερών μετά την εφαρμογή για το γέμισμα των καναλιών.
- Να μην γίνεται ψεκασμός, αν αναμένεται βροχή σε 6 ώρες.
- Να μην χρησιμοποιείται σε καλλιέργειες, που προορίζονται για σποροπαραγωγή.
- Μην ψεκάσετε όταν φυσάει.
- Χρησιμοποιήστε υλικά ή γεωργικές πρακτικές για να αποφύγετε την επαφή των καρπών με τη δραστική ουσία ή με το έδαφος που έχει υποστεί εφαρμογή με τη δραστική ουσία.
- Για τις επιτραπέζιες ελιές επιτρέπεται η συλλογή τους μόνο από το δένδρο.
- Δεν επιτρέπεται εφαρμογή στις πεσμένες στο έδαφος ελιές.
- Να μη συλλέγονται ελιές από το έδαφος προκειμένου να αποφευχθούν υπολείμματα.
- Να μην επιτρέπεται η βόσκηση των ψεκασμένων ζιζανίων ακόμα και όταν αυτά ξεραθούν.

**Διαχείριση ανθεκτικότητας:**

Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική ουσία glyphosate, η οποία ανήκει στην ομάδα 9 κατά HRAC.

Συνιστάται η εναλλαγή με ζιζανιοκτόνα που δεν ανήκουν σε αυτή την ομάδα ή/και εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα), προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας.

**7** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:  
- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας

--

- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν

Σε αγρούς μετά τη συγκομιδή και πριν την κατεργασία του εδάφους για σπορά να μεσολαβεί διάστημα τουλάχιστον επτά (7) ημερών για τα ετήσια ζιζάνια και δεκατεσσάρων (14) ημερών για τα πολυετή ζιζάνια πριν την κατεργασία του εδάφους.

- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

Μην εισέρχετε στην ψεκασμένη περιοχή πριν στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό υγρό

**8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ετικέτα του.

**9** Εικονογράμματα κινδύνου:



**10** Δηλώσεις επικινδυνότητας:

**H411:** Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.  
**EUH401:** Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

**11** Δηλώσεις Προφύλαξης:

**P405+P102:** Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.  
**P270:** Μη τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.  
**P280:** Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο.  
*«Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας κατά την ανάμιξη/ φόρτωση και εφαρμογή»*  
*«Σε περίπτωση επανεισόδου μετά τον ψεκασμό οι εργάτες πρέπει να φοράνε ολόσωμη φόρμα εργασίας»*  
**P501:** Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.  
**SPe3:** Για να προστατέψετε τα **φυτά μη στόχους** να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας από τη μη καλλιεργούμενη γη **για το Αμπέλι:**

- 15 μέτρων ή
- 10 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού κατά 50% ή
- 5 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού κατά 90%

**SPe3:** Για να προστατέψετε τα **φυτά μη στόχους** να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας από τη μη καλλιεργούμενη γη **για τις υπόλοιπες καλλιέργειες:**

- 10 μέτρων ή
- 5 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού κατά 50% ή
- χρησιμοποιείτε ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 90%

**SP1:** Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα/ Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω του συστήματος αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.

## 12 Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο

Γενικά: Απομακρυνθείτε από την επικίνδυνη περιοχή. Τοποθετήστε και μεταφέρετε τον παθόντα σε σταθερή θέση (ξαπλωμένο στο πλάι). Απομακρύνετε τα ρούχα αμέσως και πετάξτε τα ασφαλώς.

**P310:** Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/ γιατρό.

**Σε περίπτωση εισπνοής:** Μεταφερθείτε στον καθαρό αέρα. Φέρετε τον παθόντα σε θέση ανάπαυσης και διατηρείστε τον ζεστό. Ειδοποιείστε αμέσως ένα γιατρό ή το Κέντρο Δηλητηριάσεων.

**Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Πλύνετε αμέσως με πολύ νερό τουλάχιστον επί 15 λεπτά. Βγάλτε αμέσως τα μολυσμένα ρούχα και παπούτσια. Ειδοποιείστε αμέσως ένα γιατρό ή ένα κέντρο δηλητηριάσεων.

**P305+P351+P338:** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

**P337 + P313:** Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

**Σε περίπτωση κατάποσης:** Ειδοποιείστε αμέσως ένα γιατρό ή το Κέντρο Δηλητηριάσεων. Ξεπλύνετε το στόμα και δώστε να πιει νερό σε μικρές δόσεις. ΜΗΝ προκαλείτε εμετό, εκτός και αν αυτό γίνει με εντολή ιατρού ή του κέντρου θεραπείας δηλητηριάσεων. Μη χορηγήσετε τίποτα στον παθόντα εάν δεν έχει τις αισθήσεις του. Μην αφήνετε το θύμα χωρίς επιτήρηση.

**ΑΝΤΙΔΟΤΟ:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Η θεραπεία με ατροπίνη και οξίμες δεν ενδείκνυται. Συστήνεται κατάλληλη υποστηρικτική και συμπτωματική θεραπεία όπως αυτή ενδείκνυται από την κατάσταση του ασθενή.

**ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777.**

**13 Προστασία των καταναλωτών**

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

| Φυτικά προϊόντα  | Ημέρες |
|--|--------|
| Πορτοκαλιά (0110020)<br>Μανταρινιά (0110050)<br>Λεμονιά (0110030)<br>Γκρέιπ φρουτ (0110010)<br>Κιτριά (0110030-002)<br>Αμυγδαλιά (0120010)<br>Μηλιά (0130010)<br>Αχλαδιά (0130020)<br>Βερικοκιά (0140010)<br>Ροδακινιά (0140030)<br>Κερασιά-(0140020)<br>Αμπέλι (0151000) (Επιτραπέζιες (0151010)<br>& Οινοποιήσιμες ποικιλίες (0151020))<br>Ελιά (Επιτραπέζιες (0161030) &<br>Ελαιοποιήσιμες (0402010) ποικιλίες)<br>Καπνός | 7      |
| Ακαλλιέργητες εκτάσεις,<br>Αγροί μετά τη συγκομιδή της καλλιέργειας<br>ή πριν την κατεργασία του εδάφους για<br>σπορά,<br>Κατά μήκος αρδευτικών & στραγγιστικών<br>καναλιών<br>Βαμβάκι (0401090)   | --     |

**14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.**

Φυλάσσεται στην αρχική, απαραβίαστη συσκευασία του, σε μέρος ξηρό, δροσερό, προστατευμένο από τον παγετό και καλά αεριζόμενο, μακριά από θερμότητα. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής του.

**15 Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης**

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

**16 Κατάλογος προστατευόμενων μελετών**

Στο τμήμα Α της σχετικής Έκθεσης Αξιολόγησης καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

**17 Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών**

Ο κάτοχος της έγκρισης του πανομοιότυπου σκευάσματος οφείλει να προσκομίσει στην ΣΕΑ τις αιτούμενες μελέτες/συμπληρωματικά στοιχεία:

- An analytical method for the determination of N-nitrosoglyphosate (NNG) with a LOQ below the acceptable limit ( $LOQ \leq 0.324\text{mg/kg}$ ) should be provided.
- A Storage Stability after 14 days at 54<sup>o</sup> C for the determination of N-nitrosoglyphosate (NNG) should be provided
- The shelf life study of 4 years should be provided with physical, chemical and technical properties of the PPP (Stability after storage for other periods and/or temperatures).
- A monitoring of the relevant impurity NNG content, in the formulation during a long term storage stability study, with a validated method with a LOQ in accordance with the maximum limit concentration of NNG in the formulation should be provided (Ambient temperature shelf life).
- Τα απαιτούμενα επιβεβαιωτικά πειράματα υπολειμμάτων για το βαμβάκι που προκύπτουν από την αξιολόγηση.

**B** Για τα αποθέματα με ετικέτα σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 11215/123391/06.12.2016 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, μέχρι την υπογραφή της παρούσας, με την οποία χορηγήθηκε στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) BUGGY BIO (δ.ο. glyphosate οξύ 36% β/ο) η με αριθμό 70190 άδεια διάθεσης στην αγορά, ισχύουν τα παρακάτω:

1. Η τιμολόγηση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τον κάτοχο της έγκρισης προς τα καταστήματα εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων επιτρέπεται για έξι (6) μήνες από την υπογραφή της παρούσας, έως και τις **11.06.2024**.
2. Η πώληση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τα καταστήματα χονδρικής και λιανικής πώλησης επιτρέπεται για δέκα επτά (17) επιπλέον μήνες από την υπογραφή της παρούσας, έως και τις **11.05.2025**.
3. Η χρήση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τους επαγγελματίες χρήστες επιτρέπεται για δεκαοκτώ (18) επιπλέον μήνες από την υπογραφή της παρούσας, έως και **11.06.2025**.
4. Τυχόν αδιάθετες ή μη χρησιμοποιηθείσες ποσότητες μετά από την **11.06.2025**, θα πρέπει να επιστραφούν στον κάτοχο της έγκρισης, για επανεξαγωγή ή καταστροφή, με ευθύνη και δαπάνες αυτού.
5. Στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

**Γ Γενικές υποχρεώσεις**

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει τη ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στη ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα απόφαση και θα πρέπει να προσκομιστεί εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της παρούσης.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στη ΣΕΑ τελική ετικέτα, μόνο ηλεκτρονικά, πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στη ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας»  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

**Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ**