



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 09.01.2024
Αριθ. πρωτ: 230/5687

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Δ. Καραμάνου
Τηλέφωνο: 210 9287225
e-mail: dkaramanou@minagric.gr

Προς: Albaugh TKI d.o.o., Σλοβενίας
(δια του υπεύθυνου επικοινωνίας
της εταιρείας
Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε.
Μιχαλακοπούλου 157, 11527, Αθήνα
e-mail: a.toutoutzidakis@agribiz.gr

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθ. 70385 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) CLOMATE (δ.ο clomazone 36% β/ο), ως προς τη κατηγορία και τρόπο δράσης, το φάσμα δράσης, τις ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί, το χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα, τα στοιχεία φυτοτοξικότητας, τις δηλώσεις προφύλαξης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις:
 - Του ν. 4036/2012 (Α'8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις,
 - Του ν. 2690/1999 (Α'45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 - Του ν. 4622/2019 (Α'133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
- Τους κανονισμούς όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν:
 - Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα τα άρθρα 45 & 33 αυτού.
 - (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16^{ης} Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006
 - (ΕΕ) αριθ. 547/2011 της Επιτροπής της 8^{ης} Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
- Την από 8/2023 Έκθεση Αξιολόγησης της Αρμόδιας Αρχής Αξιολόγησης (ΕΜΠ 2102/11.09.2023)

4. Το αριθμ. 79/27.06.2023 Π.Δ. «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.» (Α'131/27.06.2023).
5. Την αριθμ. 1881/286212/13.10.2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β'4612/19.10.20).
6. Την αριθμ. 863/22499/06.03.2020 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η αριθμ. 70385 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) CLOMATE (δ.ο clomazone 36% β/ο), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
7. Τις αριθμ. 8977/262986/09.09.2022, 12932/379857/14.12.2022, 8574/240875/28.07.2023, 9954/285464/18.09.2023 και 10174/290894/22.09.2023 αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Τροποποιούμε την αριθ. **70385** άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (**ζιζανιοκτόνο**) **CLOMATE (δ.ο clomazone 36% β/ο)**, η οποία χορηγήθηκε με την αριθμ. 863/22499/06.03.2020 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς τη κατηγορία και τρόπο δράσης, το φάσμα δράσης, τις ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί, το χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα, τα στοιχεία φυτοτοξικότητας, τις δηλώσεις προφύλαξης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή.

Τα σημεία **4, 5, 6, 7, 8, 11** και **13** διαμορφώνονται ως εξής:

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Εκλεκτικό προφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων πλατύφυλλων και αγρωστωδών ζιζανίων σε πατάτα, καπνό **και αραβόσιτο**. Απορροφάται από τις ρίζες και τους βλαστούς των ζιζανίων και παρεμποδίζει τη βιοσύνθεση των καροτινοειδών και της χλωροφύλλης.

5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες)
		κ. εκ. / στρ	Όγκος ψεκ. Υγρού λίτρα/στρ		
Πατάτα SOLTU	Καταπολέμηση ετήσιων πλατύφυλλων και αγρωστωδών ζιζανίων	30	20 – 40	Ψεκασμός σε όλη την επιφάνεια του εδάφους, πριν το φύτευμα των πατατόφυτων, έως 7 μέρες μετά την φύτευση	1
Καπνός NIOTA	Καταπολέμηση ετήσιων πλατύφυλλων και αγρωστωδών ζιζανίων	40-50	20-30	Πριν τη φύτευση BBCH 00 ή μετά τη φύτευση BBCH 12-14	1
Αραβόσιτος ZEAMX	Καταπολέμηση ετήσιων πλατύφυλλων και	25-30	20-50	Ψεκασμός σε όλη την επιφάνεια του εδάφους, αμέσως μετά τη	1

	αγρωστωδών ζιζανίων			σπορά έως την έναρξη βλάστησης της καλλιέργειας (BBCH 00-09)	
<p>Παρατηρήσεις:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Εφαρμόζεται προφυτρωτικά των ζιζανίων. 2. Η αποτελεσματικότητα του επηρεάζεται από την εδαφική υγρασία σε περίοδο 2 εβδομάδων από την εφαρμογή του σκευάσματος. Η ξηρασία μπορεί να μειώσει την αποτελεσματικότητα του. Εάν δεν βρέξει 8 – 10 ημέρες μετά την εφαρμογή, συνιστάται πότισμα για να ενεργοποιηθεί το σκεύασμα. 3. Μην το εφαρμόζετε όταν φυσάει. 4. Αποφεύγετε την διασπορά ψεκαστικών σταγονιδίων σε παρακείμενες ευαίσθητες καλλιέργειες. <p><u>Καταπολεμούμενα ζιζάνια για την καλλιέργεια της Πατάτας –</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ευαίσθητα ζιζάνια: Γλυστρίδα (<i>Portulaca oleracea</i>-POROL) Στελλάρια (<i>Stellaria media</i> – STEME) • Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια : Λουβουδιά (<i>Chenopodium album</i> – CHEAL) Μεγαλόκαρπη κολλιτσίδα (<i>Gallium aparine</i> – GALAP) <p><u>Καταπολεμούμενα ζιζάνια για την καλλιέργεια του Καπνού –</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια: Λουβουδιά(<i>Chenopodium album</i> – CHEAL) Αιματόχορτο (<i>Digitaria sanguinalis</i> - DIGSA) Μουχρίτσα (<i>Echinochloa crus-galli</i> – ECHCG) Αντράκλα (<i>Portulaca oleracea</i> – POROL) <p><u>Καταπολεμούμενα ζιζάνια για την καλλιέργεια του Αραβόσιτου –</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ευαίσθητα ζιζάνια: Αγριοβαμβακιά (<i>Abutilon theophrasti</i> - ABUTH) • Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια: Αμβροσία (<i>Ambrosia artemisiifolia</i> - AMBEL), Αγριοτομάτα (<i>Solanum nigrum</i> - SOLNI) 					

6 Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

Να αποφεύγεται η χρήση του σκευάσματος σε αραβόσιτο που προορίζεται για ζωοτροφή ως χορτονομή, άχυρο ή ενσίρωμα.

Διαχείριση Ανθεκτικότητας

Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική ουσία Clomazone, η οποία ανήκει στην ομάδα 13 κατά HRAC.

Συνιστάται:

1. Η εναλλαγή με ζιζανιοκτόνα που δεν ανήκουν σε αυτή την ομάδα ή/και εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα), προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας.
2. Να μη χρησιμοποιείται αυτό ή άλλα σκευάσματα με τη δραστική ουσία clomazone περισσότερο από μια φορά ανά καλλιεργητική περίοδο.

7 Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας

• Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας στην οποία χρησιμοποιήθηκε το ζιζανιοκτόνο ή σε περίπτωση εφαρμογής σε καλλιέργεια σε διάστημα μικρότερο των 30 ημερών πριν τη συγκομιδή:

Μην φυτέψετε/ σπείρετε καλλιέργειες μικρού βιολογικού κύκλου για 90 ημέρες από την εφαρμογή του σκευάσματος.

• Μπορούν να σπαρούν ή να φυτευτούν, μετά από βαθύ όργωμα 25 εκ., τα ακόλουθα: μετά από 6 εβδομάδες αρακάς, φασόλια, πατάτα, καρότα, ζαχαρότευτλα, κρεμμύδι, λινάρι, γογγύλια.

- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν

Λόγω της διάρκειας δράσης του σκευάσματος στο έδαφος, θα πρέπει να ακολουθούνται οι κάτωθι οδηγίες σε περίπτωση αμειψισποράς:

Μετά από φρεζάρισμα 8 – 10 εκ.

1 μήνα μετά την εφαρμογή μπορούν να σπαρθούν ελαιοκράμβη, καρότα, λάχανο, κολοκυθάκια, φασόλια πράσινα/λευκά, πεπόνι, μπιζέλια-αρακάς, πιπεριά, πατάτα.

4 μήνες μετά την εφαρμογή μπορούν να σπαρθούν: τα ανωτέρω και σιτηρά, φασόλια, γογγύλια.

10 μήνες μετά την εφαρμογή μπορούν να σπαρθούν: τα ανωτέρω και ζαχαρότευτλα, σπανάκι.

Μετά από βαθύ όργωμα 25 εκ.

1 μήνα μετά την εφαρμογή μπορούν να σπαρθούν: καρότα, σπανάκι, ζαχαρότευτλα, λάχανο, ελαιοκράμβη, κολοκύθα, κολοκυθάκια, φασόλια, λινάρι, λούπινα, αραβόσιτος, πεπόνι (μεταφύτευση), γογγύλια, κρεμμύδι, κρεμμύδι (σπορόφυτα), μπιζέλια-αρακάς, πατάτα, μαρούλι, σόγια, καπνό, τομάτα, ηλιάνθο.

4 μήνες μετά εφαρμογή μπορούν να σπαρθούν: τα ανωτέρω και σιτηρά.

- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

Μην εισέρχετε στην ψεκασμένη περιοχή πριν στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό υγρό.

8 Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους

Δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις. Μπορεί να παρατηρηθούν παροδικά συμπτώματα φυτοτοξικότητας (αποχρωματισμός), που δεν επηρεάζουν την ανάπτυξη ή την απόδοση των καλλιεργειών.

Να μην γίνεται χρήση του σκευάσματος σε αμμώδη εδάφη λόγω κινδύνου φυτοτοξικότητας στην καλλιέργεια του αραβόσιτου.

11 Δηλώσεις
προφύλαξης

P405 + P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.
P270: Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.

Φοράτε ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία και γάντια κατά τη ανάμιξη/φόρτωση και κατά την εφαρμογή.

Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια.

P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Sr1: Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα.

SPe3: Για να προστατέψτε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μίαν αφέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα.

SPe3: Για να προστατέψτε τα φυτά μη στόχους να αφήσετε μίαν αφέκαστη ζώνη προστασίας από μη γεωργική γη:

- 5 μέτρων στη καλλιέργεια της πατάτας
- 10 μέτρων ή 5 μέτρων σε συνδυασμό με την χρήση ακροφύσιων μείωσης της διασποράς κατά 50% ή χρησιμοποιείτε ακροφύσια μείωσης της διασποράς κατά 90% στη καλλιέργεια του καπνού
- **5 μέτρων ή χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά 75% στη καλλιέργεια του αραβόσιτου.**

13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή

Καλλιέργεια	Ημέρες
Πατάτα (0211000), Καπνός	Καθορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του σκευάσματος.
Αραβόσιτος (0500030)	Καθορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του σκευάσματος.

- II. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 863/22499/06.03.2020 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ