



## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 15.01.2024  
Αριθ. πρωτ: 13400/374055ΠΕ

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
Πληροφορίες: Δ. Μακρογιάννη  
Τηλέφωνο: 210 9287160  
e-mail: [dmakrogianni@minagric.gr](mailto:dmakrogianni@minagric.gr)

Προς: Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S,  
Γαλλίας  
(Δια της ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε.)  
e-mail: [info@hellafarm.gr](mailto:info@hellafarm.gr)

**ΘΕΜΑ:** «Διεύρυνση της αριθμ. 14562 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) ADMIRAL 10 EC (pyriproxyfen 10% β/ο) σε ήσσονος σημασίας χρήσεις»

## ΑΠΟΦΑΣΗ

## Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις:
  - Του ν. 4036/2012 (Α'8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  - Του ν. 2690/1999 (Α'45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
  - Του ν. 4622/2019 (Α'133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
- Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 51 αυτού.
- Το αριθμ. 79/27.06.2023 Π.Δ. «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.» (Α'131/27.06.2023).
- Την αριθμ. 10088/115732/26.09.2013 Υπουργική απόφαση (Β'2587) σχετικά με την «Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσονος σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσονος σημασίας».
- Την αριθμ. 1881/286212/13.10.2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β'4612/19.10.20).
- Το αριθμ. 12862/330936/07.12.2020 έγγραφο της Υπηρεσίας με θέμα «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά».
- Την αριθμ. 3559/41056/05.04.2016 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η αριθμ. 14562 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) ADMIRAL 10 EC (pyriproxyfen 10% β/ο), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

8. Την αριθμ. 13400/374055/05.12.2023 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Διευρύνουμε την αριθμ. 14562 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) ADMIRAL 10 EC (ργιγίροχυφεν 10% β/ο), που χορηγήθηκε με την αριθμ. 3559/41056/05.04.2016 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε ήσσονος σημασίας χρήσεις.

Το σημείο 5 διαμορφώνεται ως εξής:

5 Φάσμα δράσης						
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μεγ. αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο
		κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ	κ.εκ./στρέμμα (μέγιστο)		
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ Πορτοκαλιά Μανταρινιά Λεμονιά Φράπα Γκρέιπφρουτ Άλλα είδη	Κοκκοειδή (π.χ. <i>Saissetia oleae</i> , <i>Lepidosaphes beckii</i> , <i>Insulaspis gloverii</i> , <i>Aonidiella aurantii</i> , <i>Aspidiotus nerii</i> , <i>Parlatoria pergandei</i> )	35-75	200-300	225	Με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφικών σταδίων κατά προτίμηση της 1ης γενιάς	1
ΜΗΛΟΕΙΔΗ Μηλιά Αχλαδιά	Κοκκοειδή ( <i>Quadraspidiotus perniciosus</i> , <i>Quadraspidiotus pyri</i> , <i>Quadraspidiotus</i> spp., <i>Pseudococcus</i> sp., <i>Pseudaulacaspis pentagona</i> , <i>Lepidosaphes ulmi</i> , <i>Epidiaspis leperii</i> )	30	80-100	30	Πριν την άνθηση, με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφικών σταδίων κατά προτίμηση της 1ης γενιάς	1
Ροδακινιά Δαμασκηινιά	Κοκκοειδή ( <i>Quadraspidiotus perniciosus</i> , <i>Pseudaulacaspis pentagona</i> , <i>Eulecanium</i> sp., <i>Eulecanium persicae</i> , <i>Epidiaspis leperii</i> )	30	80-100	30	Με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφικών σταδίων κατά προτίμηση της 1ης γενιάς	1

Βερικοκιά Κερασιά Άλλα είδη πυρηνοκάρπων	Κοκκοειδή ( <i>Quadraspidiotus perniciosus</i> , <i>Pseudaulacaspis pentagona</i> , <i>Eulecanium</i> sp., <i>Eulecanium persicae</i> , <i>Epidiaspis leperii</i> )	30	80-100	30	Πριν την άνθηση, με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφικών σταδίων κατά προτίμηση της 1ης γενιάς	1
ΑΚΡΟΔΡΥΑ Αμυγδαλιά (PRNDU) Καρυδιά (NUTSS) Φιστικιά (PIAVE) Καστανιά (CSNSA)  Χρήσεις ήσσονος σημασίας	Κοκκοειδή ( <i>Pseudaulacaspis pentagona</i> (PSEAPE), <i>Quadraspidiotus perniciosus</i> (QUADPE), <i>Quadraspidiotus</i> sp. (QUADSP), <i>Eulecanium persicae</i> (LECAPE), <i>Eulecanium</i> sp. (EULCSP), <i>Sphaerolecanium prunastri</i> (LECAPN), <i>Epidiaspis leperii</i> (EPIDBE), <i>Lepidosaphes ulmi</i> (LEPSUL), <i>Aspidiotus nerii</i> (ASPDNE), <i>Saissetia oleae</i> (SAISOL])	30	80-100	30	Πριν την άνθηση, με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφικών σταδίων κατά προτίμηση της 1ης γενιάς	1
Ελιά	Λεκάνιο <i>Saissetia oleae</i>  <sup>6</sup> <u>Χρήση Ήσσονος Σημασίας:</u> <b><i>Euphyllura olivina</i></b> <b>EUPHOL</b>	30	100-125	37,5	Πριν την άνθηση, και εφόσον εμφανιστούν οι προνύμφες της 1ης γενιάς <sup>(3)</sup>	1
Αμπέλι	Κοκκοειδή ( <i>Pulvinaria vitis</i> , <i>Planococcus citri</i> <i>Planococcus ficus</i> <i>Patthenolecanium corni</i> <i>Heliooccus bohemicus</i> )	50-75	40-80	60	Πριν την άνθηση, με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφικών σταδίων κατά προτίμηση της 1ης γενιάς	1
Τομάτα, Μελιτζάνα υπαίθρου & θερμοκηπίου	Αλευρώδεις <i>Trialeurodes vaporariorum</i> , <i>Bemisia tabaci</i>	50	100-150	75	Με την εμφάνιση των πρώτων ακμαίων <sup>(2)</sup>	2 (1)

Πιπεριά θερμοκηπίου	Αλευρώδεις <i>Trialeurodes vaporariorum</i> , <i>Bemisia tabaci</i>	50	100-150	75	Με την εμφάνιση των πρώτων ακμαίων <sup>(2)</sup>	2 (1)
Αγγούρι, Αγγουράκι, Κολοκυθάκι θερμοκηπίου	Αλευρώδεις <i>Trialeurodes vaporariorum</i> , <i>Bemisia tabaci</i>	50	100-150	75	Με την εμφάνιση των πρώτων ακμαίων <sup>(2)</sup>	2 (1)
Φράουλα θερμοκηπίου	Αλευρώδεις <i>Trialeurodes vaporariorum</i> , <i>Bemisia tabaci</i>	25-30	80-100	25	Με την εμφάνιση των πρώτων ακμαίων <sup>(2)</sup>	2/8 μέρες
Βαμβάκι	Αλευρώδεις <i>Bemisia tabaci</i>	Βλπ δόση ανά στρέμμα	40-80	50	Πριν το άνοιγμα των καρυδιών και με την εμφάνιση των πρώτων ακμαίων	1
Καλλωπιστικά φυτά (ανθοφόρα & σε γλάστρα) Τριανταφυλλιά Δέντρα, θάμνοι	Κοκκοειδή	50-75	100-200	50-112,5	Με την εμφάνιση των πρώτων προנוμφικών σταδίων κατά προτίμηση της 1ης γενιάς	1
Καλλωπιστικά φυτά (ανθοφόρα & σε γλάστρα) Τριανταφυλλιά Δέντρα, θάμνοι	Αλευρώδεις <i>Trialeurodes vaporariorum</i> , <i>Bemisia tabaci</i>	50-75	100-200	50-112,5	Με την εμφάνιση των πρώτων ακμαίων <sup>(2)</sup>	2/14 μέρες
ΠΕΥΚΑ <sup>4</sup> αστικών και περιαστικών περιοχών	<i>Marchalina hellenica</i>	75	Καλή διαβροχή	-	Όταν έχει εκκολαφθεί το 70- 75% των νυμφών (ερπυσών) και όταν τα πεύκα δεν έχουν μελιτώδη εκκρίματα και δεν παρατηρείται δραστηριοποίηση των μελισσών <sup>(4)</sup>	1 (με την προϋπόθεση ότι την ίδια περίοδο δεν θα χρησιμοποιηθεί για τον ίδιο σκοπό άλλο φ.π.)

## Παρατηρήσεις:

- Μεσοδιάστημα επεμβάσεων 10 ημέρες όταν η θερμοκρασία είναι μεγαλύτερη των 25°C και 15 ημέρες όταν είναι μικρότερη.
- Σε περίπτωση που ο πληθυσμός των ακμαίων αλευρωδών είναι σε υψηλά επίπεδα, συνιστάται να προηγηθεί η χρήση κατάλληλου ακμαιοκτόνου ώστε να μειωθεί ο πληθυσμός πριν την εφαρμογή του ADMIRAL 10 EC.
- Στην ελιά εμφανίζει δευτερεύουσα δράση κατά της *Parlatoria oleae*.
- Για τη χρήση σε πεύκα πρέπει να εφαρμόζονται οι ακόλουθες οδηγίες, απαγορεύσεις, περιορισμοί:
  - Ο ακριβής χρόνος επέμβασης θα προσδιορίζεται από τους γεωπόνους των δήμων και κοινοτήτων ή της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης ή άλλης κρατικής υπηρεσίας.
  - Τρόπος εφαρμογής: ψεκασμός, με καλή διαβροχή, των προσβεβλημένων από το *Marchallina hellenica* μερών των πεύκων. Η εφαρμογή του σκευάσματος θα γίνεται παρουσία γεωπόνου.
  - Απαγορεύσεις:

Απαγορεύεται η εφαρμογή του σε δασικά οικοσυστήματα.

Απαγορεύεται η εφαρμογή του σε πεύκα που έχουν μελιτώδη εκκρίματα και όταν παρατηρείται δραστηριοποίηση των μελισσών.

Το σκεύασμα να μην εφαρμοστεί κοντά σε λίμνες, ποτάμια και γενικά υδάτινο περιβάλλον.

- Περιορισμοί προφυλάξεις:

Πριν την εφαρμογή του σκευάσματος σε κοινόχρηστους χώρους, οι δήμοι υποχρεούνται να προειδοποιούν τους κατοίκους για τον επικείμενο ψεκασμό.

Οι δήμοι να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για την επισήμανση των περιοχών όπου έγινε εφαρμογή.

Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του σκευάσματος (τόσο σε κοινόχρηστους όσο και σε ιδιωτικούς χώρους) και ως ότου στεγνώσουν τα ψεκασθέντα μέρη των πεύκων, να μην εισέρχονται άνθρωποι (πλην του ψεκαστή) και κατοικίδια ζώα στην ψεκαζόμενη περιοχή. Σε κοινόχρηστους χώρους (πάρκα, σχολεία) απαιτείται διάστημα 24 ωρών για την είσοδο των ανθρώπων.

Η χρήση του σκευάσματος για την αντιμετώπιση του εντόμου *Marchallina hellenica* σε πεύκα αστικών και περιαστικών περιοχών, θα πραγματοποιείται:

α. Σε κοινόχρηστους χώρους, με ευθύνη των κατά τόπους δήμων και κοινοτήτων, οι οποίοι θα καθορίσουν την ακριβή ημερομηνία εφαρμογής του σκευάσματος και θα λάβουν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα προφύλαξης για την ασφαλή χρήση του. β. Σε ιδιωτικούς χώρους (αυλές σπιτιών, οικόπεδα κλπ) με ευθύνη των ενδιαφερόμενων.

Η εφαρμογή θα διενεργείται τον χρόνο που γίνεται εφαρμογή στους κοινόχρηστους χώρους της περιοχής.

Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω χώρων, να συνεργάζονται με τους υπεύθυνους των δήμων που επιβλέπουν την εφαρμογή του σκευάσματος στους κοινόχρηστους χώρους της περιοχής και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις τους.

5. Για τις χρήσεις ήσσονος σημασίας στις καλλιέργειες της αμυγδαλιάς, της καρυδιάς, της φιστικιάς και της καστανιάς, δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις συγκεκριμένες καλλιέργειες από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.
6. **Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα κατά του *Euphyllura olivina* στην καλλιέργεια της ελιάς από τη χρήση του σκευάσματος. Για τη χρήση αυτή, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα από την εφαρμογή του σκευάσματος.**

## II. Διάθεση αποθεμάτων

1. Η ετικέτα του σκευάσματος να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
2. Για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, επιτρέπεται η τοποθέτηση στις συσκευασίες του σκευάσματος της μέχρι σήμερα ισχύουσας ετικέτας.
3. Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις συσκευασίες του σκευάσματος θα τοποθετείται υποχρεωτικά η νέα τροποποιημένη ετικέτα.

- III. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 3559/41056/05.04.2016 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Γεωργίας»  
 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ