



## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 26.01.2024  
Αριθ. πρωτ: 564/13827

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
Πληροφορίες: Δ. Καραμάνου  
Τηλέφωνο: 210 92 87 225  
e-mail: [dkaramanou@minagric.gr](mailto:dkaramanou@minagric.gr)

Προς: Sharda Cropchem España S.L., Ισπανίας  
(δια μέσω του υπευθύνου επικοινωνίας  
της εταιρείας κ. Παναγιώτης Σπαράγγης  
Φλέμινγκ 69, 18452 Νίκαια)  
e-mail: [p.sparangis@shardaintl.com](mailto:p.sparangis@shardaintl.com)

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) PREFER (δ.ο. propraquizafor 10% β/ο)»

## ΑΠΟΦΑΣΗ

## Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις:
  - του ν. 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
  - του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α' 45).
  - του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
- Τους κανονισμούς όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν:
  - Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 33 αυτού.
  - (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006
  - (ΕΕ) αριθ. 547/2011 της Επιτροπής της 8<sup>ης</sup> Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
  - (ΕΕ) αριθ. 2023/1757 της 11ης Σεπτεμβρίου 2023 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών ... **propraquizafor...**
  - Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Την αριθμ. 5163/145140/30.05.2022 Εγκύκλιο της Υπηρεσίας με θέμα «Χορήγηση κατάλογου των εκθέσεων δοκιμών και μελετών ενός φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ΦΠΠ)».
- Την από 6/2022 σχετική Έκθεση Αξιολόγησης του ΜΦΙ (ΕΜΠ 894/23.06.2022) και την αριθμ. 564/13827/16.01.2024 συμπληρωματική εισήγηση του ΜΦΙ (ΕΜΠ 3910/20.12.2023).

5. Το αριθμ. 79/2023 Π.Δ. “Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών” (Α’131/27.06.2023).
6. Την αριθ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού “Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση” (Β’4612/19-10-20).
7. Τις αρ. πρωτ. 3242/91696/02.04.2021, 6768/196280/11.07.2022 και 416/10433/12.01.2024 αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

**A** Χορηγούμε άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 33 του Κανονισμού 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) **PREFER (δ.ο propraquizafor 10% β/ο)**, της εταιρείας **Sharda Cropchem España S.L., Ισπανίας**, με τα ακόλουθα στοιχεία:

#### **1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος**

##### **Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)**

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης:

1.1.β Ημερομηνία λήξης:

**70523**

**26.01.2024**

**28.02.2028**

##### **1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν**

1.2.α Εμπορικό όνομα:

1.2.β Μορφή:

**PREFER**

Υγρό γαλακτωματοποιήσιμο (EC)

##### **1.3 Δραστικές ουσίες**

###### **Δραστική ουσία 1**

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO:

**propraquizafor**

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

98 % (β/β) min

Χημική ομάδα:

Αρυλοξυφαινοξυαλκανοϊκά οξέα

Παρασκευαστής της δ.ο. :

###### **SHARDA CROP CHEM LIMITED**

2nd floor, Prime Business Park

Dashrathlal Joshi Road

Vile Parle (West)

Mumbai – 400056, Ινδία

Tel.: +91 22 5678 2800

Fax: +91 22 5678 2828/ 2808

E-mail: [regn@shardaintl.com](mailto:regn@shardaintl.com)

[Shardaint@vsnl.com](mailto:Shardaint@vsnl.com)

Με Εκπρόσωπο στην Ευρώπη

**Sharda Cropchem España S.L.**

Edificio Atalayas Business Center,

Carril Condomina nº 3, 12th Floor,

30006 Murcia, Ισπανία

e-mail: [regn@shardaintl.com](mailto:regn@shardaintl.com)

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:

**Jingbo Agrochemicals Technology Co., Ltd.**

Economic Development Zone, Boxing County, Shandong province, 256500, Κίνα

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας προσδιορίζονται στη με αριθ. πρωτ. 3242/91696/02.04.2021 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και προσδιορίζονται στο PART C της σχετικής Έκθεσης Αξιολόγησης του ΜΦΙ, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.

**1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα**

α) Κάτοχος της άδειας:

**Sharda Cropchem España S.L.**

Edificio Atalayas Business Center,  
Carril Condomina nº 3, 12th Floor,  
30006 Murcia, Ισπανία

α) Υπεύθυνος επικοινωνίας:

**Παναγιώτης Σπαράγγης**

Φλέμινγκ 69, 184 52 Νίκαια, Αττική  
Τηλ: 6979 254969  
e-mail: [p.sparangis@shardaintl.com](mailto:p.sparangis@shardaintl.com)

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

**SHARDA BALKAN ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.**

Μοναστηρίου 9,  
54627, Θεσσαλονίκη  
Τηλ.: 2310 521045  
E-mail: [athinasarakini@gmail.com](mailto:athinasarakini@gmail.com)

Σε περίπτωση μελλοντικής τροποποίησης της παρούσας άδειας ως προς το εν λόγω σημείο, ο ανωτέρω υπεύθυνος διάθεσης θα έχει και την ευθύνη για τα υπάρχοντα αποθέματα του σκευάσματος που παρήχθησαν ή/και κυκλοφόρησαν στην ελληνική αγορά μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής απόφασης τροποποίησης. Για τις ποσότητες του σκευάσματος που θα παραχθούν και θα κυκλοφορήσουν στην αγορά από την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης τροποποίησης και μετά, την ευθύνη θα φέρει ο νέος υπεύθυνος διάθεσης.

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

**SHARDA CROPCHEM LIMITED**

2nd floor, Prime Business Park  
Dashrathlal Joshi Road  
Vile Parle (West)  
Mumbai – 400056, Ινδία  
Tel.: +91 22 5678 2800  
Fax: +91 22 5678 2828/ 2808  
E-mail: [regn@shardaintl.com](mailto:regn@shardaintl.com) , [Shardaint@vsnl.com](mailto:Shardaint@vsnl.com)

δ) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

**1. Chemark Kft.**

Industrial Zone, H-8182 Peremarton-gyartelep, Ουγγαρία

2. **I.R.C.A. SERVICE S.p.A.**  
24040 Fornovo San Giovanni (BG), Ιταλία
3. **SPACHEM S.L.**  
Pol. Ind. Guadasequies, s/n – 46839 Guadasequies (Valencia), Ισπανία
4. **LERIDA UNIÓN QUÍMICA S.A. (LUQSA)**  
C/ Afueras, s/n - 25173, Sudanell, (Lleida), Ισπανία
5. **Jingbo Agrochemicals Technology Co., Ltd.**  
Economic Development Zone, Boxing County, Shandong province, 256500, Κίνα

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος:

- Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:
1. **Chemark Kft.**  
Industrial Zone, H-8182 Peremarton-gyartelep, Ουγγαρία
  2. **I.R.C.A. SERVICE S.p.A.**  
24040 Fornovo San Giovanni (BG), Ιταλία
  3. **SPACHEM S.L.**  
Pol. Ind. Guadasequies, s/n – 46839 Guadasequies (Valencia), Ισπανία
  4. **LERIDA UNIÓN QUÍMICA S.A. (LUQSA)**  
C/ Afueras, s/n - 25173, Sudanell, (Lleida), Ισπανία
  5. **Jingbo Agrochemicals Technology Co., Ltd.**  
Economic Development Zone, Boxing County, Shandong province, 256500, Κίνα
  6. **ΝΙΤΡΟΦΑΡΜ Α.Ε.,**  
Οικ. Τετρ. 20 Β 35, 57400, ΣΙΝΔΟΣ – Θεσσαλονίκη
  7. **ΦΑΡΜΑΧΗΜ ΑΒΕΕ**  
ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδος, Θεσσαλονίκη
  8. **ΑΓΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΟΒΕΕ**  
ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης (Σίνδου) (Τ.Θ. 1112)  
ΑΜΕ: 102 / Υπ. Γεωργίας (1896/90/ Πολεοδομία Θεσσαλονίκης) Τ.Κ. 570 22
  9. **ΠΡΟΦΑΡΜ Α.Ε.Β.Ε.**  
ΒΙ.ΠΕ.Θ, Σίνδος Τ.Θ. 1500, Τ.Κ.: 57022, Θεσσαλονίκη
  10. **ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΑΒΕΕ**  
80ο χλμ Αθηνών-Λαμίας, Ύπατο Βοιωτίας,  
Τ.Θ. 1315, 32200, Θήβα, Βοιωτία, Ελλάδα
  11. **Σ.Ε.Γ.Ε. Α.Β.Ε.Ε.**  
Θέση Μαδάρω, Οινόφυτα Βοιωτίας
  12. **ΑΓΡΟΛΟΓΥ ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΒΕΕ**  
ΒΙ.ΠΕ.Θ, ΣΙΝΔΟΣ, Τ.Θ. 1089, Τ.Κ. 570 22, Θεσσαλονίκη
  13. **ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ,**  
Τ.Θ. 58 Θέση Ξηροπήγαδο, Μάνδρα Αττικής,  
Τ.Κ. 196 00
  14. **ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε.**  
Αγ. Ιωάννης, 35300, Στυλίδα Φθιώτιδας
  15. **TECHNOFARM SA**  
ΒΙ.ΠΕ. Νέα Σάντα, 61100, Κιλκίς
  16. **MAGMA AGRO SA**  
Θέση Ποταμιά, Οινόφυτα Βοιωτίας

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

**Δραστικές ουσίες:** propraquizafor 10 % β/ο  
**Βοηθητικές ουσίες:** 90,1 % β/β

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως κατατέθηκε στην αριθμ 3242/91696/02.04.2021 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και προσδιορίζεται στο PART C της σχετικής Έκθεσης Αξιολόγησης του ΜΦΙ, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

## 2 Συσσκευασίες:

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1.	Φιάλες ή Δοχεία	50 κ.εκ. έως 20 λίτρα	COEX (HDPE/EVOH)
2.	Φιάλη μέσα σε κουτί	50 κ.εκ. έως 500 κ.εκ.	COEX (HDPE/EVOH) Κουτί χάρτινο

## 3 Οδηγίες χρήσης:

**Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.**

**Τρόπος εφαρμογής:** Μεταφυτρωτικός ψεκασμός του φυλλώματος των ζιζανίων με μπεκ τύπου σκούπας και πίεση μικρότερη από 45 psi (2-3 atm).

**Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:** Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Προσθέστε τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος, αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς μέχρι να ολοκληρωθεί η εφαρμογή.

### Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:

Αμέσως μετά την εφαρμογή αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε σχολαστικά το βυτίο και όλα τα μέρη του ψεκαστικού με νερό αφαιρώντας όλα τα ορατά υπολείμματα και ξεπλύνετε τρεις φορές με καθαρό νερό.

### Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

**Συνδυαστικότητα:** -

## 4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Διασυστηματικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων και πολυετών αγρωστωδών ζιζανίων. Απορροφάται από τα φύλλα και μεταφέρεται στις ρίζες, στους στόλωνες και στα ριζώματα των ζιζανίων. Δρα παρεμποδίζοντας τη καρβοξυλάση του ακετυλο-CoA κατά την βιοσύνθεση λιπαρών οξέων.

Τα ψεκασμένα ζιζάνια σταματούν να αναπτύσσονται 1 – 2 ημέρες μετά την εφαρμογή. Τα νεότερα φύλλα γίνονται κίτρινα και το χαμηλότερο μέρος των βλαστών νεκρώνεται. Τελικά όλο το ζιζάνιο καταστρέφεται μέσα σε 10 – 20 ημέρες, ανάλογα με τις κλιματικές συνθήκες

**5 Φάσμα δράσης**

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/ καλλιεργητική περίοδο
		κ.εκ. σκ./στρ.	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/ στρέμμα		
<b>Τομάτα (Υ)</b> LYPES	Ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια*	75-120	30-40	Μεταφυτρωτικά της καλλιέργειας. Εφαρμογή από την έκπτυξη του δευτέρου φύλλου της καλλιέργειας έως την έκπτυξη της 9 <sup>ης</sup> ταξιανθίας (BBCH 12-59), και όταν τα ζιζάνια βρίσκονται από το στάδιο των 2-3 φύλλων έως πριν το αδελφωμα των ζιζανίων (BBCH 20)	1
<b>Βαμβάκι</b> GOSHI	Ετήσια και πολυετή αγρωστώδη ζιζάνια*	75 – 120	20-60	Μεταφυτρωτικά της καλλιέργειας. Εφαρμογή από την έκπτυξη του δευτέρου φύλλου της καλλιέργειας έως το κλείσιμο των γραμμών κατά 90% (BBCH 12-39), και όταν τα <u>ετήσια ζιζάνια</u> βρίσκονται από το στάδιο των 2-3 φύλλων έως την έναρξη της προέκτασης του. ή	1
		150-200		όταν τα <u>πολυετή ζιζάνια</u> έχουν το ύψος 15-20 cm. ή	
		100-150		για το <u>Βέλιουρα</u> ( <i>Sorghum halepense</i> ): όταν το ύψος των ζιζανίων είναι 30-40 cm	
<b>Πατάτα</b> SOLTU	Ετήσια και πολυετή αγρωστώδη ζιζάνια*	75-120	20-60	Μεταφυτρωτικά της καλλιέργειας. Εφαρμογή από την έκπτυξη του δευτέρου φύλλου της καλλιέργειας έως πριν την άνθηση (BBCH 12-59) και:  όταν τα <u>ετήσια ζιζάνια</u> βρίσκονται από το στάδιο των 2-3 φύλλων έως την έναρξη	1

				επιμήκυνσης του στελέχους των ζιζανίων, ή	
		150		όταν τα <u>πολυετή ζιζάνια</u> έχουν ύψος 15-20 cm. ή	
		100 -150		για το <u>Βέλιουρα</u> ( <i>Sorghum halepense</i> ): όταν το ύψος των ζιζανίων είναι 30-40 cm	
<b>Ζαχαρότευτλα</b> ΒΕΑΒΑ	Ετήσια και πολυετή αγρωστώδη ζιζάνια*	75-120	20-60	Μεταφυτρωτικά της καλλιέργειας. Εφαρμογή από την έκπτυξη του δευτέρου φύλλου της καλλιέργειας έως όταν τα φύλλα να καλύπτουν το 50% του εδάφους (BBCH 12-35) και:  όταν τα <u>ετήσια ζιζάνια</u> βρίσκονται από το στάδιο των 2-3 φύλλων έως την έναρξη επιμήκυνσης του στελέχους των ζιζανίων ή	1
		150-200		όταν τα <u>πολυετή ζιζάνια</u> έχουν ύψος 15-20 cm. ή	
		100-150		για το <u>Βέλιουρα</u> ( <i>Sorghum halepense</i> ): όταν το ύψος των ζιζανίων είναι 30-40 cm	
<b>Καπνός</b> ΝΙΟΤΑ	Ετήσια και πολυετή αγρωστώδη ζιζάνια*	75-120	20-60	Μεταφυτρωτικά της καλλιέργειας. Εφαρμογή από την έκπτυξη του δευτέρου φύλλου της καλλιέργειας έως το κλείσιμο των γραμμών κατά 90% (BBCH 12-39) Και όταν τα <u>ετήσια</u> <u>ζιζάνια</u> βρίσκονται από το στάδιο των 2-3 φύλλων έως την έναρξη επιμήκυνσης του στελέχους των ζιζανίων ή	1

		150-200		όταν τα <u>πολυετή ζιζάνια</u> έχουν ύψος 15-20 cm. ή
		100-150		για το <u>Βέλιουρα</u> ( <i>Sorghum halepense</i> ): όταν το ύψος των ζιζανίων είναι 30-40 cm

Παρατηρήσεις:

1) Η δόση εφαρμογής κυμαίνεται ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης των ζιζανίων.

**\*Καταπολεμούμενα ζιζάνια:**

**Ετήσια αγρωστώδη**

*Alopecurus myosuroides* (Αλεπονουρά) ALOMY

*Avena fatua*, *A. sterilis*- (Αγριοβρώμη μεγάλη και μικρή ) AVEFA, AVEST

*Bromus sp.* (Βρώμοι) BROSS

*Digitaria sanguinalis* (Αιματόχορτο) DIGSA

*Echinochloa crus-galli* (Μουχρίτσα) ECHCG

*Eleusine indica* (Ελευσίνη) ELEIN

*Hordeum sp.* (αγριοκρίθαρο) HORSS

*Lolium sp* (Ήρες) LOLSS

*Phalaris sp.* (Φαλαρίδες) PHASS

*Setaria sp.* (Σετάριες) SETSS

*Sorghum halepense* (Βέλιουρας από ριζώματα) SORHA

**Πολυετή ζιζάνια**

*Agrostis sp.* (Άγρωστης) AGSSS

*Cynodon dactylon* (Αγριάδα) CYNDA

*Agropyron/Elymus repens* (Αγρόπυρο/Ελυμος) AGRRE

*Poa trivialis* (Τραχεία λειβαδοπόα) POATR,

*Poa pratensis* (λεία λειβαδοπόα) POAPR

**6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

- Η εφαρμογή να γίνεται με κατευθυνόμενο ψεκασμό στο φύλλωμα των ζιζανίων. Συνιστάται η χρήση κάλυπτρου για την αποφυγή ψεκασμό πάνω στα βρώσιμα τμήματα των καλλιεργειών.
- Τα παραγόμενα προϊόντα να μην χρησιμοποιούνται για ζωοτροφή

**Διαχείριση ανθεκτικότητας**

Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική *proprazifor*, η οποία ανήκει στην **ομάδα 1** κατά HRAC. Συνιστάται η εναλλαγή με ζιζανιοκτόνα που δεν ανήκουν σε αυτή την ομάδα ή/και εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα), προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας.

**7** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:  
- σποράς ή φύτευσης της προσ-  
τατευόμενης καλλιέργειας:

---

- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν

Μην σπέρνετε **σιτάρι/κριθάρι/σίκαλη** και αραβόσιτο πριν περάσουν 10 εβδομάδες από την εφαρμογή του σκευάσματος.



Μην σπέρνετε **βρώμη** πριν περάσουν 16 εβδομάδες από την εφαρμογή του σκευάσματος  
Μην σπέρνετε **μιζέλι, φασόλι, ελαιοκράμβη** πριν περάσουν 4 εβδομάδες από την εφαρμογή του σκευάσματος


- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

Μην εισέρχετε στη ψεκασμένη καλλιέργεια πριν στεγνώσει εντελώς το ψεκαστικό υγρό από την φυλλική επιφάνεια.

**8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Το προϊόν όταν εφαρμόζεται στις προτεινόμενες καλλιέργειες και στις συνιστώμενες δόσεις δεν είναι φυτοτοξικό.

**9** Εικονογράμματα κινδύνου:



**10** Δηλώσεις επικινδυνότητας:

**H304:** Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.  
**H351:** Υποπτο για πρόκληση καρκίνου.  
**H411:** Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.  
**EUH066:** Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.  
**EUH208:** Περιέχει propraquizafor. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.  
**EUH401:** Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης  
**Περιέχει αρωματικό διαλυτή νάφθα και 1,2-propanediol carbonate**

**11** Δηλώσεις προφύλαξης

**P102+P405:** Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά  
**P270:** Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.  
**P201:** Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση  
**P280:** Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο  
**P501:** Διάθεση του περιεχομένου / περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

*Φοράτε γάντια και ολόσωμη φόρμα εργασίας κατά την ανάμιξη/φόρτωση και κατά την εφαρμογή του σκευάσματος.*

*Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό φοράτε μακρυμάνικο πουκάμισο και μακρύ παντελόνι. Συστήνεται η χρήση γαντιών.*

**Sp1:** Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα/ Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω του συστήματος αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.

**SPe 3** Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας **5 μέτρων** από μη γεωργική ή χρησιμοποιήσετε ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους **κατά 75%**.

## 12 Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο

**P308 + P313:** Σε περίπτωση έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

**P301+P310+P331: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ:** Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.

**ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ:** αφαιρέστε τα βρεγμένα ρούχα και πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν προκληθεί ερεθισμός ζητήστε ιατρική συμβουλή.

**ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ:** μεταφέρατε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.

**ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:** Πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό, κρατώντας ανοιχτά τα βλέφαρα. Συμβουλευθείτε οφθαλμίατρο.

**ΑΝΤΙΔΟΤΟ:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε θεραπεία συμπτωματική.

**ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777**

## 13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Καλλιέργειες	Ημέρες
Τομάτα (Υ) (0231010)	30
Πατάτα (0211000), Καπνός	40
Ζαχαρότευτλα (0900010)	45
Βαμβάκι (0401090)	90

## 14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του, όταν αποθηκεύεται, στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο.

**15 Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης**

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

**16 Κατάλογος προστατευόμενων μελετών**

Στο τμήμα Α της έκθεσης αξιολόγησης καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

**17 Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών**

Ο κάτοχος της έγκρισης οφείλει εντός 24 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης να προσκομίσει στην ΣΕΑ τα ακόλουθα :

- Study for the determination of the emulsion properties of the formulation after storage at ambient temperature, at min. and max. concentration of use with Standard water A and D.
- Storage stability of propaquizafop in honey, to validate residue trials with honey (samples stored for maximum 94 days).

**Β Γενικές υποχρεώσεις**

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει τη ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στη ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα απόφαση και θα πρέπει να προσκομιστεί εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της παρούσης.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στη ΣΕΑ τελική ετικέτα, μόνο ηλεκτρονικά, πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στη ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας»  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

**Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ**