



**ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

**Αθήνα, 2 - 3 - 2017
Αριθ. πρωτ: 12988/140761 ΠΕ**

**Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 9212090
Πληροφορίες: Νίκος Παπανικολάου
Τηλέφωνο: 210 9287230
e-mail: npapanikolaou@minagric.gr**

**Προς: AgroFresh Holding France S.A.S.
23-25, avenue Mac-Mahon
75017 Paris, France
(Δια μέσου της
Ευτυχία Ε. Λεφάκη
Σωκράτους 12
176 71 Καλλιθέα)
e-mail: lefakief@otenet.gr**

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 8254 οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (φυτορρυθμιστική ουσία) RipeLock™ Tabs 2.0 (1-methylcyclopropene 2% β/β) ως προς τα μεγέθη συσκευασίας, τις οδηγίες χρήσης, την ταξινόμηση και σήμανση του σκευάσματος και τις πρώτες βοήθειες»

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 45 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Κανονισμό με αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού(ΕΚ) αριθ. 1907/2006.
4. Την υπ' αριθ. 9379/119137/2.11.2015 (ΦΕΚ 2367Β'/4.11.2015) Απόφαση με θέμα "Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα, σε Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων".
5. Την με αριθ. πρωτ. ΥΠΑΑΤ 12988/140761/15-12-2016 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας δια του εκπροσώπου της.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- Ι. Τροποποιούμε την με αριθ. 8254 οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (φυτορρυθμιστική ουσία) RipeLock™ Tabs 2.0 που χορηγήθηκε με την αριθ. πρωτ. 5634/62854/31-5-2016 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς τα μεγέθη συσκευασίας, τις οδηγίες χρήσης, την ταξινόμηση και σήμανση του σκευάσματος και τις πρώτες βοήθειες.

Συγκεκριμένα, τα σημεία 2, 3, 5, 9, 10, 11, 12 και 17 διαμορφώνονται ως εξής:

2 Συσσκευασίες

Το σύστημα/ εφαρμογής του σκευάσματος αυτού αποτελείται από τρία μέρη / συστατικά (τα δισκία του σκευάσματος RipeLock™ Tabs 2.0, τα δισκία του ενεργοποιητή RipeLock™ ProActivators, και το διάλυμα **ενεργοποιητή RipeLock™ Solution**. Στον πίνακα που ακολουθεί περιγράφονται ξεχωριστά:

- 1) Κοινή συσκευασία/ σακούλα που περιέχει α) κίτρινα δισκία του φ.π. και β) δισκία του ενεργοποιητή
- 2) Κοινή συσκευασία/ σακούλα που περιέχει α) ροζ δισκία του φ.π. και β) δισκία του ενεργοποιητή
- 3) Ξεχωριστή συσκευασία/ειδική σακούλα-περιέκτη που περιέχει το διάλυμα **ενεργοποιητή**.

Σημείωση:

Η ετικέτα κάθε ξεχωριστής συσκευασίας θα φέρει την απαιτούμενη επισήμανση. Το ίδιο ισχύει και για τα εξωτερικά χαρτοκιβώτια μεταφοράς / αποθήκευσης αυτών. Στην περίπτωση μεταφοράς / προσωρινής αποθήκευσης από κοινού όλων των συσκευασιών σε μεγάλο κοινό εξωτερικό χαρτοκιβώτιο, η ετικέτα του χαρτοκιβωτίου επιβάλλεται να φέρει την πιο αυστηρή επισήμανση (π.χ. την επισήμανση του διαλύματος ενεργοποιητή **RipeLock™ Solution**, εφόσον συμπεριλαμβάνεται).

| A/A | Είδος | Μέγεθος | Υλικό |
|-----|--|--|---|
| 1 | Σακούλα που περιέχει <u>α) κίτρινα δισκία του φ.π.</u> βάρους 4.2γρ/TB(0,084 γρ. δ.ο) + <u>β) υπόλευκα δισκία του ενεργοποιητή</u> βάρους 1.6 γρ. /TB | Σακούλα 20 * 11,5εκ. που περιέχει: α) 1 έως 20 κίτρινα δισκία του φ.π . (βάρους 4,2 γρ. - 84 γρ.) + β) 40 υπόλευκα δισκία του ενεργοποιητή (βάρους 64 γρ.) Συνολικό βάρος : 68,2 – 148 γρ. | Λευκή επίπεδη πολυστρωματική σακούλα από: PET/White E/ALFoil/PE |
| 2 | Σακούλα που περιέχει <u>α) ροζ δισκία του φ.π.</u> βάρους 0.84 γρ/TB(0,0168 γρ) + <u>β) υπόλευκα δισκία ενεργοποιητή</u> βάρους 1.6 γρ. /TB | Σακούλα 20 * 11,5εκ. που περιέχει: α) 1 έως 25 ροζ δισκία του φ.π . (βάρους 0,84 γρ. έως 21 γρ.) + β) 8 υπόλευκα δισκία του ενεργοποιητή (βάρους 12,8 γρ.) Συνολικό βάρος: 13,64- 33,8 γρ. | Λευκή επίπεδη πολυστρωματική σακούλα από: PET/White E/ALFoil/PE |
| 3 | Ειδική σακούλα /περιέκτης που περιέχει το <u>υδατικό διάλυμα ενεργοποιητή</u> (10% κίτρινο οξύ) | Σακούλα 130*230*80 mm (W*L*G): 200κ.εκ. (χρήση με ροζ δισκία φ.π) Σακούλα 203*290*100 mm(W*L*G): 1 λίτρο (χρήση με κίτρινα δισκία φ.π.) Σακούλα 300*450*160 mm (W*L*G): 4 λίτρα (χρήση με κίτρινα δισκία φ.π.) | Εύκαμπτη πολυστρωματική σακούλα με ενισχυμένο πάτο για να μένει όρθια από : 48PETC-FLEXO INK/ 60BON / 6.0 MIL WHITE LLDPE |

3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

Τρόπος εφαρμογής

Το RipeLock™ Tabs 2.0 εφαρμόζεται με ένα κατοχυρωμένο σύστημα απελευθέρωσης της δραστικής ουσίας, που αποτελείται από τρία (3) μέρη: α) κίτρινα ή/και ροζ δισκία του σκευάσματος RipeLock™ Tabs 2.0 , β) υπόλευκα δισκία του ενεργοποιητή RipeLock™ ProActivators, γ) ειδικό διάλυμα **ενεργοποιητή RipeLock™ Solution**. Συγκεκριμένα τα δισκία του σκευάσματος πρέπει να χρησιμοποιηθούν μαζί με δισκία του ενεργοποιητή αφού διαλυθούν ταυτόχρονα στο ειδικό διάλυμα **ενεργοποιητή**. Το σύστημα αυτό εφαρμόζεται σε αεροστεγείς χώρους συντήρησης που διαθέτουν ανεμιστήρες εσωτερικού αέρα. Ακολουθήστε με προσοχή τις παρακάτω οδηγίες:

1. Πριν από την εφαρμογή βεβαιωθείτε ότι ο θάλαμος εφαρμογής μπορεί να σφραγιστεί ερμητικά και γρήγορα, διαθέτει εσωτερικό σύστημα αερισμού και δεν έχει εμφανείς χαραμάδες ή ρωγμές και δεν υπάρχει πιθανότητα διαρροής του εξατμιζόμενου προϊόντος.
Προετοιμαστείτε να κλείσετε και να σφραγίσετε τις πόρτες. Ενεργοποιήστε το εσωτερικό σύστημα αερισμού.
2. Ελέγξτε τις ετικέτες για να βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο της σακούλας με τα δισκία του RipeLock™ Tabs 2.0 και του RipeLock™ ProActivators και το μέγεθος της σακούλας του διαλύματος **ενεργοποιητή RipeLock™ Solution** αντιστοιχεί στο μέγεθος του χώρου που προορίζεται για εφαρμογή, σύμφωνα με τις οριζόμενες ποσότητες στον ειδικό πίνακα δοσολογίας.
3. Τοποθετήστε τη σακούλα με το διάλυμα ενεργοποιητή RipeLock™ Solution όρθια σε μια σταθερή επιφάνεια. Αφαιρέστε την ταινία σφράγισης από το επάνω μέρος της σακούλας του καθώς και από τις σακούλες που περιέχουν δισκία του RipeLock™ Tabs 2.0 και του RipeLock™ ProActivators. Ρίξτε ΟΛΑ τα δισκία πρώτα του ενεργοποιητή και μετά του σκευάσματος απευθείας στο διάλυμα **ενεργοποιητή**. Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία με πρόσθετες ποσότητες όλων των συστατικών αναλόγως των αναγκών σύμφωνα με τον όγκο του θαλάμου. Φροντίστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία εντός 15 λεπτών.
4. Εξέλθετε αμέσως από τον χώρο, κλείστε τις πόρτες και βεβαιωθείτε ότι είναι ερμητικά κλεισμένες, για να εξασφαλιστεί η μέγιστη αποτελεσματικότητα. Η απελευθέρωση στο χώρο συντήρησης του 1-methylcyclopropene θα αρχίσει λίγα λεπτά μετά από την προσθήκη του σκευάσματος RipeLock™ Tabs 2.0 στο διάλυμα **ενεργοποιητή**.
5. Κατά την εφαρμογή να διατηρήσετε σε συνεχή λειτουργία τους ανεμιστήρες του εσωτερικού ψυκτικού συστήματος για διασφάλιση καλής κυκλοφορίας του αέρα εντός του θαλάμου. Ταυτόχρονα όλα τα συστήματα καθαρισμού (απορροφητές διοξειδίου του άνθρακα -CO₂ - και αιθυλενίου) και οι γεννήτριες όζοντος πρέπει να έχουν απενεργοποιηθεί.
6. Ο θάλαμος συντήρησης πρέπει να μείνει σφραγισμένος για 16-24 ώρες με το σύστημα κυκλοφορίας του αέρα να λειτουργεί και θερμοκρασία μεταξύ της τυπικής θερμοκρασίας του κύκλου ωρίμασης και της ελάχιστης θερμοκρασίας συντήρησης που χρησιμοποιείται εμπορικά για τη μπανάνα.
7. Μείνετε μακριά από τη ζώνη αερισμού κατά την περίοδο αυτή.

Δεδομένου ότι υπάρχει σειρά τιμών m^3 χωρητικότητας ανά δισκίο, συμβουλευτείτε τον τοπικό αντιπρόσωπό για συγκεκριμένες οδηγίες προσαρμοσμένες στις δικές σας συνθήκες χρήσης.

Μόλις σφραγιστεί ο θάλαμος εφαρμογής πρέπει να αναρτηθεί μία πινακίδα στην εξωτερική πλευρά της πόρτας του με την ένδειξη:

“ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ- ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ-
ΕΝΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ RIPELOCK™ TABS 2.0

Η πινακίδα πρέπει να μείνει αναρτημένη στην πόρτα μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία εφαρμογής και η διαδικασία του αερισμού.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

Η εκπαίδευση των χειριστών θα γίνεται με ευθύνη του κατόχου της έγκρισης. Οι εκπαιδευόμενοι γεωπόνοι και χειριστές θα γνωστοποιούνται στην Αρμόδια Αρχή και στην τοπική Αρμόδια Υπηρεσία.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΆΛΛΑ ΜΕΤΑΣΥΛΛΕΚΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Μη χρησιμοποιείτε το RipeLock™ Tabs 2.0 σε ανάμιξη ή ταυτόχρονα με άλλα μετασυλλεκτικά προϊόντα.

Οδηγίες για ασφαλή απόσυρση κενών συσκευασίας και καταλοίπων εφαρμογής:

Με το πέρας της διαδικασίας εφαρμογής τα κατάλοιπα του διαλύματος και τα κενά συσκευασίας συλλέγονται σε ειδικά δοχεία/σακούς και απορρίπτονται ως μη επικίνδυνα απόβλητα.

| 5 5.1 Φάσμα δράσης | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--------------------------------|--|
| Προϊόντα | Στόχος | Δόσεις προϊόντος Αριθ. δισκίων/ m^3 αποθήκης | | Όροι εφαρμογής | |
| | | 1 κίτρινο δισκίο (4.2 γρ.) για όγκο θαλάμου: | 1 ροζ δισκίο (0.84 γρ.) για όγκο θαλάμου: | Μεγ. αριθ. εφαρμο γών | Καταληκτικός χρόνος εφαρμογής |
| Μπανάνα | Επιβράδυνση της ανάπτυξης του χρώματος και παράταση της περιόδου με το κίτρινο χρώμα | 45-60 m^3 αποθήκης (834-624 ppb) | 9-12 m^3 αποθήκης (834-624 ppb) | 1 | Στο στάδιο αλλαγής χρώματος 3,5-4 στη κλίμακα χρωμάτων 1-7 |
| | | Μέγιστη μεμονωμένη δόση: 0.093 γρ. προϊόντος / m^3 (2.24 mg δ.ο. / m^3) | | | |

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Χρόνος εφαρμογής:

Το σκεύασμα RipeLock™ Tabs 2.0 χρησιμοποιείται πάντα με τον Ενεργοποιητή RipeLock™ ProActivators και το ειδικό διάλυμα **ενεργοποιητή RipeLock™ Solution**.

Για καλύτερα αποτελέσματα συνιστάται εφαρμογή του RipeLock™ Tabs 2.0 μετά από τον κύκλο ωρίμασης, στο στάδιο χρώματος μεταξύ 3,5 και 4,0 από τα αναφερόμενα στον παρακάτω πίνακα στάδια.

| Χρώμα Στάδιο 2 | Χρώμα Στάδιο 3 | Χρώμα Στάδιο 4 | Χρώμα Στάδιο 5 | Χρώμα Στάδιο 6 | Χρώμα Στάδιο 7 |
|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|--------------------------|
| Πράσινο | Περισσότερο πράσινο παρά κίτρινο | Περισσότερο κίτρινο παρά πράσινο | Πράσινο στην άκρη και πράσινο στο λαιμό | Κίτρινο με ανοικτό πράσινο λαιμό | Κίτρινο με καφέ στίγματα |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

Ρυθμίστε τη δόση ανάλογα με το μέγεθος του χώρου συντήρησης, την ποικιλία, το στάδιο ωρίμασης των φρούτων κατά τη συγκομιδή ή το μεσοδιάστημα μεταξύ συγκομιδής και εφαρμογής.

Συμβουλευτείτε τον μεταποιητή πριν από τη χρήση σε καρπούς που προορίζονται για μεταποίηση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Το προϊόν πρέπει να εφαρμόζεται μόνο από κατάλληλα εκπαιδευμένους και αρμόδιους για διεξαγωγή αυτής της εργασίας.

Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GAP) παρουσιάζεται στο [Παράρτημα II](#).

9 Εικονογράμματα κινδύνου
(ξεχωριστή ταξινόμηση και επισήμανση για το φ.π. και τα απαραίτητα για την εφαρμογή του συστατικά ενεργοποίησης)

RipeLock™ Tabs 2.0 (Δισκία σκευάσματος)

--

RipeLock™ ProActivators (Δισκία ενεργοποιητή)

--

RipeLock™ Solution (Διάλυμα ενεργοποιητή)

(GHS07)



ΠΡΟΣΟΧΗ

10 Δηλώσεις επικινδυνότητας
(ξεχωριστή ταξινόμηση και επισήμανση για το φ.π. και τα απαραίτητα για την εφαρμογή του συστατικά ενεργοποίησης)

RipeLock™ Tabs 2.0 (Δισκία σκευάσματος)

--

RipeLock™ ProActivators (Δισκία ενεργοποιητή)

--

RipeLock™ Solution (Διάλυμα ενεργοποιητή)

H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.

H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

RipeLock™ Tabs 2.0 (Δισκία σκευάσματος)**RipeLock™ ProActivators (Δισκία Ενεργοποιητή)**

P102 + P405 Μακριά από παιδιά. Φυλάσσεται κλειδωμένο.

P270 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

SP1 Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

EUH401 Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Προστασία των χειριστών:

ΜΕΙΝΕΤΕ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΛΑΜΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΕΡΙΣΜΟ

ΜΗΝ ΑΝΑΠΝΕΕΤΕ ΤΟΥΣ ΑΤΜΟΥΣ

Μετά την εφαρμογή συνιστάται να συλλέξετε και να απομακρύνετε τυχόν κατάλοιπα του διαλύματος 1-methylcyclopropane.

Ανοίξτε την πόρτα και συνεχίστε τη λειτουργία του συστήματος αερισμού στη μέγιστη ισχύ για τουλάχιστον 15 λεπτά. Συνιστάται κατά τη διάρκεια αυτή να παραμείνετε εκτός της ζώνης αερισμού.

Το προϊόν πρέπει να εφαρμόζεται μόνο από κατάλληλα εκπαιδευμένους και αρμόδιους για διεξαγωγή αυτής της εργασίας.

Φορέστε κατά τον χειρισμό του προϊόντος κατάλληλα προστατευτικά γάντια.

RipeLock™ Solution (Διάλυμα ενεργοποιητή)

P102 + P405 Μακριά από παιδιά. Φυλάσσεται κλειδωμένο .

P270 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

P280 Να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια.

SP1 Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

EUH401 Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Προστασία των χειριστών:

ΜΕΙΝΕΤΕ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΛΑΜΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΕΡΙΣΜΟ

ΜΗΝ ΑΝΑΠΝΕΕΤΕ ΤΟΥΣ ΑΤΜΟΥΣ

Μετά την εφαρμογή συνιστάται να συλλέξετε και να απομακρύνετε τυχόν κατάλοιπα του διαλύματος 1-methylcyclopropane.

Ανοίξτε την πόρτα και συνεχίστε τη λειτουργία του συστήματος αερισμού στη μέγιστη ισχύ για τουλάχιστον 15 λεπτά. Συνιστάται κατά τη διάρκεια αυτή να παραμείνετε εκτός της ζώνης αερισμού.

Το προϊόν πρέπει να εφαρμόζεται μόνο από κατάλληλα εκπαιδευμένους και αρμόδιους για διεξαγωγή αυτής της εργασίας.

Φορέστε κατά τον χειρισμό του προϊόντος κατάλληλα προστατευτικά γάντια.

12 Πρώτες
βοήθειες -
Αντίδοτο

RipeLock™ Tabs 2.0 (Δισκία σκευάσματος)

RipeLock™ ProActivators (Δισκία ενεργοποιητή)

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

Σε περίπτωση υποψίας δηλητηρίασης, συμβουλευτείτε αμέσως γιατρό και καλέστε το Κέντρο Δηλητηριάσεων.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλυθείτε καλά με νερό και σαπούνι. Ζητήστε ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση κατάποσης: Χορηγήστε στον παθόντα δυο ποτήρια νερό. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777

RipeLock™ Solution (Διάλυμα ενεργοποιητή)

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

Σε περίπτωση υποψίας δηλητηρίασης, συμβουλευτείτε αμέσως γιατρό και καλέστε το Κέντρο Δηλητηριάσεων.

P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε τα προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλυθείτε καλά με νερό και σαπούνι. Ζητήστε ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Ζητήστε ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση κατάποσης: Χορηγήστε στον παθόντα δύο ποτήρια νερό. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777

Σημείωση (Σχετ. σημεία 9, 10, 11 και 12)

Η ετικέτα κάθε ξεχωριστής συσκευασίας θα φέρει την απαιτούμενη επισήμανση. Το ίδιο ισχύει και για τα εξωτερικά χαρτοκιβώτια μεταφοράς / αποθήκευσης αυτών. Στην περίπτωση μεταφοράς / προσωρινής αποθήκευσης από κοινού όλων των συσκευασιών σε μεγάλο κοινό εξωτερικό χαρτοκιβώτιο, η ετικέτα του χαρτοκιβωτίου επιβάλλεται να φέρει την πιο αυστηρή επισήμανση (π.χ. την επισήμανση του διαλύματος ενεργοποιητή RipeLock™ Solution, εφόσον συμπεριλαμβάνεται).

17 Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών

Ο κάτοχος της έγκρισης οφείλει να προσκομίσει στην ΣΕΑ την αξιολόγηση των περαιτέρω στοιχείων που ζητήθηκαν από την εισηγήτρια χώρα (**Ηνωμένο Βασίλειο**).

8

- II. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθ. πρωτ. 5634/62854/31-5-2016 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΣΠ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ