



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 26.01.2024
Αριθ. πρωτ: 423/10505

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Δ. Μακρογιάννη
Τηλέφωνο: 210 9287160
e-mail: dmakrogianni@minagric.gr

Προς: INDUSTRIAS AFRASA S.A., Ισπανίας
(Δια του υπεύθυνου επικοινωνίας
ΤΟΥΤΟΥΤΖΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ και ΣΙΑ
Ε.Ε – “AGRIBIZ”)
e-mail: info@agribiz.gr

ΘΕΜΑ: «Διεύρυνση της με αριθ. 14658 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) GRIAL 2,5 EC (deltamethrin 2,5% β/ο) σε ήσσονος σημασίας χρήσεις»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις:
 - Του ν. 4036/2012 (Α'8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - Του ν. 2690/1999 (Α'45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 - Του ν. 4622/2019 (Α'133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
- Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 51 αυτού.
- Το αριθμ. 79/27.06.2023 Π.Δ. «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.» (Α'131/27.06.2023).
- Την αριθμ. 10088/115732/26.09.2013 Υπουργική απόφαση (Β'2587) σχετικά με την «Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσονος σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσονος σημασίας».
- Την αριθμ. 1881/286212/13.10.2020 Απόφαση Υπουργού “Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση” (Β'4612/19.10.20).
- Το αριθμ. 12862/330936/07.12.2020 έγγραφο της Υπηρεσίας με θέμα «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά».
- Την αριθμ. 5074/68737/14.05.2018 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 14658 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) GRIAL 2,5 EC (deltamethrin 2,5% β/ο), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

8. Την αριθμ. 423/10505/12.01.2024 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Διευρύνουμε τη με αριθ. 14658 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) GRIAL 2,5 EC (deltamethrin 2,5% β/ο), που χορηγήθηκε με την αριθμ. 5074/68737/14.05.2018 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε ήσσονος σημασίας χρήσεις.

Το σημείο 5 διαμορφώνεται ως εξής:

5 Φάσμα δράσης						
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μεγ. αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες)
		κ.εκ./ στρέμμα	κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ		
Εσπεριδοειδή Πορτοκαλιά CIDSΙ	Αφίδες <i>Myzus persicae</i> ΜΥΥΖΡΕ	30-50	30-50	100	Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών	1
Λεμονιά CIDLI	Λεκάνιο <i>Saissetia oleae</i> SAISOL	50	50	100		
Μανταρινιά CIDRE Γκρέιπφρουτ CIDPA Νεραντζιά CIDAU	Μύγα της Μεσογείου <i>Ceratitis capitata</i> CERTCA					
Ακρόδρυα Αμυγδαλιά PRNDU Φιστικιά PIAVE Φουντουκιά CYLAV Καρυδιά IUGRE Καστανιά CSNSA	Αφίδες <i>Hyalopterus</i> sp. HYALSP Καρπόκαψα Καρυδιάς <i>Laspeyresia pomonella</i> CARPPO Καρπόκαψα Καστανιάς <i>Laspeyresia splendana</i> LASPSL Χρήση ήσσονος σημασίας: <i>Spodoptera frugiperda</i> **** LAPHFR	42-50	30	140	Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προσβολών	2/14
			50	100		
	Ευρύτομο <i>Eurytoma plotnicovi</i> EURTPL	50	50	100	Με την έναρξη των πτήσεων των ακμαίων	

Μηλοειδή Μηλιά MABSD Αχλαδιά PYUCO Κυδωνιά CYDOB Μουσμουλιά MSPGE	Καρπόκαψα <i>Laspeyresia pomonella</i> CARPPO	30-50	30-50*	100-140	Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προσβολών	2/14
	Αφίδες <i>Aphis pomi</i> ARHIPO <i>Dysaphis plantaginea</i> DYSAPL					
	Ψύλλα μηλιάς <i>Psylla mali</i> PSYLMAL					
	Χρήση ήσσονος σημασίας: Spodoptera frugiperda **** LAPHFR					
	Φυλλοδέτες <i>Adoxophyes orana</i> CAPURE <i>Archips rosanus</i> CACORO	35-50	35	100-140		
	Ψύλλα αχλαδιάς <i>Psylla pyri</i> PSYLPY	50	50	100		
Πυρηνόκαρπα Ροδακινιά PRNPS Νεκταρινιά PRNPN Βερικοκιά PRNAR Δαμασκηνιά PRNDO Κερασιά PRNAV Βουσσινιά PRNCE	Φυλλοδέτες <i>Adoxophyes orana</i> CAPURE <i>Archips rosanus</i> CACORO	35-49	35	100-140	Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών	1
	Ανάρσια <i>Anarsia lineatella</i> ANARLI					
	Χρήση ήσσονος σημασίας: Spodoptera frugiperda **** LAPHFR					
	Ραγολέτιδα <i>Rhagoletis cerasi</i> RHAGCE	40-70	40-50			
	Μύγα της Μεσογείου <i>Ceratitis capitata</i> CERTCA	50-70	50			
	Αφίδες <i>Myzus persicae</i> MYZYPE <i>Myzus cerasi</i> MYZUCE	30-70	35-50			

	<i>Hyalopterus pruni</i> HYALPR Καρπόκαψα της Δαμασκηνιάς <i>Laspeyresia funebrana</i> LASPFU					
Αμπέλι ** VITVI	Ευδεμίδα <i>Lobesia botrana</i> POLYBO	50-70	50 (1η γενεά) 50-70 (2η και 3η γενεά)	100	Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προσβολών	3/14
	Κογχυλίδα <i>Clysia ambiguella</i> CLYSAM Χρήση ήσσονος σημασίας: <i>Spodoptera frugiperda</i> **** LAPHFR	50-70	50-70			
	Τζιτζικάκι <i>Empoasca</i> sp. EMPOSP	50	50			
Ελιά (Επιτραπέζια και ελιές για παραγωγή λαδιού) OLVEU	Πυρηνοτρήτης <i>Prays oleae</i> (ανθόβια και καρπόβια γενιά) PRAYOL Χρήση ήσσονος σημασίας: <i>Spodoptera frugiperda</i> **** LAPHFR	40	30-40	80-100	Εφαρμογή κατά την περίοδο της ανθοφορίας	1
	Δάκος <i>Bactrocera oleae</i> DACUOL	50-70	50	100-140		
	Λεκάνιο <i>Saissetia oleae</i> SAISOL	50-70	50	100-140		
	Βαμβακάδα <i>Eurpyllura olivine</i> EUPHSP	30-70	30-50	100-140		
Φράουλα (υπαίθρου) FRAAN	Αφίδες <i>Aphis gossypii</i> APHIGO <i>Aphis ruborum</i> APHIRB <i>Aulacorthum solani</i> AULASO <i>Chaetosiphon</i>	50	30-50	30-100	Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προσβολών	2/14

	<i>fragaefolii</i> CHTSFR <i>Myzus persicae</i> MYZUPE Σποντόπτερα <i>Spodoptera</i> sp. SPODSP Κοφτοσκούληκα <i>Agrotis ypsilon</i> AGROSP					
Φράουλα (θερμοκηπίου) FRAAN	Αφίδες <i>Aphis</i> sp. APHISP <u>Χρήση ήσσονος σημασίας:</u> <i>Spodoptera frugiperda</i> **** LAPHFR	25-50	50	50-100	Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προσβολών	3/14
Κρεμμύδι ALLCE Πράσο ALLPO Σκόρδο ALLSA	Κοφτοσκούληκα <i>Agrotis</i> sp. AGROSP Θρίπας <i>Thrips tabaci</i> THRITB <u>Χρήση ήσσονος σημασίας:</u> <i>Spodoptera frugiperda</i> **** LAPHFR	30-50	--	40-50	Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προσβολών	3/14
Τομάτα (Υπαίθρου και θερμοκηπίου) LYPES Μελιτζάνα (Υπαίθρου και θερμοκηπίου) SOLME	Αφίδες <i>Aphis gossypii</i> APHIGO <i>Macrosiphum euphorbiae</i> MACSEU <i>Myzus persicae</i> MYZUPE Πράσινο σκουλήκι <i>Helicoverpa armigera</i> HELIAR Άλτης <i>Chrysodeixis chalcites</i> PLUSCH Μαμέστρα <i>Autographa gamma</i> PYTOGA	50	30-50	30-100	Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προσβολών	2/14

	Κοφτοσκούληκα <i>Agrotis segetum</i> AGROSE Σποντόπτερα <i>Spodoptera exigua</i> LAPHEG <i>Spodoptera littoralis</i> SPODLI Χρήση ήσσονος σημασίας: <i>Spodoptera frugiperda</i> **** LAPHFR					
	Δορυφόρος <i>Leptinotarsa decemlineata</i>	30-50	50	60-100	Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προσβολών	3/14
	Βρωμούσα <i>Nezara viridula</i>	18-30	30	60-100		
	Κοφτοσκούληκα <i>Agrotis ypsilon</i> AGROSP	30-50	--	60-100		
Πτεριά (Υπαίθρου και θερμοκηπίου) CPSSS	Πράσινο σκουλήκι <i>Helicoverpa armigera</i> HELIAR	30-50 (Υ) 30-70 (Θ)	50	60-100 (Υ) 60-140 (Θ)	Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προσβολών	3/14 (Υ) 4/7 (Θ)
	Σποντόπτερα <i>Spodoptera</i> sp. SPODSP					
	Δορυφόρος <i>Leptinotarsa decemlineata</i> LPTNDE					
	Αφίδες <i>Myzus persicae</i> MYZUPE <i>Aphis gossypii</i> APHIGO <i>Anuraphis cardui</i> BRDSCA <i>Hyperomyzus lactucae</i> HYPELA					
	Βρωμούσα <i>Nezara viridula</i> NEZAVI	18-30 (Υ) 18-42 (Θ)	30	60-100 (Υ) 60-140 (Θ)		
	Αλευρώδης <i>Trialeurodes vaporariorum</i>) TRIAVA	42-70 (Θ)	70 (Θ)	60-100 (Θ)		
	Κοφτοσκούληκα	30-50 (Υ)	--	60-100 (Υ)		

	<i>Agrotis</i> sp. AGROSP					
Κολοκυθάκι (Υπαίθρου και θερμοκηπίου) CUUPG	Αφίδες <i>Aphis gossypii</i> APHIG <i>Myzus persicae</i> MYZUPE Πράσινο σκουλήκι <i>Helicoverpa armigera</i> HELIAR Μαμέστρα <i>Autographa gamma</i> PYTOGA Σποντόπτερα <i>Spodoptera littoralis</i> SPODLI Χρήση ήσσονος σημασίας: <i>Spodoptera frugiperda</i> **** LAPHFR	50	30-50	30-100	Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προσβολών	2/14
Αγγούρι, Αγγουράκι (υπαίθρου & θερμοκηπίου) CUMSA	Αφίδες <i>Aphis gossypii</i> APHIGO <i>Myzus persicae</i> MYZUPE <i>Hyperomyzus lactucae</i> HYPELA Πράσινο σκουλήκι <i>Helicoverpa armigera</i> HELIAR Σποντόπτερα <i>Spodoptera littoralis</i> SPODLI Κοφτοσκούληκα <i>Agrotis segetum</i> AGROSE <i>Agrotis ipsilon</i> AGROYF Χρήση ήσσονος σημασίας: <i>Spodoptera frugiperda</i> **** LAPHFR	50	30-50	30-100	Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προσβολών	2/14
Πεπόνι (υπαίθρου &	Αφίδες <i>Aphis gossypii</i>	50	30-50	30-100	Ψεκασμοί με την εμφάνιση	2/14

θερμοκηπίου) CUMME	APHIGO <i>Myzus persicae</i> MYZUPE Πράσινο σκουλήκι <i>Helicoverpa armigera</i> HELIAR Σποντόπτερα <i>Spodoptera littoralis</i> SPODLI <i>Spodoptera exigua</i> LAPHEG Μαμέστρα <i>Autographa gamma</i> PYTOGA Κοφτοσκούληκα <i>Agrotis segetum</i> AGROSE <i>Agrotis ipsilon</i> AGROYF <u>Χρήση ήσσονος σημασίας:</u> <i>Spodoptera frugiperda ****</i> LAPHFR				των προσβολών	
Καρπούζι (υπαίθρου & θερμοκηπίου) CITLA	Αφίδες <i>Aphis gossypii</i> APHIGO <i>Macrosiphum euphorbiae</i> MACSEU Πράσινο σκουλήκι <i>Helicoverpa armigera</i> HELIAR Σποντόπτερα <i>Spodoptera littoralis</i> SPODLI <i>Spodoptera exigua</i> LAPHEG Μαμέστρα <i>Autographa gamma</i> PYTOGA <u>Χρήση ήσσονος σημασίας:</u> <i>Spodoptera frugiperda ****</i>	50	30-50	30-100	Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προσβολών	2/14

	LAPHFR					
Κουνουπίδι BRSOB Μπρόκολο BRSOK	Αφίδες <i>Brevicoryne brassicae</i> BRVCBR <i>Liraphis erysimi</i> LIPAER <i>Myzus persicae</i> MYZUPE Πιερίδα <i>Pieris brassicae</i> PIERBR <i>Pieris rapae</i> PIERRA Κοφτοσκούληκα <i>Agrotis segetum</i> AGROSE <i>Agrotis ipsilon</i> AGROYF Πράσινο σκουλήκι <i>Helicoverpa armigera</i> HELIAR Μαμέστρα <i>Mamestra brassicae</i> BARABR <i>Autographa gamma</i> PYTOGA Σποντόπτερα <i>Spodoptera littoralis</i> SPODLI Πλουτέλλα <i>Plutella xylostella</i> PLUTMA Χρήση ήσσονος σημασίας: Spodoptera frugiperda **** LAPHFR	50	30-50	30-100	Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προσβολών	2/14
Λάχανο (εκτός από κινέζικο) BRSOX	Πιερίδα <i>Pieris spp.</i> PIERSP Μαμέστρα <i>Mamestra brassicae</i> BARABR Πλούζια <i>Plusia gamma</i>	30-50	-	50	Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προσβολών	2/14

	ΡΥΤΟΓΑ Πράσινο σκουλήκι <i>Helicoverpa armigera</i> HELIAR Σποντόπτερα <i>Spodoptera</i> sp. SPODSP Αφίδες <i>Myzus persicae</i> MYZUPE <i>Brevicoryne brassicae</i> BRVCBR Κοφτοσκούληκα <i>Agrotis</i> sp. AGROSP					
	Πλουτέλλα <i>Plutella xylostella</i> PLUTMA	50	--	50		
Μαρούλι (Υπαίθρου) LACSA	Πράσινο σκουλήκι <i>Helicoverpa armigera</i> HELIAR Σποντόπτερα <i>Spodoptera exigua</i> SPODEX Άλτης <i>Chrysodeixis chalcites</i> PLUSCH Αφίδες <i>Hyperomyzus lactucae</i> HYPELA <i>Aphis</i> sp. APHISP <i>Nasonovia ribis-nigri</i> NASORN Χρήση ήσσονος σημασίας: <i>Spodoptera frugiperda</i> **** LAPHFR	25-50	50	50-100	Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προσβολών	3/7
	Κοφτοσκούληκα <i>Agrotis</i> sp. AGROSP	30-50	--	50-100		
Μαϊντανός PARCR Φύλλα σέλινου	Αφίδες <i>Aphis</i> sp. APHISP	35	50	70	Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προσβολών	2/14

ΑΡΥΓΡ Ρόκα DIPER	Σποντόπτερα <i>Spodoptera exigua</i> SPODEX					
	Μαμέστρα <i>Mamestra</i> sp. BARABR					
	Άλτης <i>Chrysodeixis chalcites</i> PLUSCH					
	Χρήση ήσσονος σημασίας: <i>Spodoptera frugiperda</i> **** LAPHFR					
	Κοφτοσκούληκα <i>Agrotis</i> sp. AGROSP	30-50	--	70		
Μπιζέλια (αρακάς) φρέσκα PIBSX	Αφίδα των μπιζελιών <i>Acyrtosiphon pisum</i> ACYRON	25	-	100	Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προσβολών	2/14
	Σιτόνα <i>Sitona</i> sp. SITNSP					
	Αφίδα των κουκιών <i>Aphis fabae</i> APHIFA	30-50	-			
	Κάμπια των μπιζελιών <i>Laspeyresia nigricana</i> LASPNI					
	Θρίπας <i>Thrips angusticeps</i> THRIAN					
	Κοφτοσκούληκα <i>Agrotis</i> sp. AGROSP					
	Χρήση ήσσονος σημασίας: <i>Spodoptera frugiperda</i> **** LAPHFR					
Αγκινάρα CYUCA	Κασσίδα <i>Cassida</i> sp CASSSP	50	--	100	Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προσβολών	3/7
	Προντένια <i>Spodoptera litura</i>	30-50	--			

	PRODLI Αφίδες <i>Anuraphis cardui</i> BRDSCA <i>Myzus persicae</i> MYZUPE Χρήση ήσσονος σημασίας: <i>Spodoptera frugiperda</i> **** LAPHFR					
Ψυχανθή (όσπρια) Φασόλια PHASSS Κουκιά VICFX Φακή LENCU Ρεβίθια CIEAR	Πράσινο σκουλήκι <i>Helicoverpa armigera</i> HELIAR Αφίδες <i>Myzus persicae</i> MYZUPE <i>Aphis</i> sp. APHISP Κοφτοσκούληκα <i>Agrotis</i> sp. AGROSP Χρήση ήσσονος σημασίας: <i>Spodoptera frugiperda</i> **** LAPHFR	30-50	--	50-100	Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προσβολών	2/14
Πατάτα SOLTU	Δορυφόρος <i>Leptinotarsa decemlineata</i> LPTNDE	50	--	60	Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προσβολών	3/14
	Σποντόπτερα <i>Spodoptera littoralis</i> SPODLI Χρήση ήσσονος σημασίας: <i>Spodoptera frugiperda</i> **** LAPHFR	30-50	--	60		
Βαμβάκι GOSHI	Ρόδινο σκουλήκι <i>Pectinophora gossypiella</i> PECTGO Πράσινο σκουλήκι <i>Helicoverpa armigera</i> HELIAR	50-70	--	30-50	Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής	2/14
	Αλευρώδης	50	--			

	<i>Bemisia tabaci</i> BEMITB Τζιτζικάκια <i>Empoasca</i> sp. EMPOSP					
	Σποντόπτερα <i>Spodoptera</i> sp. SPODSP Αφίδα <i>Aphis gossypii</i> APHIGO Κοφτοσκούληκα <i>Agrotis</i> sp. AGROSP	30-50	--			
Καπνός ΝΙΟΤΑ	Κοφτοσκούληκα <i>Agrotis</i> sp. AGROSP Θρίπας <i>Thrips tabaci</i> THRITB Χρήση ήσσονος σημασίας: Spodoptera frugiperda **** LAPHFR	30-50	--	50-100	Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προσβολών	3/7
Ζαχαρότευτλα ΒΕΑΒΑ Παντζάρι ΒΕΑΒΒ	Αφίδες <i>Aphis fabae</i> APHIFA <i>Myzus persicae</i> MYZUPE Μύγα των τεύτλων <i>Pegomya</i> sp. PEGOSP Άλτης <i>Chaetocnema tibialis</i> CHAETI Σποντόπτερα <i>Spodoptera</i> sp. SPODSP Κοφτοσκούληκα <i>Agrotis</i> sp. AGROSP	30-50	--	50	Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών	1
	Κασσίδα <i>Cassida nebulosa</i> CASSNE	50	--	50		

Αραβόσιτος*** ΖΕΑΜΧ	Πυραλίδα <i>Ostrinia nubilalis</i> PYRUNU Σεζάμια <i>Sesamia nonagrioides</i> SESANO Πράσινο σκουλήκι <i>Helicoverpa armigera</i> HELIAR Σποντόπτερα <i>Spodoptera sp.</i> SPODSP Αφίδες <i>Rhopalosiphum padi</i> RHOPFI <i>Sitobion avenae</i> MACSAV Κοφτοσκούληκα <i>Agrotis sp.</i> AGROSP	30-50	--	60	Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προσβολών	3/14-21
	Διαβρώτिका <i>Diabrotica virgifera</i> DIABVI	50				Για την Διαβρώτिका μεσοδιάστημα εφαρμογών 7-14
Σιτηρά Σιτάρι TRZAX Κριθάρι HORVX Βρώμη AVESW Σίκαλη SECCE	Αφίδες <i>Rhopalosiphum padi</i> RHOPFI <i>Sitobion avenae</i> MACSAV Κοφτοσκούληκα <i>Agrotis sp.</i> AGROSP Χρήση ήσσονος σημασίας: <i>Spodoptera frugiperda</i> **** LAPHFR	30-50	--	40-60	Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών	1
Μηδική MEDVA	Αφίδα των μπιζελιών <i>Acyrtosiphon pisum</i> ACYRON Σκαθάρι των μπιζελιών <i>Arion pisi</i> APIOPI Φυτονόμος	25	--	40	Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προσβολών	2/14

	<i>Hypera postica</i> HYPRPO					
	Χρήση ήσσονος σημασίας: <i>Spodoptera frugiperda</i> **** LAPHFR					
Καλλωπιστικά (Υπαίθρου και Θερμοκηπίου)	Αφίδες <i>Myzus</i> sp. MYZUPE	25-50	50	50-100	Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών	3/7
	Θρίπες <i>Thrips tabaci</i> THRITB					
	Φυλλοδέτες <i>Archips</i> sp. CACORO <i>Adoxophyes</i> sp. ADXPSP <i>Pandemis</i> sp. PANDSP	17,5-35	35			
	Χρήση ήσσονος σημασίας: <i>Spodoptera frugiperda</i> **** LAPHFR					
	Αλευρώδης <i>Trialeurodes vaporariorum</i> TRIAVA	50	70	70		

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

* ΠΡΟΣΟΧΗ: Στα μηλοειδή η δόση των 50 κ.εκ. σκευάσματος/hl πρέπει να χρησιμοποιείται πάντα με τον μικρό όγκο ψεκαστικού υγρού (100 lt/στρέμμα) έτσι ώστε η τελική δόση να μην ξεπερνάει τα 50 κ.εκ. σκευάσματος στο στρέμμα.

** Δεν επιτρέπεται η συγκομιδή αμπελόφυλλων στα οποία έχει γίνει χρήση με το φυτοπροστατευτικό προϊόν.

*** Η εφαρμογή στο καλαμπόκι οδηγεί στη μείωση των επιπέδων των μυκοτοξινών, ως αποτέλεσμα της επιτυχούς αντιμετώπισης των εντόμων *Ostrinia* spp. και *Sesamia* spp.

**** Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα κατά του *Spodoptera frugiperda* στις καλλιέργειες: ακρόδρυων, μηλοειδών, πυρηνοκάρπων, αμπελιού, ελιάς, φράουλας (Θ), κρεμμυδιού, πράσου, σκόρδου, τομάτας (Υ+Θ), μελιτζάνας (Υ+Θ), κολοκυθίου (Υ+Θ), αγγουριού (Υ+Θ), πεπονιού (Υ+Θ), καρπουζιού (Υ+Θ), κουνουπιδιού, μπρόκολου, μαρουλιού, μαϊντανού, φύλλων σέλινου, ρόκας, μπιζελιού, αγκινάρας, ψυχανθών (οσπρίων), πατάτας, καπνού, σιτηρών, μηδικής, καλλωπιστικών (Υ+Θ). Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.

II. Διάθεση αποθεμάτων

1. Η ετικέτα του σκευάσματος να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
2. Για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, επιτρέπεται η τοποθέτηση στις συσκευασίες του σκευάσματος της μέχρι σήμερα ισχύουσας ετικέτας.
3. Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις συσκευασίες του σκευάσματος θα τοποθετείται υποχρεωτικά η νέα τροποποιημένη ετικέτα.

- III. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 5074/68737/14.05.2018 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ