



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 23-6-2011

Αριθ. πρωτ.: 98433

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
Τ.Κ.: 176 71 - ΚΑΛΛΙΘΕΑ  
Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος  
Τηλέφωνο: 210 928 72 11  
FAX: 210 92 12 090  
E-mail: [svg046@minagric.gr](mailto:svg046@minagric.gr)

ΠΡΟΣ: 1. BAYER ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.  
2. MAGMA ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΙΣΡΟΕΣ Ε.Π.Ε.  
3. ΥΨΙΛΟΝ Α.Ε.  
4. ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ  
5. κ. ΓΙΩΡΓΟ ΓΑΛΕΝΟ  
6. SYNGENTA Hellas Α.Ε.Β.Ε.

ΚΟΙΝ.: 1. Γραφείο κ. Υπουργού  
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού  
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα  
4. Γραφείο Προϊσταμένου Γενικής  
Διεύθυνσης Φυτικής Παραγωγής  
κ. Δ. Μπαμπίλη  
5. Μ.Φ.Ι. (με email)  
α) Τμήμα Εντομολογίας και  
Γεωργικής Ζωολογίας  
β) Τμήμα Ελέγχου Γεωργ. Φαρμάκων  
6. Περιφερειακές Ενότητες (με e-mail)  
Δ/σεις Αγροτ. Οικον. & Κτηνιατρικής  
7. Π.Κ.Π.Π. & Π.Ε. (με e-mail)  
8. Ινστιτούτο Προστ. Φυτών Ηρακλείου  
Μέσα Κατσαμπά  
711 10 - ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ  
(υπ' όψη κ. Ν. Ροδιτάκη)  
9. Τμήματα Α', Β', Γ, Ε' της Δ/σής μας  
10. Ε.ΣΥ.Φ.

ΘΕΜΑ: “Χορήγηση κατ’ εξαίρεση έγκρισης  
διάθεσης στην αγορά  
εντομοκτόνων σκευασμάτων με  
βάση το άρθρο 8 (παρ. 4) του Π.Δ.  
115/97, για την αντιμεώπιση του  
εντόμου *Rhynchophorus*  
*ferrugineus* (Olivier) στα  
φοινικοειδή ”

ΑΠΟΦΑΣΗ  
Ο

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 (παρ. 4) του Π.Δ. 115 (ΦΕΚ 104/Α'30.5.1997) “Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως έχει συμπληρωθεί”.
2. Τη με αριθ. 2007/365/ΕΚ απόφαση της Επιτροπής με θέμα “προσωρινά έκτακτα μέτρα για την πρόληψη της εισαγωγής και της εξάπλωσης στην Κοινότητα του *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier)”, όπως τροποποιήθηκε με τις με αριθ. 2008/776/ΕΚ και 2010/467/Ε.Ε. Αποφάσεις της Επιτροπής.
3. Το με αριθ. 93643/21.2.2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.
4. Τη γνωμοδότηση του Ανωτάτου Συμβουλίου Γεωργικών Φαρμάκων (Α.ΣΥ.ΓΕ.Φ.) της 4<sup>ης</sup>/2011 συνεδρίασής του που αφορά το ανωτέρω θέμα.
5. Το με αριθ. 97072/23.5.2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.

6. Τη με αριθ. 191351/6.12.2010 Απόφασή μας, με θέμα την “Χορήγηση κατ’ εξαίρεση έγκρισης διάθεσης στην αγορά εντομοκτόνων σκευασμάτων με βάση το άρθρο 8 (παρ. 4) του Π.Δ. 115/97, για την πρόληψη και τον περιορισμό της εξάπλωσης του εντόμου *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier) στα φοινικοειδή, σε εφαρμογή της Απόφασης 2007/365/ΕΚ, όπως ισχύει”.
7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 89/7.9.2010 (ΦΕΚ 154/Α’/7-9-2010) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
8. Τις σχετικές αιτήσεις των εταιρειών BAYER ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε., MAGMA ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΙΣΡΟΕΣ Ε.Π.Ε., ΥΨΙΛΟΝ Α.Ε., ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε., SYNGENTA Hellas Α.Ε.Β.Ε. και του κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΓΑΛΕΝΟΥ και τα αντίστοιχα υποβληθέντα παράβολα.

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

**Ι.** Χορηγούμε κατ’ εξαίρεση έγκριση διάθεσης στην αγορά με βάση το άρθρο 8 (παρ. 4) του Π.Δ. 115/1997 στα ακόλουθα εντομοκτόνα σκευάσματα, για την πρόληψη και τον περιορισμό της εξάπλωσης του εντόμου *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier) στα φοινικοειδή:

- α) **ACTARA 25 WG** (δραστική ουσία thiamethoxam, αριθμός έγκρισης 14103).
- β) **CONFIDOR 200 SL** (δραστική ουσία imidacloprid, αριθμός έγκρισης 1616).
- γ) **KOHINOR 200 SL** (δραστική ουσία imidacloprid, αριθμός έγκρισης 14200).
- δ) **TIDO 20 SL** (δραστική ουσία imidacloprid, αριθμός έγκρισης 14231).
- ε) **CORSARIO** (δραστική ουσία imidacloprid, αριθμός έγκρισης 14203).
- στ) **WARRANT 200 SL** (δραστική ουσία imidacloprid, αριθμός έγκρισης 14199).
- ζ) **VERTIMEC 1,8 EC** (δραστική ουσία abamectin, αριθμός έγκρισης 1719).

Τα στοιχεία της κατ’ εξαίρεση διάθεσης στην αγορά θα είναι τα εξής:

#### 1) Δόσεις-τρόποι εφαρμογής:

##### **ACTARA 25 WG:**

-Ψεκασμοί κάλυψης: δόση εφαρμογής 40 γραμ. σκευάσματος/100 lt ψεκ. υγρού (κατ’ ανώτατο όριο 400 γραμ./εκτάριο και εφαρμογή), δύο εφαρμογές max με μεσοδιάστημα 7-14 ημέρες.

-Ριζοπότισμα: δόση εφαρμογής 40 γραμ. σκευάσματος/100 lt ψεκ. υγρού, 1 εφαρμογή.

Έγχυση στον κορμό: 5-20 γραμ. ανά δένδρο, ανάλογα με το μέγεθός του. Δύο εφαρμογές max με μεσοδιάστημα 7-14 ημέρες.

##### **CONFIDOR 200 SL, KOHINOR 200 SL, TIDO 20 SL, CORSARIO, WARRANT 200 SL:**

-Ψεκασμοί κάλυψης: 50-75 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκαστικού υγρού

-Ριζοπότισμα: δόση εφαρμογής 0,8-1 lt σκευάσματος/στρ., με δύο εφαρμογές max και μεσοδιάστημα 30-40 ημέρες.

Έγχυση στον κορμό: 4-10 κ.εκ. ανά δένδρο, ανάλογα με το μέγεθός του. Δύο εφαρμογές max με μεσοδιάστημα 45-55 ημέρες. Στην περίπτωση της εφαρμογής με έγχυση δεν παρασκευάζουμε ψεκαστικό υγρό αλλά το προϊόν εφαρμόζεται (εγχύεται) αδιάλυτο.

##### **VERTIMEC 1,8 EC:**

Έγχυση στον κορμό κατά την περίοδο μετακίνησης του εντόμου: 20-80 ml αδιάλυτου προϊόντος ανά δένδρο (ανάλογα με το μέγεθός του), δύο εφαρμογές με μεσοδιάστημα 15-45 ημερών.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Να λαμβάνονται και άλλα μέτρα π.χ. μηχανική εξυγίανση, χρήση βιολογικών παραγόντων κ.λ.π. όπως προβλέπεται και στη φυτογυινομική νομοθεσία.

**2) Όροι και προϋποθέσεις για την κατ’ εξαίρεση έγκριση διάθεσης των σκευασμάτων:** Τα σκευάσματα θα χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις προφυλάξεις και οδηγίες χρήσεις που

αναγράφονται στις εγκρίσεις κυκλοφορίας τους, όπως ισχύουν σήμερα, και σύμφωνα με τη φυτοϋγειονομική νομοθεσία.

**3) Διαπίστωση του προβλήματος-εφαρμογή των σκευασμάτων:** η εφαρμογή των σκευασμάτων θα γίνεται **παρουσία Γεωπόνου**, ο οποίος θα επιβεβαιώνει την προσβολή από το *Rhynchosporium ferrugineus* (Olivier), θα επιβλέπει την κοπή και κάψιμο των φοινικόδενδρων και θα είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή των σκευασμάτων σύμφωνα με τους όρους της παρούσας απόφασης.

**4) α) Μέτρα πρόληψης της εξάπλωσης:**

- **Κατά την κοπή των φυτών:** ψεκασμός κάλυψης με ACTARA 25 WG ή imidacloprid (με ένα από τα σκευάσματα που αναγράφονται στην παρ. 1) στο κομμένο φυτό, στα κομμένα τεμάχια του φυτού, στη θέση κοπής του φυτού και στον τόπο γύρω από τη θέση κοπής.
- **Στο χώρο διατήρησης των ευπαθών φυτών (φυτώρια):** σε περίπτωση που υπάρχουν ύποπτα σημεία προσβολής στο χώρο ή στη γύρω περιοχή, προληπτική εφαρμογή με ψεκασμό κάλυψης των φυτών με ACTARA 25 WG ή imidacloprid (με ένα από τα σκευάσματα που αναγράφονται στην παρ. 1). Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: δύο (2).

**β) Μέτρα περιορισμού της εξάπλωσης (στην περίπτωση που επιβάλλεται να ληφθούν από την φυτοϋγειονομική νομοθεσία):**

- Ριζοπότισμα, με διασυστηματικό εντομοκτόνο (ACTARA 25 WG ή imidacloprid (με ένα από τα σκευάσματα που αναγράφονται στην παρ. 1)).
- Εγχύσεις στην περιοχή της στεφάνης ή στον κορμό των φοινικόδενδρων με διασυστηματικό εντομοκτόνο (ACTARA 25 WG ή imidacloprid (με ένα από τα σκευάσματα που αναγράφονται στην παρ. 1) ή VERTIMEC).

Οδηγίες για τον τρόπο εφαρμογής με έγχυση:

- α) μετριέται η περίμετρος του κορμού
  - β) ανοίγεται με τρυπάνι κατάλληλη οπή στον κορμό
  - γ) το βάθος της οπής πρέπει να είναι ίσο με το 1/3 της περιμέτρου του κορμού σε αυτό το σημείο και το πλάτος της να είναι περίπου 1 εκ.
  - δ) στην οπή που έχει δημιουργηθεί τοποθετείται κατάλληλη ειδική βαλβίδα εισροής που προστατεύει τους ιστούς του φοίνικα από κρυπτόγαμα παθογόνα και εμποδίζει την εκροή του υλικού. Η βαλβίδα παραμένει μετά το τέλος της εφαρμογής και για μεταγενέστερες εφαρμογές.
  - ε) Η ποσότητα που εγχύεται είναι ανάλογη με τον όγκο του φυτού (βλ. παρ. 1-δόσεις εφαρμογής).
- στ) Η έγχυση του υλικού γίνεται αργά και προσεκτικά για να μην υπάρξουν απώλειες.
- ζ) Τα δένδρα στα οποία έγινε η εφαρμογή επισημαίνονται με ανεξίτηλα καρτελάκια. Καταγράφονται σε πρωτόκολλα η ημερομηνία εφαρμογής, η ποσότητα που εγχύθηκε και οι επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες.

**5) Γνωστοποίηση ενεργειών στην Υπηρεσία:** οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων στις οποίες έγινε εφαρμογή εντομοκτόνου σκευάσματος σύμφωνα με τα ανωτέρω καθώς και οι αρμόδιοι Γεωπόνοι των Δήμων ή Κοινοτήτων (σε περίπτωση που η εφαρμογή έγινε σε κοινόχρηστους χώρους), υποχρεούνται να προσκομίσουν στη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής έκθεση, η οποία θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

- Το σκεύασμα που χρησιμοποιήθηκε.
- Η ποσότητα που απαιτήθηκε.
- Ο αριθμός των δένδρων ή των κομμένων δένδρων που ψεκάστηκαν.
- Έκθεση βεβαίωσης του γεωπόνου που επιβεβαίωσε το πρόβλημα και επέβλεψε τη διαδικασία.

**6) Περίοδος ισχύος της Απόφασης:** 120 ημέρες από την υπογραφή της.

**7) Περιορισμοί – Απαγορεύσεις - Προφυλάξεις:**

Ισχύουν οι αναγραφόμενοι περιορισμοί - απαγορεύσεις – προφυλάξεις της έγκρισης κυκλοφορίας κάθε σκευάσματος όπως ισχύει σήμερα, που αναγράφονται στην ετικέτα του.

Πλέον των ανωτέρω, να εφαρμοστούν οι ακόλουθοι περιορισμοί:

**Α) Τήρηση ζωνών ασφαλείας από τα επιφανειακά ύδατα:**

Δραστική ουσία	Εφαρμογή με ψεκασμό	Εφαρμογή με ριζοπότισμα	Εφαρμογή με έγχυση
thiamethoxam	10 μέτρα	Δεν απαιτείται	Μη προτεινόμενη χρήση
Imidacloprid	30 μέτρα	Δεν απαιτείται	Δεν απαιτείται
abamectin	Μη προτεινόμενη χρήση	Μη προτεινόμενη χρήση	Δεν απαιτείται

**Β)** Πριν από την εφαρμογή σε κοινόχρηστους χώρους, οι Δήμοι υποχρεούνται να προειδοποιούν τους περιοίκους για την επικείμενη εφαρμογή.

**Γ)** Τόσο οι Δήμοι όσο και οι ιδιώτες να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για την επισήμανση των περιοχών όπου έγινε εφαρμογή.

**Δ)** Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής να μην εισέρχονται άνθρωποι (πλην του ψεκαστή) και κατοικίδια ζώα στην ψεκαζόμενη περιοχή.

**Ε)** Σε κοινόχρηστους χώρους να μην εισέρχονται άτομα και κατοικίδια ζώα μέχρις ότου στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό.

**ΣΤ)** Για την επιλογή του κατάλληλου σκευάσματος σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τον υπεύθυνο Γεωπόνο οι ιδιαιτερότητες του χώρου που θα γίνει η εφαρμογή (π.χ. γειτνίαση με πάρκα, πλατείες, οικείες κλπ) καθώς και η τυχόν έντονη δυσάρεστη οσμή ορισμένων σκευασμάτων.

**Ζ)** Η εφαρμογή των σκευασμάτων σε κοινόχρηστους χώρους θα πραγματοποιείται με ευθύνη των κατά τόπους Δήμων και Κοινοτήτων, ενώ σε ιδιωτικούς χώρους με ευθύνη των ενδιαφερόμενων, οι οποίοι θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις του υπεύθυνου Γεωπόνου που επιβλέπει τη διαδικασία.

**Η)** Σε περίπτωση που απαιτείται χρήση φερομονικών παγίδων, αυτή να γίνεται μόνο με το συντονισμό των αρμοδίων τοπικών αρχών.

**Θ)** "Απαγορεύεται η εφαρμογή έγχυσης με μεθόδους που απαιτούν μόνιμη εγκατάσταση ψεκαστικού συστήματος στα φοινικόδενδρα".

**Ι) Προστασία μελισσών:**

**ACTARA:**

μην εφαρμόζετε το σκεύασμα στα φοινικόδενδρα όταν οι μέλισσες είναι σε φάση έντονης κινητικότητας.

Μην εφαρμόζεται σε περίπτωση που υπάρχει μεγάλη ποσότητα μελιτώματος αφίδων στην περιοχή εφαρμογής

**VERTIMEC:**

για την προστασία των μελισσών απομακρύνετε ή καλύψτε τα μελίτσια όσο διαρκεί η εφαρμογή και για 1-2 ώρες μετά από αυτή

ή

η εφαρμογή να γίνεται σε ώρες κατά τις οποίες οι μέλισσες δεν βρίσκονται στο χώρο (αργά το απόγευμα ή το ξημέρωμα)

Μην εφαρμόζεται σε περίπτωση που υπάρχει μεγάλη ποσότητα μελιτώματος αφίδων στην περιοχή εφαρμογής

**CONFIDOR 200 SL, KOHINOR 200 SL, TIDO 20 SL, CORSARIO, WARRANT 200 SL:**

Μην εφαρμόζεται σε περίπτωση που υπάρχει μεγάλη ποσότητα μελιτώματος αφίδων στην περιοχή εφαρμογής

**ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:** Στους φοίνικες για καλλωπιστική χρήση κόψτε τα άνθη πριν την εφαρμογή.

- 8) **Φυτοτοξικότητα:** στην περίπτωση προληπτικής εφαρμογής στο χώρο διατήρησης των ευπαθών φυτών (φυτώρια) καθώς και στην περίπτωση εφαρμογής για τον περιορισμό της εξάπλωσης, να γίνεται αρχικά δοκιμαστική εφαρμογή του σκευάσματος που θα χρησιμοποιηθεί σε μικρή έκταση, για την αποφυγή κινδύνου φυτοτοξικότητας.
- 9) **Γενικές υποχρεώσεις:** Οι Δήμοι, οι Κοινότητες και οι ιδιώτες που θα εφαρμόσουν σκευάσματα για τον έλεγχο του *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier) σύμφωνα με τα ανωτέρω, είναι υποχρεωμένοι να ενημερώσουν την Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον, που θα περιέλθουν σε γνώση τους, από την εν λόγω χρήση των προϊόντων. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά. Η ευθύνη για την αποτελεσματικότητα κάθε σκευάσματος και τις τυχόν παρενέργειές του, ανήκει στον αντίστοιχο κάτοχο κάθε έγκρισης, όπως ισχύουν σήμερα.

**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

**Κ. ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ**



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΣΤ. ΣΕΝΗ