



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ**

**Αθήνα, 8-11-2011
Αριθ. πρωτ: 102387**

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος
Τηλέφωνο: 210 928 72 11
e-mail: syg046@minagric.gr

Προς: CHEMINOVA A/S, Δανίας
(δια του κ. Γιώργου Γαλένου,
Αρτάκης 93, 171 24-Ν. Σμύρνη)
(με απόδειξη)

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ.
14199/10.09.2007 έγκρισης του
φυτοπροστατευτικού προϊόντος
(εντομοκτόνο) WARRANT 200 SL,
ως προς την εγγυημένη σύνθεση,
τον τρόπο και χρόνο εφαρμογής, τις
παρατηρήσεις του φάσματος
δράσης, τις φράσεις κινδύνου (R)
και τις φράσεις προφύλαξης (S) »

- Κοιν.:**
1. Γραφείο κ. Υπουργού
 2. Γραφείο κ. Υφυπουργού
 3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
 4. Γραφείο Προϊσταμένου Γενικής
Δ/σης Φυτικής Παραγωγής
 5. Περιφερειακές Ενότητες
Δ/σεις Αγροτικής Οικονομίας
& Κτηνιατρικής (με e-mail)
 6. Μ.Φ.Ι.
Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών
Φαρμάκων (με e-mail)
 7. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.
Έδρες τους (με e-mail)
 8. Ε.ΣΥ.Φ.
Πατησίων 53, 104 33 – Αθήνα
 9. Εσωτερική διανομή:
-Τμήματα Β', Γ' & Ε' της
Δ/σής μας
 - 10 Π.Ο.Σ.Ε. Γεωπόνων
Λιδότου 26, Αθήνα

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Κανονισμού 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 80.
2. Τις διατάξεις της με αριθ. 190688/10.11.2010 ΚΥΑ (Β' 1773) με θέμα την "Τροποποίηση του παραρτήματος Ι του Π.Δ. 115/1997 (Α' 104) όσον αφορά τους ιδιαίτερους όρους για τις ουσίες clothianidin, thiamethoxam, fipronil και imidacloprid, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2010/21/ΕΕ της Επιτροπής της 12^{ης} **Μαρτίου** 2010".
3. Το από 21/9/2010 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Ομάδας Οικοτοξικολογικού Ελέγχου φυτοπροστατευτικών προϊόντων της υπηρεσίας μας.
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 89/2010 (Α' 154) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2011 (Α' 145) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
6. Τη με αριθ. 155540/30.6.2011 (Β' 1588) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για “ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ιωάννη Δριβελέγκα”.
7. Τις με αριθ. πρωτ. 189224/24.9.2010, 189515/6.10.2010 και 92913/4.2.2011 αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- I. Τροποποιούμε την με αριθ. **14199** έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) **WARRANT 200 SL**, η οποία χορηγήθηκε με τη με αριθ. 121338/10.9.2007 Απόφασή μας και τροποποιήθηκε-αναμορφώθηκε μετά την καταχώριση της δραστικής ουσίας imidacloprid στο παράρτημα I του Π.Δ. 115/97 με τη με αριθ. 187495/29.7.2010 Απόφασή μας, ως προς την εγγυημένη σύνθεση, τον τρόπο και χρόνο εφαρμογής, τις παρατηρήσεις του φάσματος δράσης, τις φράσεις κινδύνου (R) και τις φράσεις προφύλαξης (S).
Συγκεκριμένα, οι παράγραφοι 1.4στ, 5, 10 και 11 της με αριθ. 187495/29.7.2010 Απόφασής μας, διαμορφώνονται ως ακολούθως:

1.4στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία: imidacloprid 20% β/ο
 Βοηθητικές ουσίες: **82,6%** β/β
 Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος έχει υποβληθεί στην υπηρεσία μας με τη με αριθ. 92913/4.2.2011 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

5 5.1 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκαστικού υγρού/ στρέμμα	κ.εκ./ στρέμμα		
Εσπεριδοειδή: Πορτοκαλιά, Λεμονιά, Μανταρινιά, Γκρέιπ-φρούτ	-Εριώδης αλευρώδης (<i>Aleurothrixus floccosus</i>)	75	200-400	150-300	Ψεκασμός φυλλώματος. Εφαρμόζεται στο χρονικό διάστημα Απριλίου-Σεπτεμβρίου με την εμφάνιση των νυμφών του εντόμου (στάδια L1 και L2).	2 εφαρμογές ανά 20-30 ημέρες
	-Φυλλοκνίστης (<i>Phyllocnistis citrella</i>)	50-75*	200-400	100-300	Ψεκασμός φυλλώματος με την έναρξη της προσβολής.	

Αχλαδιά	Ψύλλα αχλαδιάς (<i>Cacopsylla pyri</i>)	60	150	90	Με την έναρξη της προσβολής Μπορεί να εφαρμοστεί στις εξής περιόδους: Προανθικά μέχρι το στάδιο έναρξης της λευκής κορυφής (BBCH: 54) και μετά την καρπόδεση έως την έναρξη αλλαγής χρώματος (BBCH 71-79)	1
Ροδακινιά	-Αφίδες (<i>Myzus persicae</i> , <i>M. nicotianae</i>)	25-30*	150-250	37,5-75	Με την έναρξη της προσβολής. Μπορεί να εφαρμοστεί στις εξής περιόδους: Προανθικά μέχρι το στάδιο έναρξης της ρόδινης κορυφής (BBCH: 54) και μετά την καρπόδεση έως την έναρξη αλλαγής χρώματος (BBCH 71-79)	2 εφαρμογές ανά 28 ημέρες
Τομάτα υπαίθρου	-Αφίδες (<i>Macrosiphum euphorbiae</i>) -Αλευρώδης (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	50	50-100	25-50	Ψεκασμός φυλλώματος με την έναρξη της προσβολής.	2 εφαρμογές ανά 14 ημέρες
Τομάτα θερμοκηπίου	-Αλευρώδης (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	---	---	75-125 (5)	Με το νερό της άρδευσης με την έναρξη της προσβολής.	2 εφαρμογές ανά 14 ημέρες
Αγγούρι (θερμοκηπίου και υπαίθρου)	Αλευρώδης (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	---	---	75-125 (5)	Με το νερό της άρδευσης με την έναρξη της προσβολής.	2 εφαρμογές ανά 14 ημέρες
Βαμβάκι	Αφίδες (<i>Aphis gossypii</i>)	62,5-100	50-80	50	Με την έναρξη της προσβολής	2 εφαρμογές ανά 14 ημέρες
Πατάτα	-Αφίδες (<i>Macrosiphum euphorbiae</i>) -Δορυφόρος (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>)	50-100	50-100	50	Με την έναρξη της προσβολής και μέχρι 4 αφίδες ανά φύλλο. Να μην εφαρμόζεται όταν υπάρχει μελίτωμα.	2 εφαρμογές ανά 14 ημέρες
Καπνός	-Αφίδες (<i>Myzus persicae</i> , <i>M. nicotianae</i>)	25-60	50-100	25-30	Με την εμφάνιση της προσβολής.	2 εφαρμογές ανά 20-30 ημέρες
		---	---	50-100 (5)	Με πότισμα κατά τη μεταφύτευση	1

*: το εύρος της δόσης εξαρτάται από το στάδιο ανάπτυξης των φυτών και από την ένταση της προσβολής

Παρατηρήσεις:

- (1): Στα εσπεριδοειδή σε προγράμματα ολοκληρωμένης αντιμετώπισης συνιστάται να εφαρμόζεται όταν υπάρχει μικρός πληθυσμός ακμαίων του παρασίτου *Cales noacki* ωρίμων για ωοτοκία.
- (2): Στα εσπεριδοειδή σε περίπτωση προχωρημένης προσβολής (μικτός πληθυσμός, παρουσία μελιτωμάτων) ο ψεκασμός επαναλαμβάνεται 20-30 ημέρες από τον προηγούμενο.
- (3): Στα εσπεριδοειδή για την καταπολέμηση του Φυλλοκνίστη (*Phyllocnistis citrella*) η μικρή δόση συνιστάται για μικρή πίεση προσβολής ενώ η μεγάλη δόση για μεγάλη πίεση προσβολής.
- (4) Στις περιπτώσεις εφαρμογής με ριζοπότισμα, το εύρος των δόσεων εξαρτάται από την πυκνότητα των φυτών.
- (5) **Να μην εφαρμόζεται το σκεύασμα όταν οι μέλισσες είναι σε φάση έντονης κινητικότητας.**
- (6) **Να μην εφαρμόζεται το σκεύασμα κατά την περίοδο της άνθησης.**
- (7) **Να μην εφαρμόζεται το σκεύασμα σε περίπτωση που εμφανίζεται μελίτωμα (π.χ. περισσότερο από 4 αφίδες ανά φύλλο).**

10 Φράσεις R

Spe8: Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία ή κατά την περίοδο ανθοφορίας των ζιζανίων. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν Απομακρύνετε ή και καταστρέψτε τα ζιζάνια πριν την ανθοφορία τους.

Βλαβερό για τα πουλιά.

11. Φράσεις S

Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία:

S1/2 Να φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά

S13 Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

S20/21 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε

S23 Μην αναπνέετε το ψεκαστικό νέφος

S24/25 Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια και το δέρμα.

S36/37 Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια

S51 Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο

Πλύνετε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε και μετά τον ψεκασμό

<<Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, να συμμορφώνεστε με τις οδηγίες χρήσης >>.

Π. Ως προς τα λοιπά στοιχεία ισχύει η με αριθ. 121338/10.9.2007 Απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε-αναμορφώθηκε με τη με αριθ. 187495/29.7.2010 Απόφασή μας και ισχύει σήμερα.

**Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΣΤ. ΣΕΝΗ