



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 02.02.2024
Αριθ. πρωτ: 701/17556

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Δ. Μακρογιάννη
Τηλέφωνο: 210 9287160
e-mail: dmakrogianni@minagric.gr

Προς: Trifolio-M GmbH, Γερμανίας
(Δια του υπεύθυνου επικοινωνίας
ΤΟΥΤΟΥΤΖΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ και ΣΙΑ
Ε.Ε – “AGRIBIZ”)
e-mail: info@agribiz.gr

ΘΕΜΑ: «Διεύρυνση της με αριθ. 14776 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) NeemAzal T/S (azadirachtin A 1% β/ο) σε ήσσονος σημασίας χρήσεις»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις:
 - Του ν. 4036/2012 (Α'8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - Του ν. 2690/1999 (Α'45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 - Του ν. 4622/2019 (Α'133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
- Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 51 αυτού.
- Το αριθμ. 79/27.06.2023 Π.Δ. «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.» (Α'131/27.06.2023).
- Την αριθμ. 10088/115732/26.09.2013 Υπουργική απόφαση (Β'2587) σχετικά με την «Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσονος σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσονος σημασίας».
- Την αριθμ. 1881/286212/13.10.2020 Απόφαση Υπουργού “Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση” (Β'4612/19.10.20).
- Το αριθμ. 12862/330936/07.12.2020 έγγραφο της Υπηρεσίας με θέμα «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά».
- Την αριθμ. 3171/90397/04.06.2021 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 14776 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) NeemAzal T/S (azadirachtin A 1% β/ο), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

8. Την αριθμ. 701/17556/19.01.2024 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Διευρύνουμε τη με αριθ. 14776 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) NeemAzal T/S (azadirachtin A 1% β/ο), που χορηγήθηκε με την αριθμ. 3171/90397/04.06.2021 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε ήσσονος σημασίας χρήσεις.

Το σημείο 5 διαμορφώνεται ως εξής:

5 Φάσμα δράσης						
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής	Μεγ. αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/ Μεσοδιάστημα (ημέρες)
		κ.εκ./ στρ.	κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ		
Τομάτα (Υ) LYPES Πιπεριά (Υ) CPSAN Μελιτζάνα (Υ) SOLME	Θρίπες <i>Frankliniella occidentalis</i> FRANOC <i>Thrips tabaci</i> THRITB <i>Thrips sp.</i> THRISP Πράσινο σκουλήκι <i>Helicoverpa armigera</i> HELIAR Σποντόπτερα <i>Spodoptera exigua</i> LAPHEG Χρήση ήσσονος σημασίας: <i>Spodoptera frugiperda</i> * LAPHFR	200-300	--	50-150	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής μέχρι το 50% των καρπών να έχουν ωριμάσει (μέχρι BBCH 85)	3/7-10
Τομάτα (Θ) LYPES Πιπεριά (Θ) CPSAN Μελιτζάνα (Θ) SOLME	Αλευρώδεις <i>Trialeurodes vaporariorum</i> TRIAVA <i>Bemisia tabaci</i> BEMITA Θρίπες <i>Frankliniella occidentalis</i> FRANOC <i>Thrips tabaci</i> THRITB <i>Thrips sp.</i>	200-300	--	50-150	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής μέχρι το 50% των καρπών να έχουν ωριμάσει (μέχρι BBCH 85)	3/7-10

	THRISP Φυλλοκνίστες <i>Tuta absoluta</i> GNORAB <i>Liriomyza</i> sp. LIRISP Χρήση ήσσονος σημασίας: <i>Spodoptera frugiperda</i> * LAPHFR					
Μελιτζάνα (Υ,Θ) SOLME	Δορυφόρος <i>Leptinotarsa decemlineata</i> LPTNDE	200-300	--	50-150	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής μέχρι το 50% των καρπών να έχουν ωριμάσει (μέχρι BBCH 85)	3/7-10
Αγγούρι (Θ) CUMSA Κολοκυθάκι (Θ) CUUPG	Αφίδες <i>Aphis gossypii</i> APHIGO <i>Myzus persicae</i> MYZUPE Αλευρώδεις <i>Trialeurodes vaporariorum</i> TRIAVA <i>Bemisia tabaci</i> BEMITA Θρίπες <i>Frankliniella occidentalis</i> FRANOC <i>Thrips tabaci</i> THRITB <i>Thrips</i> sp. THRISP Χρήση ήσσονος σημασίας: <i>Spodoptera frugiperda</i> * LAPHFR	200-300	--	50-150	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής μέχρι το 50% των καρπών να έχουν ωριμάσει (μέχρι BBCH 85)	3/7-10
Ροδακινιά PRNPS Βερυκοκιά PRNAR	Αφίδες <i>Myzus persicae</i> MYZUPE Θρίπες <i>Frankliniella</i>	200-300	--	50-150	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής έως την ωρίμανση	3/7-10

	<i>occidentalis</i> FRANOC <i>Thrips sp.</i> THRISP Χρήση ήσσονος σημασίας: <i>Spodoptera frugiperda</i> * LAPHFR				(μέχρι BBCH 85)	
Μηλιά MABSD	Αφίδες <i>Aphis pomi</i> APHIPO <i>Dysaphis plantaginea</i> DYSAPL <i>Eriosoma lanigerum</i> ERISLA Χρήση ήσσονος σημασίας: <i>Spodoptera frugiperda</i> * LAPHFR	200-300	--	50-150	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής έως την ωρίμανση (μέχρι BBCH 85)	3/7-10
Καλλωπιστικά (Υ)	Αφίδες <i>Aphis gossypii</i> APHIGO <i>Myzus persicae</i> MYZUPE Αλευρώδεις <i>Trialeurodes vaporariorum</i> TRIAVA <i>Bemisia tabaci</i> BEMITA Θρίπες <i>Frankliniella occidentalis</i> FRANOC <i>Thrips tabaci</i> THRITB <i>Thrips sp.</i> THRISP Πράσινο σκουλήκι <i>Helicoverpa armigera</i> HELIAR Σποντόπτερα <i>Spodoptera exigua</i> LAPHEG	200-300	--	50-150	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής (μέχρι BBCH 85)	3/7-10

	<p>Χρήση ήσσονος σημασίας: <i>Spodoptera frugiperda</i> * LAPHFR</p>					
Καλλωπιστικά (Θ)	<p>Αφίδες <i>Aphis gossypii</i> APHIGO <i>Myzus persicae</i> - MYZUPE</p> <p>Αλευρώδεις <i>Trialeurodes vaporariorum</i> TRIAVA <i>Bemisia tabaci</i> BEMITA</p> <p>Θρίπες <i>Frankliniella occidentalis</i> FRANOC <i>Thrips tabaci</i> THRITB <i>Thrips</i> sp. THRISP</p> <p>Φυλλοκνίστες <i>Liriomyza</i> sp. LIRISP <i>Phytomyza</i> sp. PHYYSF</p> <p>Χρήση ήσσονος σημασίας: <i>Spodoptera frugiperda</i> * LAPHFR</p>	200-300	--	50-150	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής (μέχρι BBCH 85)	3/7-10
Αμπέλι VITVI (μόνο επιτραπέζιες ποικιλίες)	<p>Τζιτζικάκια <i>Empoasca vitis</i> EMPOFL <i>Scaphoideus titanus</i> SCAPLI</p>	200-300	150-300	30-100	Ψεκασμός φυλλώματος από την έκπτυξη του πρώτου φύλλου μέχρι την έναρξη της καρπόδεσης BBCH 11-71	3/7-10
	<p>Κοκκοειδή <i>Pulvinaria vitis</i> PULVVI</p> <p>Χρήση ήσσονος σημασίας: <i>Spodoptera frugiperda</i> * LAPHFR</p>					2/7-10

Φράουλα (Υ) FRAAN	Αφίδες <i>Aphis</i> sp. 1APHIG Χρήση ήσσονος σημασίας: <i>Spodoptera frugiperda</i> * LAPHFR	200-300	150-300	30-100	Ψεκασμός φυλλώματος από την έκπτυξη του 1 ^{ου} φύλλου μέχρι την εμφάνιση του 1 ^{ου} θυγατρικού φυτού και από την πλήρη άνθηση μέχρι τη συγκομιδή του 2 ^{ου} χεριού (οι περισσότεροι καρποί έχουν αποκτήσει το τυπικό χρώμα της ποικιλίας) BBCH 11-42 και 65-89	2/7-10
Πεπόνι (Υ) CUMME Κολοκύθα (Υ) CUUPE Καρπούζι (Υ) CITLA	Αφίδες <i>Aphis gossypii</i> APHIGO Χρήση ήσσονος σημασίας: <i>Spodoptera frugiperda</i> * LAPHFR	200-300	150-300	30-100	Από την ολοκλήρωση της ανάπτυξης των βλαστών μέχρι την πλήρη ωρίμαση του καρπού. BBCH 40-89	2/7-10

Παρατηρήσεις:

1. Να εφαρμόζετε κατά τις δροσερές και σκιερές ώρες της ημέρας.
2. Να ψεκάζετε απουσία ανέμου.
3. Η δόση μεταξύ 200-300κ.εκ. ανά στρέμμα εξαρτάται από το επίπεδο της προσβολής.
4. Πριν τη χρήση του σκευάσματος στα καλλωπιστικά να προηγείται δοκιμαστική εφαρμογή σε μικρή κλίμακα για τον έλεγχο φυτοτοξικότητας.
5. Να προηγείται δοκιμαστική εφαρμογή στις ποικιλίες αμπελιού Κορινθιακή σταφίδα και Σουλτανίνα. Στις ποικιλίες αυτές δεν είναι αποδεδειγμένη η απουσία φυτοτοξικότητας.

***Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα κατά του *Spodoptera frugiperda* στις καλλιέργειες: τομάτας (Υ+Θ), πιπεριάς (Υ+Θ), μελιτζάνας (Υ+Θ), αγγουριού (Θ), κολοκυθίου (Θ), πεπονιού (Υ), καρπουζιού (Υ), κολοκύθας (Υ), ροδακινιάς, βερικοκιάς, μηλιάς, αμπελιού, φράουλας (Υ) και καλλωπιστικών (Υ+Θ). Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα από τη χρήση του σκευάσματος**

II. Διάθεση αποθεμάτων

1. Η ετικέτα του σκευάσματος να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
2. Για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, επιτρέπεται η τοποθέτηση στις συσκευασίες του σκευάσματος της μέχρι σήμερα ισχύουσας ετικέτας.
3. Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις συσκευασίες του σκευάσματος θα τοποθετείται υποχρεωτικά η νέα τροποποιημένη ετικέτα.

- III. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 3171/90397/04.06.2021 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ