



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ**

Αθήνα, 17 - 2 - 2009
Αριθ. πρωτ: 125750

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Χ. Παναγοπούλου
Τηλέφωνο: 210 92 87 161
e-mail: syg036@minagric.gr

Προς: ΝΤΥ ΠΟΝΤ ΑΓΚΡΟ
ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Σολωμού 12 & Βας. Γεωργίου
15232 Χαλάνδρι

(με απόδειξη)

ΘΕΜΑ: “Χορήγηση προσωρινής έγκρισης
διάθεσης στην αγορά στο
φυτοπροστατευτικό προϊόν
(μυκητοκτόνο TALENDO 20 EC)”

Κοιν.:

- 1 Γραφείο Γ.Γ. κ. Κ. Σκιαδά
- 2 Νομαρχ. Αυτοδιοικήσεις
Δ/νσεις Γεωργίας (με e-mail)
Έδρες τους
- 3 Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό
Ινστιτούτο
Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών
Φαρμάκων
Εκάλης 2, 14561 Κηφισιά
- 4 Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.
Έδρες τους
- 5 ΕΣΥΦ
Πατησίων 53, 104 33 - Αθήνα
- 6 Εσωτερική διανομή:
-Τμήματα Β', Γ' & Ε' της
Δ/νσής μας
-Γραμματεία της Δ/νσής μας
- 7 Π.Ο.Σ.Ε. Γεωπόνων
Λιδότου 26, Αθήνα

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 115 (ΦΕΚ 104/Α/30.5.1997) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου», όπως έχει συμπληρωθεί και ειδικότερα το άρθρο 8 παρ. (1).
2. Τη με αριθ. 83345/28-7-88 (ΦΕΚ 599/Β/24-8-88) Απόφαση του Υπ. Γεωργίας όσον αφορά «τον καθορισμό και την τυποποίηση της σήμανσης και των προφυλάξεων των γεωργικών φαρμάκων», όπως ισχύει σήμερα και τη με αριθ. 265/3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β/19-9-2002) Απόφαση του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών περί «Ταξινόμησης, συσκευασίας και επισήμανσης των επικίνδυνων παρασκευασμάτων σε εναρμόνιση προς την Οδηγία 1999/45 (ΕΕ L 200 της 30.7.1999) του Ευ. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως ισχύει σήμερα.
3. Την Απόφαση του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με αριθ. 119119/19-7-2004 (ΦΕΚ 1177/Β/2-8-2004) για την «Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Π.Δ. 115/1997, Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων (Α΄ 104), σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2003/82/ΕΚ της Επιτροπής».
4. Την Απόφαση του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με αριθ. 124831/12-12-2007 (ΦΕΚ 2466/Β/31-12-2007) για την «χορήγηση προσωρινών εγκρίσεων κυκλοφορίας σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα»
5. Τον κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου , όπως τροποποιήθηκε με το SANCO doc.357 /rev.3/ 2008
6. Την έγκριση του από την Ιταλία και την μονογραφία του Η.Β..
7. Το Π.Δ. 4/2009 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 2 Α΄).
8. Τη με αριθ. 147/19.1.2009 (ΦΕΚ 67 Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για "ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κωνσταντίνο Κιλτίδη και Μιχαήλ Παπαδόπουλο
9. Τη με αριθ. 263545/4-1-2008 (ΦΕΚ 47/Β΄/18-1-2008) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα, Προϊστάμενους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊστάμενους Διεύθυνσης και Προϊστάμενους Τμήματος της εξουσίας να υπογράφουν με «Εντολή Υπουργού».
10. Την με αριθ. πρωτ. 116710/5-3-2008 αίτηση της εταιρείας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

A Χορηγούμε προσωρινή έγκριση διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το ΠΔ 115/97, άρθρο 8 παρ.(1), στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **TALENDO 20 EC** της εταιρείας NTY PONT ΑΓΚΡΟ Α.Ε. με τα ακόλουθα στοιχεία:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

1.1 Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας (ΑΕΚ)

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης

60.250

17-2-2009

17-2-2012

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

1.2.α Εμπορικό όνομα

1.2.β Μορφή

TALENDO

Γαλακτωματοποιήσιμο Υγρό (EC)

1.3 Δραστική ουσία

α) Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO

Proquinazid

(ομάδα πυριδαζιόνες)

β) Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

95% min

γ) Παρασκευαστής της δ.ο.:

DuPont de Nemours S.A.S ΓΑΛΛΙΑΣ.

δ) Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης
DuPont Iberica SL Ισπανίας

(η Δ/ση του εργοστασίου είναι εμπιστευτική πληροφορία και βρίσκονται στο Παράρτημα I της παρούσας).

ε) Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας **Proquinazid** προσδιορίζονται στην αίτηση της εταιρείας με αρ. πρωτ όπως 121040/8-8-2006, αναφέρονται στο Annex C του DAR/Δεκέμβριος 2007 και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

- α) Κάτοχος της έγκρισης¹:
- | |
|--|
| <p>NTY PONT ΑΓΚΡΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
 Σολωμού 12 & Βας. Γεωργίου
 Χαλάνδρι
 ΑΜΕ²:
 Τ.Κ. 152 32
 Τηλ.: 210-688 9700
 Fax: 21-688 9799
 E-mail: Yannis.Diokarantos@grc.dupont.com</p> |
|--|
- β) Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση (εφόσον είναι διαφορετικός από τον κάτοχο της έγκρισης)
- | |
|-------------------------------|
| <p>Ο κάτοχος της έγκρισης</p> |
|-------------------------------|
- γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:
- | |
|--|
| <p>DuPont de Nemours S.A.S ΓΑΛΛΙΑΣ</p> |
|--|
- δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος
- | |
|---|
| <p>Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης
 DuPont de Nemours S.A.S ΓΑΛΛΙΑΣ

 (η Δ/ση του εργοστασίου είναι εμπιστευτική πληροφορία και βρίσκονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας).</p> |
|---|
- ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος
- | |
|--|
| <p>DuPont de Nemours S.A.S ΓΑΛΛΙΑΣ</p> |
|--|
- στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:
- | |
|--|
| <p>Proquinazid 20% β/ο
 Βοηθητικές ουσίες 78,43% β/β
 Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος προσδιορίζεται στην αίτηση της εταιρείας με αρ. πρωτ. 121040/8-8-2006, αναφέρονται στο Annex C του DAR/Δεκέμβριος 2007 και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής</p> |
|--|

¹ Είναι ο αιτών και έχει έδρα σε κάποιο ΚΜ της ΕΕ.

² Αριθμός Μητρώου Εταιρείας (ΑΜΕ)

2

Συσκευασίες

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλες	50ml, 100ml, 250ml	PET (polyethylene terephthalate) Κάθε μια φιάλη βρίσκεται εντός χάρτινου κουτιού (εσωτερικό κουτί). Κάθε χαρτοκιβώτιο (outer box) περιέχει 10 εσωτερικά κουτιά
4	Φιάλες	1L	High density polyethylene (HDPE) coextruded with EVOH Οι φιάλες συσκευάζονται σε χαρτοκιβώτια ανα 10

Οδηγίες χρήσης:

Τρόπος εφαρμογής:

Για την καταπολέμηση του ωιδίου της αμπέλου (*Uncinula necator*), πραγματοποιούνται προληπτικοί ψεκασμοί φυλλώματος με **25κ.εκ σκευάσματος ανά 100 λίτρα** ψεκαστικού διαλύματος, εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας (η πρώτη εφαρμογή στα 3 φύλλα της καλλιέργειας μέχρι το στάδιο της πλήρους ανάπτυξης των τσαμπιών και 28 ημερών πριν τη συγκομιδή) και σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

Πριν από την εφαρμογή βεβαιωθείτε ότι το ψεκαστικό μηχάνημα είναι καθαρό και κατάλληλα ρυθμισμένο.

Στην περίπτωση υδραυλικού ψεκαστήρα εφαρμόστε το TALENDO 20EC με όγκο ψεκαστικού υγρού από 500 έως 1500 L/ha.

Ο όγκος της εφαρμογής θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένος στην πυκνότητα του φυλλώματος στο οποίο πρόκειται να γίνει εφαρμογή.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ:

Αμέσως μετά την εφαρμογή αδειάστε τελείως τον ψεκαστήρα. Αφαιρέστε και καθαρίστε χωριστά με άφθονο νερό τα μπέκ και τα φίλτρα. Ξεπλύντε σχολαστικά το βυτίο και όλα τα μέρη του ψεκαστικού με καθαρό νερό αφαιρώντας όλα τα ορατά υπολείμματα. Ξεπλύντε όλο το ψεκαστικό μηχάνημα με καθαρό νερό. Λάβετε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις όταν καθαρίζετε το ψεκαστικό μηχάνημα. Μην καθαρίζετε τον ψεκαστικό εξοπλισμό και μη ρίχνετε τα νερά του καθαρισμού κοντά σε πηγάδια ή σε υδάτινες επιφάνειες. Ξεπλύντε 3 φορές τα κενά υλικά συσκευασίας και ρίξτε τα νερά στο ψεκαστικό. Μην ξαναχρησιμοποιείτε τα κενά υλικά συσκευασίας γι οποιαδήποτε άλλη χρήση. Τρυπήστε ή κάψτε τα κενά υλικά συσκευασίας ή απομακρύνετε τα με άλλο τρόπο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Κατηγορία και

Μυκητοκτόνο επαφής με προληπτική δράση, για την καταπολέμηση του

τρόπος δράσης:	<p>Ωίδιο (<i>Uncinula necator</i>) στο αμπέλι</p> <p>Το TALENDO 20 EC περιέχει (proquinazid), ένα νέο μυκητοκτόνο της κατηγορίας των κουιναζολινών με καινοτόμο τρόπο δράσης.</p> <p>Το Proquinazid δρα προληπτικά παρεμποδίζοντας την βλάστηση των σπορίων και το σχηματισμό απρεσσορίων του μήκτα</p>
----------------	---

5 5.1 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μεσοδιάστημα εφαρμογών	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		Κ.εκ/ στρέμμα (max)	Κ.εκ/ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λιτρα / στρέμμα			
Αμπέλι	Ωίδιο (<i>Uncinula necator</i>)	37,5	25	50-150	Προληπτικοί ψεκασμοί φυλλώματος, μεταξύ του σταδίου των 3 φύλλων έως και 28 ημέρες πριν την συγκομιδή	14 ημέρες	3

Παρατηρήσεις

Μέγιστη δόση εφαρμογής ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης της καλλιέργειας

Από τα τρία φύλλα ως την έναρξη της άνθισης 12,5 κ.εκ /στρ

Από την έναρξη της άνθισης έως τον σχηματισμό των καρπών 20 κ.εκ./στρ

Από την έναρξη σχηματισμού των καρπών έως 28 ημέρες πριν τη συγκομιδή 37,5 κ.εκ./στρ

6 Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτογείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

Διαχείριση Ανθεκτικότητας :

Προληπτικές επεμβάσεις στα πρώτα στάδια ανάπτυξης των παθογόνων

Μέγιστος αριθμός επεμβάσεων/καλλιεργητική περίοδο : 3

Εναλλαγή με μυκητοκτόνα διαφορετικού τρόπου δράσης τα οποία καταπολεμούν το Ωίδιο

Εάν η ασθένεια έχει εγκατασταθεί, το TALENDO 20 EC να εφαρμόζεται σε μίγμα ή μετά από ωιδιοκτόνα που έχουν θεραπευτική δράση

7. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας

-

- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν

-

- της πρόσβασης του **ανθρώπου**
ή των **ζώων** στην καλλιέργεια
στην οποία έχει εφαρμοστεί το
σκεύασμα

-

8 Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.	Το φυτοπροστατευτικό προϊόν TALENDO 20EC, δεν προκαλεί συμπτώματα φυτοτοξικότητας, όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης
---	---

Σήμανση σκευάσματος:	Xn: ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ N: ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
----------------------	--

Φράσεις R	R40: Υποπτο καρκινογένεσης R41: Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών R38: Ερεθίζει το δέρμα R50-53: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον
------------------	--

Φράσεις S	S1/2: Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά S13: Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές S20/21: Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε S46: Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα S36/37/39: Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου S60 Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους ως επικίνδυνα απόβλητα. S61 Αποφύγετε τη ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες /δελτίο δεδομένων ασφαλείας. SP1 ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Η ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ. SPe3 Για να προστατεύσετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας 16 μέτρων μέχρι τα επιφανειακά ύδατα <i>«Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης»</i>
------------------	---

12 Πρώτες βοήθειες -	Σε περίπτωση εισπνοής: Μετακινήστε τον ασθενή σε καθαρό αέρα.
-----------------------------	--

Αντίδοτο	<p>Χορηγήστε οξυγόνο και αν χρειάζεται να γίνει τεχνητή αναπνοή. Αν τα συμπτώματα επιμένουν, καλέστε ιατρική βοήθεια</p> <p>Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύντε αμέσως καλά με άφθονο νερό και σαπούνι. Αν τα συμπτώματα επιμένουν συμβουλευτείτε γιατρό.</p> <p>Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύντε αμέσως με άφθονο νερό και κάτω από τα βλέφαρα. Κρατήστε τα μάτια ανοιχτά καθ' όλη τη διάρκεια. Αν ο ερεθισμός επιμένει, συμβουλευτείτε γιατρό.</p> <p>Σε περίπτωση κατάποσης: Ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια. Χορηγήστε 1-2 ποτήρια νερό εφόσον ο ασθενής έχει τις αισθήσεις του. Μην προκαλέσετε εμετό, χωρίς ιατρική συμβουλή. Να μην χορηγηθεί τίποτα σε αναισθητο άτομο.</p> <p>Αντίδοτο: Δεν υπάρχει αντίδοτο.</p> <p>ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ : (210) 7793777</p>
----------	---

13

Προστασία των καταναλωτών

13.1

Προτεινόμενα Μέγιστα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs)

Proquinazid

Φυτικά προϊόντα	Προσωρινά σε mg/kg
Έχουν οριστεί προσωρινά Ευρωπαϊκά υπολείμματα με τον κανονισμό 396/2005	

13.2 Τελευταία επέμβαση

πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Αμπέλι	28

14

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος

Όταν αποθηκεύεται καλά κλειστό στην αρχική συσκευασία σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο, το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια

15

Ανάκληση της έγκρισης-παράταση της έγκρισης


Η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

B**Γενικές υποχρεώσεις**

1. Ο κάτοχος της έγκρισης είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθαν σε γνώση του από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με το άρθρο 16 του ΠΔ 115/1997 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην Αρμόδια Αρχή τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κ. ΣΚΙΑΔΑΣ



ΕΝΤΥΠΟ ΟΡΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Γεωργικό (ά) Φάρμακο (ά) (κοινή ονομασία)

EEC No (α)

Εμπορικό (ά) όνομα (τα)

Κύρια χρήση π.χ. εντομοκτόνο, μυκητοκτόνο

proquinazid

:

TALENDO 20 EC

Ημερομηνία:

Σελίς :

Χώρα :

ΕΛΛΑΔΑ

Μυκητοκτόνο

1	2	3	4	5	6		7				8			9	10
Καλλιέργεια Και/ή Συνθήκες χρήσης	Κράτος Μέλος ή χώρα	Εμπορικό όνομα του σκεύασμα-τος	(A) (Θ) ή (K)	Εχθρός, ομάδα εχθρών ή ασθενειών ή ζιζανίων που ελέγχονται	Σκεύασμα		Εφαρμογή				Δοσολογία ανά επέμβαση			Τελευταία Επέμβαση πριν τη συγκομιδή (ημέρες)	Παρατη- ρήσεις
(α)			(β)	(γ)	Μορφή (δ-στ)	Περιεκ- ση δ.ο. (θ)	Μέθοδος/ τρόπος (στ-η)	Στάδιο Ανάπτυ- ξης και εποχή (ι)	Αριθμός Εφαρμογών Ελάχ. Μεγ. (κ)	Χρονικό μεσο- διάστημα μεταξύ των εφαρμο- γών (ελάχ.)	γρ δ.ο. / εκατόλιτρο ελάχ. μεγ.	λίτρα ψεκαστ. υγρού / εκτάριο ελαχ. μεγ.	Γρ. δ.ο. /εκτάριο ελάχ. μεγ.	(λ)	(μ)
Αμπέλι	Ελλάδα	TALENDO	Υ	Οίδιο (<i>Uncinula necator</i>)	EC (Γαλα- κτωμα- τοποι- ήσιμο υγρό)	200 g/L	Υδραυλικός ψεκαστήρας με ή χωρίς την βοήθεια αέρος	BBCH 13 έως 28 DBH*c Ανοιξη/ Καλοκαίρι	1-3	14 μέρες	5 g/hL	500-1500	15-75 (max 300/ Καλλιεργη- τική περίοδο)	28	Maximum application rate by growth stage BBCH GS 13-61; 40 g a.s./ha BBCH GS 61-71; 60 g a.s./ha BBCH GS 71-28 days before harvest; 75 g a.s./ha

Παρατηρήσεις:

- (α) Για τις καλλιέργειες, η ταξινόμηση της ΕΕ και του Codex (και τα δύο) θα πρέπει να χρησιμοποιούνται. Όπου βρίσκεται εφαρμογή, οι συνθήκες χρήσης θα πρέπει να περιγράφονται (π.χ. καπνισμός των κατασκευών).
- (β) Ανοιχτού αγρού (Α), εφαρμογές σε θερμοκήπια (Θ), ή σε κλειστούς χώρους (Κ).
- (γ) πχ. Μασητικά και μυζητικά έντομα, έντομα εδάφους, έντομα φυλλώματος, ζιζάνια
- (δ) πχ. Βρέξιμη σκόνη (WP), γαλακτωματοποιήσιμο συμπύκνωμα (EC)
- (ε) GCPF Κώδικες – GIFAP Technical Monograph No 2, 1989.
- (στ) όλες οι χρησιμοποιούμενες συντομογραφίες θα πρέπει να εξηγούνται

- (η) Τρόπος. Πχ σ' όλη την επιφάνεια, από αέρος, στις γραμμές, ατομικά φυτά – ο τύπος του ψεκαστικού μηχανήματος θα πρέπει να προσδιορίζεται
- (θ) g/kg ή g/lt
- (ι) Στάδιο ανάπτυξης κατά την τελευταία εφαρμογή (BBCH Monograph, Growth Stages of plants, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-315 2-4), περιλαμβάνοντας όπου βρίσκεται εφαρμογή, πληροφορίες σχετικά με την εποχή κατά το χρόνο εφαρμογής
- (κ) Ο ελάχιστος και ο μέγιστος δυνατός αριθμός εφαρμογών υπό πρακτικές συνθήκες
- (λ) Ελάχιστο χρονικό μεσοδιάστημα πριν τη συγκομιδή (PHI)

(ζ) Μέθοδος πχ. Ψεκασμός υψηλού όγκου, σκονισμός.

(μ) Οι παρατηρήσεις μπορεί να περιλαμβάνουν: οικονομική σημασία / περιορισμούς στη χρήση