



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 20.02.2024
Αριθ. πρωτ: 139/2976

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Δ. Μακρογιάννη
Τηλέφωνο: 210 9287160
e-mail: dmakrogianni@minagric.gr

Προς: Industrial Química Key, S.A., Ισπανίας
(Δια του υπεύθυνου επικοινωνίας
ΤΟΥΤΟΥΤΖΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ και ΣΙΑ
Ε.Ε – “AGRIBIZ”)
e-mail: info@agribiz.gr

ΘΕΜΑ: «Διεύρυνση της με αριθ. 14845 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) ISARD (paraffin oil 79% β/ο) σε ήσσονος σημασίας χρήσεις»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις:
 - Του ν. 4036/2012 (Α'8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - Του ν. 2690/1999 (Α'45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 - Του ν. 4622/2019 (Α'133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
- Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 51 αυτού.
- Το αριθμ. 79/27.06.2023 Π.Δ. «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.» (Α'131/27.06.2023).
- Την αριθμ. 10088/115732/26.09.2013 Υπουργική απόφαση (Β'2587) σχετικά με την «Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσονος σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσονος σημασίας».
- Την αριθμ. 1881/286212/13.10.2020 Απόφαση Υπουργού “Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση” (Β'4612/19.10.20).
- Το αριθμ. 12862/330936/07.12.2020 έγγραφο της Υπηρεσίας με θέμα «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά».
- Την αριθμ. 11869/335579/08.12.2023 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 14845 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) ISARD (paraffin oil 79% β/ο).

8. Την αριθμ. 139/2976/04.01.2024 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Διευρύνουμε τη με αριθ. 14845 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) ISARD (paraffin oil 79% β/ο), που χορηγήθηκε με την αριθμ. 11869/335579/08.12.2023 απόφασή μας, σε ήσσονος σημασίας χρήσεις.

Τα σημεία 5 και 13 διαμορφώνονται ως εξής:

5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Χρόνος εφαρμογής	Μεγ. αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο
		κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ	κ.εκ./ στρέμμα		
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ Γκρέιπφρουτ CIDPA Λεμονιά CIDLI Μανταρινιά (Κλημεντίνες) CIDRE Πορτοκαλιά CIDSΙ Φράπα CIDGR	Κόκκινη ψώρα <i>Aonidiella aurantii</i> ΑΟΝΔΑΥ Άσπρη ψώρα <i>Aspidiotus nerii</i> ΑΣPDNE Παρλατόρια/Μαύρη ψώρα <i>Parlatoria pergandii</i> PARLPE Μυτιλόμορφη ψώρα <i>Lepidosaphes beckii</i> LEPSBE Κίτρινος τετράνυχος <i>Tetranychus urticae</i> TETRUR Ακάρεα <i>Eutetranychus banksi</i> EUTEBA <i>Panonychus citri</i> METTCI	1000-1500	100-200	1000-3000	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής, πριν την αλλαγή χρώματος των καρπών.	1
ΜΗΛΟΕΙΔΗ Μηλιά MABSD Αχλαδιά PYUCO Κυδωνιά CYDOB Μουσμουλιά MSPGE Αχλαδομηλιά PYUPC	Ψώρα Σαν-Ζοζέ <i>Quadraspidiotus perniciosus</i> QUADPE Χρήσεις ήσσονος σημασίας: Βαμβακάδα** <i>Pseudaulacaspis pentagona</i> PSEAPE	750-1000	50-150	375-1500	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής, πριν την άνθηση.	1

	<p>Ψευδόκοκκος** <i>Planococcus citri</i> PSECCI</p> <p>Ψώρες** <i>Eriococcus</i> <i>lagerstroemiae</i> ERIOIA</p> <p>Ματόψειρα** <i>Eriosoma lanigerum</i> ERISLA</p>					
<p>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ</p> <p>Βερικοκιά PRNAR</p> <p>Κερασιά PRNAV</p> <p>Ροδακινιά PRNPS</p> <p>Νεκταρινιά PRNPN</p> <p>Δαμασκηνιά PRNDO</p>	<p>Ψώρα Σαν-Ζοζέ <i>Quadraspidiotus</i> <i>perniciosus</i> QUADPE</p> <p>Βαμβακάδα <i>Pseudaulacaspis</i> <i>pentagona</i> PSEAPE</p> <p><u>Χρήση ήσσονος σημασίας:</u> Κίτρινος τετράνυχος** <i>Tetranychus urticae</i> TETRUR</p>	750-1000	50-150	375-1500	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής, πριν την άνθηση.	1
<p>Αμυγδαλιά* PRNDU</p> <p><i>Χρήση ήσσονος σημασίας</i></p>	<p>Ψώρα Σαν Ζοζέ <i>Quadraspidiotus</i> <i>perniciosus</i> QUADPE</p> <p>Βαμβακάδα ή Διάσπιδες <i>Pseudaulacaspis</i> <i>pentagona</i> PSEAPE</p> <p><i>Planococcus</i> <i>/Pseudococcus citri</i> PSECCI</p> <p><i>Diaspis</i> sp. DIASSP</p> <p>Λεκάνιο <i>Saissetia oleae</i> SAISOL</p> <p>Παρλατόρια <i>Parlatoria oleae</i> PARLOL</p> <p>Μυτιλόμορφη ψώρα</p>	750-1000	50-150	375-1500	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής, πριν την άνθηση.	1

	<p><i>Lepidosaphes ulmi</i> LEPSUL</p> <p>Κηροπλάστης <i>Ceroplastes rusci</i> CERPRU</p> <p>Ψώρες <i>Sphaerolecanium prunastri</i> LECAPN <i>Eulecanium persicae</i> LECAPE</p> <p>Κίτρινος τετράνυχος <i>Tetranychus urticae</i> TETRUR</p> <p>Κόκκινος Τετράνυχος <i>Metatetranychus ulmi</i> METTUL</p> <p>Παραμορφωτικό ακάρι <i>Aceria sheldoni</i> ACEISH</p> <p>Ακάρεα <i>Aculus pelekassi</i> ACULPE <i>Bryobia rubrioculus</i> BRYORU</p>					
<p>Φουντουκιά* CYLAV</p> <p>Χρήση ήσσονος σημασίας</p>	<p>Βαμβακάδα <i>Diaspis</i> sp. DIASSP</p> <p>Κίτρινος τετράνυχος <i>Tetranychus urticae</i> TETRUR</p> <p>Κόκκινος Τετράνυχος <i>Metatetranychus ulmi</i> METTUL</p> <p>Ακάρεα <i>Bryobia praetiosa</i> BRYOPR</p>	750-1000	50-150	375-1500	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής, πριν την άνθηση.	1
<p>Φιστικιά* PIAVE</p> <p>Χρήση ήσσονος σημασίας</p>	<p>Κίτρινος τετράνυχος <i>Tetranychus urticae</i> TETRUR</p> <p>Λεκάνιο <i>Saissetia oleae</i> SAISOL</p>	750-1000	50-150	375-1500	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής, πριν την άνθηση.	1

	<p>Ψώρες <i>Parthenolecanium pruinatum</i> LECAPI <i>Parthenolecanium corni</i> LECACO <i>Coccus hesperidum</i> COCCHÉ</p>					
Ελιά OLVEU	<p><u>Χρήσεις ήσσονος σημασίας:</u> Παρλατόρια* <i>Parlatoria oleae</i> PARLOL</p> <p>Λεκάνιο* <i>Saissetia oleae</i> SAISOL</p> <p>Πολλίνια * <i>Pollinia pollini</i> POLNPO</p> <p>Άσπρη ψώρα* <i>Aspidiotus nerii</i> ASPDNE</p> <p>Μυτιλόμορφη ψώρα* <i>Lepidosaphes ulmi</i> LEPSUL</p> <p>Ψώρες* <i>Leucaspis riccae</i> LEUARI <i>Chrysomphalus dictyospermi</i> CHRYDI</p> <p>Ακάρεια* <i>Eriophyes vitis</i> ERPHVI <i>Tegolophus hassani</i> TEGLSP <i>Oxycenus maxwelli</i> OXYNMA <i>Eotetranychus carpini</i> EOTECA</p>	750-1000	50-150	375-1500	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής, πριν την άνθηση.	1
Αμπέλι VITVI	<p><u>Χρήσεις ήσσονος σημασίας:</u> Ερίνωση * <i>Eriophyes vitis</i> ERPHVI</p>	750-1000	50-150	375-1500	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής, πριν την άνθηση.	1

	Κίτρινος Τετράνυχος* <i>Tetranychus urticae</i> TETRUR					
Ροδιά* PUNGR Χρήση ήσσονος σημασίας	Τετράνυχος <i>Tetranychus urticae</i> TETRUR Ακάρεα <i>Eriophyes grannati</i> ACEIGA	750-1000	50-150	375-1500	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής, πριν την άνθηση.	1
Συκιά* FIUCA Χρήση ήσσονος σημασίας	Κίτρινος τετράνυχος <i>Tetranychus urticae</i> TETRUR Κόκκινος Τετράνυχος <i>Metatetranychus ulmi</i> METTUL Κηροπλάστης <i>Ceroplastes rusci</i> CERPRU Ψευδόκοκκος <i>Planococcus ficus</i> PLANFI	750-1000	50-150	375-1500	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής, πριν την άνθηση.	1
Ακτινιδιά* ATIDE Χρήση ήσσονος σημασίας	Κίτρινος τετράνυχος <i>Tetranychus urticae</i> TETRUR Κόκκινος Τετράνυχος <i>Metatetranychus ulmi</i> METTUL Ψώρα Σαν Ζοζέ <i>Quadraspidiotus perniciosus</i> QUADPE Βαμβακάδα ή Διάσπικ <i>Pseudaulacaspis pentagona</i> PSEAPE	750-1000	50-150	375-1500	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής, πριν την άνθηση.	1

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Το εύρος των δόσεων και ο όγκος ψεκαστικού υγρού είναι ανάλογα με το ύψος των φυτών και την ένταση της προσβολής.
2. Κατά τη χρήση του ISARD τα δένδρα πρέπει να είναι επαρκώς ποτισμένα. Ποτίζουμε μία εβδομάδα πριν από τον ψεκασμό.
3. Αποφύγετε τον ψεκασμό όταν τα φυτά είναι στρεσαρισμένα, σε περιόδους έντονης ξηρασίας ή όταν υπάρχει παγετός.
4. Να μη γίνεται εφαρμογή με το σκεύασμα όταν η θερμοκρασία ξεπερνάει τους 32°C, γιατί μπορεί να εμφανιστούν προβλήματα φυτοτοξικότητας.
5. Να μη γίνεται εφαρμογή του ISARD επί 40 ημέρες, μετά την εφαρμογή θείου ή θειασβεστίου ή σκευασμάτων με δ.ο. captan ή folpet.

*Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες αμυγδαλιάς, φουντουκιάς, φιστικιάς, ελιάς, αμπελιού, ροδιάς, συκιάς και ακτινιδιάς από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.

**Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα στις χρήσεις ήσσονος σημασίας στις καλλιέργειες των μηλοειδών και των πυρηνοκάρπων. Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.

13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Καλλιέργεια	Ημέρες
Γκρέιπφρουτ (0110010), Λεμονιά (0110030) Μανταρινιά (κλημεντίνες) (0110050) Πορτοκαλιά (0110020), Φράπα (0110010-002) Μηλιά (0130010), Αχλαδιά (0130020) Κυδωνιά (0130030), Μουσμουλιά (0130040) Αχλαδόμηλα (0130020-001) Βερικοκιά (0140010), Κερασιά (0140020) Ροδακινιά (0140030), Νεκταρινιά (0140030-002), Δαμασκηνιά (0140040) Αμυγδαλιά (0120010), Φουντουκιά (0120060), Φιστικιά (0120100) Ελιά (0402010), Αμπέλι (0151000) Ροδιά (0163050), Συκιά (0161020) Ακτινιδιά (0162010)	Καθορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του σκευάσματος

II. Διάθεση αποθεμάτων

1. Η ετικέτα του σκευάσματος να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
2. Για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, επιτρέπεται η τοποθέτηση στις συσκευασίες του σκευάσματος της μέχρι σήμερα ισχύουσας ετικέτας.
3. Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις συσκευασίες του σκευάσματος θα τοποθετείται υποχρεωτικά η νέα τροποποιημένη ετικέτα.

III. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 11869/335579/08.12.2023 απόφασή μας.

«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ