



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 20.03.2024
Αριθ. πρωτ: 1905/46942

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Δ. Καραμάνου
Τηλέφωνο: 210 9287225
e-mail: dkaramanou@minagric.gr

Προς: FMC ΧΗΜΙΚΑ ΕΛΛΑΣ Μ.ΕΠΕ
Λ. Συγγρού 348,
Τ.Κ. 176 74 Καλλιθέα
e-mail: kornilia.mitsopoulou@fmc.com

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 14830 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) BENEVIA 10 OD (δ.ο. cyantraniliprole 10 % β/ο), ως προς τα στοιχεία του παρασκευαστή της δ.ο., τα στοιχεία του παρασκευαστή του σκευάσματος, την κατηγορία και τον τρόπο δράσης του σκευάσματος, το φάσμα δράσης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις:
 - του ν. 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 - του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α' 45),
 - του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
- Τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 45 αυτού.
- Τη με αριθ. πρωτ. 5142/133961/16.05.2023 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 14830 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) BENEVIA 10 OD (δ.ο. cyantraniliprole 10 % β/ο), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
- Το με αρ. πρωτ. 12862/330936/07.12.2020 «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά» έγγραφο της Υπηρεσίας.
- Το αριθμ. 79/2023 Π.Δ. "Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών" (Α' 131/27.06.2023).
- Τη αριθ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β' 4612/19-10-20).

7. Τις με αριθ. πρωτ. 7999/227699/18.07.2023 και 1905/46942/15.02.2024 αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- I. Τροποποιούμε τη με αριθ. **14830** άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (**εντομοκτόνο**) **BENEVIA 10 OD (δ.ο. cyantraniliprole 10 % β/ο)**, η οποία χορηγήθηκε την υπ. αριθ. πρωτ. 5142/133961/16.05.2023 απόφαση μας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως προς τα στοιχεία του παρασκευαστή της δ.ο., τα στοιχεία του παρασκευαστή του σκευάσματος, την κατηγορία και τον τρόπο δράσης του σκευάσματος, το φάσμα δράσης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή.

Τα σημεία **1.3**, **1.4 γ)**, **4**, **5** και **13** διαμορφώνονται ως εξής:

1.3 Δραστική ουσία

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO:

cyantraniliprole

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

94 % (β/β) min

Χημική ομάδα:

Ομάδα ανθρανιλικών διαμιδίων

Παρασκευαστής :

FMC international Switzerland Sarl
Chemin **de Blandonnet 8**, 1214 Vernier, Ελβετία

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1. FMC Corporation
Mobile Manufacturing Center, 12650 US Highway 43
North, Axis, Alabama 36505, ΗΠΑ
2. WeylChem US
2114 Larry Jeffers Road, Elgin, SC 29045, ΗΠΑ
3. FMC (Shanghai) Agricultural Sciences Co, Ltd
No 39, Shungong Road, Shanghai Chemical Industry
Park, Shanghai 201507, Κίνα

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας cyantraniliprole, όπως αυτές κατατέθηκαν με την αριθμ. 10358/274738/02.10.2020 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας παρουσιάζονται στο Part C της σχετικής Έκθεσης Αξιολόγησης της εισηγήτριας χώρας. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

FMC international Switzerland Sarl
Chemin **de Blandonnet 8**, 1214 Vernier, Ελβετία

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Το προϊόν είναι εντομοκτόνο επαφής και στομάχου. Ανάλογα με τον εχθρό μπορεί να έχει ακμαιοκτόνο, προνυμφοκτόνο και ωοκτόνο δράση. **Πρόκειται για διασυστηματικό εντομοκτόνο με αποπλαστική και διελασματική κίνηση. Εφαρμοζόμενο στο φύλλωμα μειώνει άμεσα τις προσβολές των εντόμων και έμμεσα τη μετάδοση ασθενειών από τα έντομα.**

Περιέχει την δραστική ουσία cyantraniliprole, η οποία ανήκει στην χημική οικογένεια των ανθρανιλικών διαμιδίων και έχει ένα νέο τρόπο δράσης μέσω της ενεργοποίησης των υποδοχέων ρυανοδίνης των εντόμων. Αυτή η ενεργοποίηση προκαλεί την απελευθέρωση ασβεστίου από τις εσωτερικές αποθήκες των μυών των εντόμων, με άμεσο αποτέλεσμα την μειωμένη μυϊκή λειτουργία, παράλυση, **ταχεία παύση της διατροφής του εντόμου (αντιτροφική δράση)** και ακολούθως θανάτωση των εντόμων-στόχων.

5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μεγ. αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/Μεσοδιάστημα (ημέρες)
		κ.εκ./στρ.	κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ		
Τομάτα (Θ) LYPES Μελιτζάνα (Θ) SOLME	Τούτα <i>Tuta absoluta</i> GNORAB	-	40	30-150	Ψεκασμός φυλλώματος στα αρχικά στάδια προσβολής κατά την εκκόλαψη των αυγών και την εμφάνιση των προνυμφών από τα δύο (2) πραγματικά φύλλα έως την ωρίμανση BBCH 12-89	4/7
	Λιριόμυζα <i>Liriomyza</i> sp. LIRISP	-	60-75			
	Πράσινο σκουλήκι <i>Helicoverpa armigera</i> HELIAR	-	60-75			
	Σποντόπτερα <i>Spodoptera exigua</i> LAPHEG <i>Spodoptera littoralis</i> SPODLI	-	60-75			
	Άλτης <i>Chrysodeixis chalcites</i> PLUSCH	-	60-75			
	Αλευρώδης <i>Bemisia tabaci</i> BEMITA <i>Trialeurodes vaporariorum</i> TRIAVA	-	60-75			

	Αφίδες <i>Aphis gossypii</i> APHIGO					
	<u>Χρήση ήσσονος σημασίας:</u> <i>Spodoptera frugiperda</i> * LAPHFR					
	Θρίπες <i>Frankliniella occidentalis</i> FRANOC	-	75-100			
Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο και μη βρώσιμο φλοιό	Λιριόμυζα <i>Liriomyza</i> sp. LIRISP	-	40	30-150	Ψεκασμός φυλλώματος στα αρχικά στάδια προσβολής κατά την εκκόλαψη των αυγών και την εμφάνιση των προνυμφών από τα δύο (2) πραγματικά φύλλα έως την ωρίμανση BBCH 12-89	4/7
Αγγούρι (Θ) CUMSA	Σποντόπτερα <i>Spodoptera exigua</i> LAPHEG	-	60-75			
Κολοκύθι (Θ) CUUPG	Αλευρώδης <i>Bemisia tabaci</i> BEMITA					
Κολοκύθα (Θ) CUUMA	<i>Trialeurodes vaporariorum</i> TRIAVA					
Πεπόνι (Θ) CUMME	Αφίδες <i>Aphis gossypii</i> APHIGO					
Καρπούζι (Θ) CITLA	<u>Χρήση ήσσονος σημασίας:</u> <i>Spodoptera frugiperda</i> * LAPHFR					
	Θρίπες <i>Frankliniella occidentalis</i> FRANOC	-	75-100			
Φράουλα (Θ) FRAAN	Σποντόπτερα <i>Spodoptera exigua</i> LAPHEG <i>Spodoptera littoralis</i> SPODLI	-	60-75	30-100	Ψεκασμός φυλλώματος στα αρχικά στάδια προσβολής κατά την εκκόλαψη των αυγών και την εμφάνιση των προνυμφών από τα δύο (2) πραγματικά φύλλα έως την ωρίμανση BBCH 12-89	2/7
	<u>Χρήση ήσσονος σημασίας:</u> <i>Spodoptera frugiperda</i> * LAPHFR					
	Θρίπες <i>Frankliniella</i>	-	75-100			

	<i>occidentalis</i> FRANOC Αφίδες <i>Myzus persicae</i> MYZUPE Δροσόφιλα <i>Drosophila suzukii</i> DROSSU					
Μαρούλι (Θ) LACSA και σαλατικά (Θ) Λυκοτρίβολο (Θ) VLLLO Σκαρόλες (πικρίδα)/ πλατύφυλλα αντίδια (Θ) CICEL Κάρδαμο και άλλα βλαστάρια και φύτες (Θ) LEPSA Γαιοκάρδαμο (Θ) BARVE Ρόκα (Θ) ERUVE Κόκκινο Σινάπι (Θ) BRSJU Καλλιέργειες νεαρών φύλλων (συμπεριλαμβανο μένων ειδών κράμβης) (Θ)	Σποντόπτερα <i>Spodoptera</i> <i>littoralis</i> SPODLI <u>Χρήση ήσσονος</u> <u>σημασίας:</u> <i>Spodoptera</i> <i>frugiperda</i> * LAPHFR	60-75	75-250¹	30-80	Ψεκασμός φυλλώματος στα αρχικά στάδια προσβολής κατά την εκκόλαψη των αυγών και την εμφάνιση των προνυμφών από τα 2 πραγματικά φύλλα έως το φυτό αποκτήσει το πλήρες μέγεθος για συγκομιδή BBCH 12-49	2/7
Παρατηρήσεις: 1. Να ρυθμίζετε τη δόση στο εκατόλιτρο ώστε να μην υπερβαίνετε τη μέγιστη δόση σκευάσματος ανά στρέμμα. 2. Μην εφαρμόζεται όταν οι καλλιέργειες βρίσκονται υπό καταπόνηση. 3. Για την επίτευξη καλύτερης αποτελεσματικότητας συνιστάται η χρήση του βοηθητικού έλαιου Codacide σε δόση 0,25% του όγκου του ψεκαστ. διαλύματος για κάθετες καλλιέργειες ή 250 κ.εκ./στρ. για οριζόντιες καλλιέργειες. *Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα κατά του <i>Spodoptera frugiperda</i> στις καλλιέργειες. Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.						

13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Τομάτα (Θ) (0231010), Μελιτζάνα (Θ) (0231030), Αγγούρι (Θ) (0232010), Κολοκύθι (Θ) (0232030), Κολοκύθα (Θ) (0233020), Πεπόνι (Θ) (0233010), Καρπούζι (Θ) (0233030), Φράουλα (Θ) (0152000) , Μαρούλι (Θ) (0251020), Λυκοτρίβολο (Θ) (0251010), Σκαρόλες (πικρίδα)/πλατύφυλλα αντίδια (Θ) (0251030), Κάρδαμο και άλλα βλαστάρια και φύτρες (Θ) (0251040), Γαιοκάρδαμο (Θ) (0251050), Ρόκα (Θ) (0251060), Κόκκινο Σινάπι (Θ) (0251070), Καλλιέργειες νεαρών φύλλων (Θ) (0251080)	1

II. Ετικέτα σκευάσματος

- Η ετικέτα του σκευάσματος να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
- Για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, επιτρέπεται η τοποθέτηση στις συσκευασίες του σκευάσματος της μέχρι σήμερα ισχύουσας ετικέτας.
- Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις συσκευασίες του σκευάσματος θα τοποθετείται υποχρεωτικά η νέα τροποποιημένη ετικέτα.

III. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθ. πρωτ. 5142/133961/16.05.2023 απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ