



## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 02.04.2024  
Αριθ. πρωτ: 3553/90683

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
Πληροφορίες: Δ. Καραμάνου  
Τηλέφωνο: 210 9287225  
e-mail: [dkaramanou@minagric.gr](mailto:dkaramanou@minagric.gr)

Προς: SBM Développement SAS, Γαλλίας  
(δια του υπεύθυνου επικοινωνίας  
κ. Φαρίδης Γρηγόριου  
Δαβάκη 65, Καλλιθεα  
Μιχαλακοπούλου 157, 11527, Αθήνα  
e-mail: [gregory@agriplus.gr](mailto:gregory@agriplus.gr)

**ΘΕΜΑ:** «Τροποποίηση της αριθ. 14674/ΕΡ άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) SANIUM 25 SL (flupyradifurone 2,5% β/ο) για ερασιτεχνική χρήση, ως προς τη κατηγορία και τρόπο δράσης, το φάσμα δράσης, τις ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί, τις δηλώσεις προφύλαξης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή»

## ΑΠΟΦΑΣΗ

## Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις:
  - Του ν. 4036/2012 (Α'8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις,
  - Του ν. 2690/1999 (Α'45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
  - Του ν. 4622/2019 (Α'133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
- Τους κανονισμούς όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν:
  - Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα τα άρθρα 45 & 33 αυτού.
  - (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006
  - (ΕΕ) αριθ. 547/2011 της Επιτροπής της 8<sup>ης</sup> Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
- Την από 11/2023 Έκθεση Αξιολόγησης της Αρμόδιας Αρχής Αξιολόγησης (ΕΜΠ 2605/02.11.2023).
- Το αριθμ. 79/27.06.2023 Π.Δ. «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.» (Α'131/27.06.2023).

5. Την αριθμ. 1881/286212/13.10.2020 Απόφαση Υπουργού “Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση” (Β’4612/19.10.20).
6. Την αριθμ. 6111/83364/24.08.2018 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμ. 14674/ΕΡ άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) SANIUM 25 SL (flupyradifurone 2,5% β/ο), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
7. Τις αριθμ. 447/10909/12.01.2024, 2286/57061/26.02.2024 και 3553/90683/28.03.2024 αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Τροποποιούμε την αριθ. **14674/ΕΡ** άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (**εντομοκτόνο**) **SANIUM 25 SL (flupyradifurone 2,5% β/ο)** για **ερασιτεχνική χρήση**, η οποία χορηγήθηκε με την αριθμ. 6111/83364/24.08.2018 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς τη κατηγορία και τρόπο δράσης, το φάσμα δράσης, τις ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί, τις δηλώσεις προφύλαξης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή.

Τα σημεία **4, 5, 6, 11** και **13** διαμορφώνονται ως εξής:

**4** Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Διασυστηματικό εντομοκτόνο επαφής και στομάχου για την καταπολέμηση μυζητικών εντόμων (αφίδες, κοκκοειδή, τζιτζικάκια). Το σκεύασμα προορίζεται για ερασιτεχνική χρήση στον κήπο για να αντιμετωπιστούν οι αφίδες **σε λαχανικά**, τα τζιτζικάκια και τα κοκκοειδή στο αμπέλι, οι αφίδες στη μηλιά, ο δορυφόρος στην πατάτα, οι αφίδες στα καλλωπιστικά **και το λεκάνιο στην ελιά**.

<b>5</b> Φάσμα δράσης						
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα επεμβάσεων σε ημέρες
		κ.εκ./ στρέμμα (max)	κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρ.		
Μηλιά MABSD	Αφίδες <i>Aphis pomi</i> (APHIPO), <i>Dysaphis plantaginea</i> (DYSAPL), <i>Dysaphis devectora</i> (DYSADE)	240 για ύψος κόμης 100 εκ.  480 για ύψος κόμης 200 εκ.  720 για ύψος κόμης 300 εκ.	-	25 – 50	Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής από την έναρξη άνθησης έως την έναρξη ωρίμανσης των καρπών. (BBCH 60-79)	1

Αμπέλι VITVI	Τζιτζικάκια <i>Empoasca vitis</i> (EMPOFL)	160 για ύψος κόμης 80 εκ.  200 για ύψος κόμης 100 εκ.  240 για ύψος κόμης 120 εκ.	-	100	Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής όταν οι ταξιανθίες είναι πλήρως αναπτυγμένες, ως την έναρξη της ωρίμανσης των καρπών (BBCH 57-81)	<b>2 /14</b>
	Κοκκοειδή <i>Scaphoideus titanus</i> (SCAPLI)	400	-	100		
	<i>Metcalfa pruinosa</i> (METFPR)	400	-	100		
Σολανώδη Υπαίθρου (Υ) Τομάτα LYPXS Πιπεριά CPSAN Μελιτζάνα SOLME	Αφίδες <i>Aphis gossypii</i> (APHIGO), <i>Myzus persicae</i> (MYZUPE), <i>Macrosiphum euphorbiae</i> (MACSEU)	360	-	45-100	Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής από την εμφάνιση του δεύτερου πραγματικού φύλλου μέχρι την πλήρη ωρίμανση (BBCH 12-89)	2/10
Κολοκυνθοειδ ή Υπαίθρου (Υ) Αγγούρι CUMSA Κολοκύθι CUUPG Καρπούζι CITLA Κολοκύθα CCUMA	Αφίδες <i>Aphis gossypii</i> (APHIGO)	450		45-100	Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής από την εμφάνιση του δεύτερου πραγματικού φύλλου μέχρι την πλήρη ωρίμανση (BBCH 12-89)	2/14
Μαρούλι (Υ) LACSA	Αφίδες <i>Nasonovia ribisnigri</i> (NASORN), <i>Macrosiphum euphorbiae</i> (MACSEU), <i>Myzus persicae</i> , (MYZUPE),	500	-	25 – 100	Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής από το 10% της ανάπτυξης της φυλλικής επιφάνειας	1

	<i>Uroleucon sonchi</i> (DACTSN), <i>Aulacorthum solani</i> (AULASO), <i>Acyrtosiphon sp.</i> (ACYRSP) <i>Aphis gossypii</i> (APHIGO)				μέχρι να ολοκληρωθεί η ανάπτυξη του προς κατανάλωση μέρους του φυτού (BBCH 41-49)	
Πατάτα SOLTU	Δορυφόρος <i>Leptinotarsa decemlineata</i> (LPTNDE)	400	-	30-120	Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος από την εμφάνιση του πρώτου πλευρικού βλαστού της βάσης μέχρι την έναρξη της άνθησης. (BBCH 21-61)	1
Καλλωπιστικά (Υ): Ανθοκομικά και Πολυετή Καλλωπιστικά, Φυτώρια Δένδρων	Αφίδες <i>Aphis fabae</i> (APHIFA), <i>Macrosiphum rosae</i> (MACSRO), <i>Myzus persicae</i> (MYZUPE), <i>Aphis spiraecola</i> (APHISI), <i>Aphis nerii</i> (APHINE), <i>Macrosiphoniella sanborni</i> (MACRCH)	240 για ύψος φυτού μέχρι 50 εκ.	-	90	Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής από την έναρξη της βλάστησης (BBCH > 30)	2/7
		320 για ύψος φυτού από 50 έως 125 εκ.		120		
		400 για ύψος φυτού >125 εκ.		150		
Λάχανο, 3HCAC Κουνουπίδι, BRSOB Μπρόκολο, BRSOK Λαχανίδα BRSOC Κινέζικο λάχανο. (BRSPK)	Αφίδες <i>Myzus persicae</i> (MYZUPE) <i>Brevicoryne brassicae</i> (BRVCBR)	500	----	50-100	Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής από την έναρξη της βλάστησης 2ο φύλλο έως την καρπόδεση (BBCH 12-49)	1

Μπιζέλια με ή χωρίς λοβό (Υ) RIBSX  Φασόλι χλωρό με ή χωρίς λοβό (Υ) PHSVX	Αφίδες <i>Acyrtosiphon pisum</i> (ACYRON) <i>Aphis fabae</i> (APHIFA)	300	----	90	Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής από την έναρξη επιμήκυνσης στελέχους έως την ωρίμανση του 70% των λοβών (BBCH 30-87)	1
Ελιά (επιτραπέζιες & ελαιοποιήσιμες ποικιλίες) OLVEU	Λεκάνιο <i>Saissetia oleae</i> (SAISOL)	600	----	100	Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής από την άνθηση έως τον χρωματισμό των καρπών (BBCH 55 – 85)	1
<p>Παρατηρήσεις:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Πριν την εφαρμογή του σκευάσματος στα καλλωπιστικά να προηγείται δοκιμαστική εφαρμογή του σε μικρή κλίμακα.</li> <li>2. Η χρήση στο λάχανο περιλαμβάνει το κόκκινο λάχανο και το λάχανο σαβόι.</li> </ol>						
<p>Οι ακόλουθες χρήσεις θα χορηγηθούν όταν καθοριστούν στον κανονισμό 396/2005 MRLs σύμφωνα με τις παρακάτω ΟΓΠ. Ο κάτοχος της έγκρισης υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα την αρμόδια αρχή.</p>						
Κερασιά PRSVX	Μαύρη αφίδα της κερασιάς <i>Myzus cerasi</i> (MYZUCE)	100 για ύψος κόμης 300 εκ.	----	25-50 για ύψος κόμης 300 εκ.	Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής από το τέλος της ανθοφορίας και πτώση πετάλων έως του χρωματισμού των καρπών. (BBCH 69-85)	1
Δαμασκησιά PRNDO	Αφίδες <i>Hyalopterus pruni</i> (HYALPR) <i>Myzus persicae</i> (MYZUPE)	100 για ύψος κόμης 300 εκ.	----	25-50 για ύψος κόμης 300 εκ.	Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής από το τέλος της ανθοφορίας και πτώση πετάλων έως του χρωματισμού	1

					των καρπών. (BBCH 69-85)	
<p><b>Αντιστοίχως θα τροποποιηθούν και τα σχετικά σημεία:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Σημείο 13</b></li> </ul> <p><b>Κερασιά (0140020): 7 ημέρες</b>  <b>Δαμασκηλιά (0140040): 14 ημέρες</b></p>						

6

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτούγειας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

1. Στην καλλιέργεια του μαρουλιού (Υ) να μην χρησιμοποιείται σε εδάφη με τεχνητή στράγγιση.
2. **Μην ψεκάζετε όταν φυσάει.**
3. **Φροντίστε να μην έχουν πρόσβαση στην ψεκασμένη περιοχή παιδιά και κατοικίδια ζώα για τουλάχιστον 24 ώρες μετά τον ψεκασμό.**
4. **Φοράτε πάντοτε γάντια κατά τη χρήση.**
5. **Μην ξεπλένετε το ψεκαστικό δοχείο κοντά σε νεροχύτες, επιφανειακά ύδατα ή πηγές νερού όπως για παράδειγμα πηγάδι.**
6. **Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποίηση της συσκευασίας.**

11

Δηλώσεις προφύλαξης

P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο.  
P405: Μακριά από παιδιά.  
P264: Πλύνετε σχολαστικά μετά το χειρισμό.  
P270: Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.  
P280: Να φοράτε προστατευτικά μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια.

*«Σε περίπτωση επανεισόδου μετά τον ψεκασμό φοράτε μακρύ παντελόνι και πουκάμισο με μακριά μανίκια»*

P501: Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Sr1: Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα.

SPr3: Για να προστατεύσετε τα αρθρόποδα μη στόχους, να αφήνετε μία αφέκαστη ζώνη προστασίας: 10 μέτρα για την καλλιέργεια της μηλιά, 5 μέτρα για τις καλλιέργειες του αμπελιού, των καλλωπιστικών και ελιάς.

SPr8: **Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία ή κατά την περίοδο ανθοφορίας ζιζανίων Απομακρύνετε ή/και καταστρέψτε τα ζιζάνια πριν την ανθοφορία τους. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν.**

**13** Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Καλλιέργεια	Ημέρες
Αμπέλι, Μηλιά, <b>Ελιά (0161030, 0402010)</b>	14
Πατάτα, <b>Μπιζέλια με λοβό (0260030), Φασόλια με λοβό (0260010)</b>	7
Τομάτα (Υ), Πιπεριά (Υ), Μελιτζάνα(Υ), Αγγούρι (Υ), Κολοκύθι (Υ), Κολοκύθα (Υ), Καρπούζι (Υ), Μαρούλι (Υ), <b>Λάχανο, Κόκκινο λάχανο, Λάχανο σαβόι (0242020), Κουνουπίδι, Λαχανίδα (0243020), Κινέζικο λάχανο(0243010), Μπιζέλια χωρίς λοβό (0260040), Φασόλια χωρίς λοβό (0260020)</b>	3
Καλλωπιστικά	-

- II. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 6111/83364/24.08.2018 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Γεωργίας»  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ