



**ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ** ως προς το ποσοστό της δραστικής ουσίας, στο θέμα της 1<sup>ης</sup> σελίδας, στο σημείο 6 της 2<sup>ης</sup> σελίδας και στη παράγραφο Ι της 2<sup>ης</sup> σελίδας, από το εσφαλμένο 70% στο ορθό 0,0080% (04.04.2024).

#### ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**  
**ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**  
**Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ**  
**ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

**Αθήνα, 03.04.2024**  
**Αριθ. πρωτ: 3783/96463**

**Ταχ. Δ/νση:** Λ. Συγγρού 150  
**Ταχ. Κώδικας:** 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
**Πληροφορίες:** Δ. Καραμάνου  
**Τηλέφωνο:** 210 9287225  
**e-mail:** [dkaramanou@minagric.gr](mailto:dkaramanou@minagric.gr)

**Προς:** **SBM Développement SAS, Γαλλίας**  
 (δια του υπεύθυνου επικοινωνίας  
 κ. **Φαρίδη Γρηγόριου**  
 Δαβάκη 65, Καλλιθεα  
 Μιχαλακοπούλου 157, 11527, Αθήνα  
 e-mail: [gregory@agriplus.gr](mailto:gregory@agriplus.gr)

**ΘΕΜΑ:** «Τροποποίηση της αριθ. 14762/ΕΡ άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) SANIUM SPRAY (δ.ο. flupyradifurone 0,0080 % β/ο) για ερασιτεχνική χρήση, ως προς τη κατηγορία και τρόπο δράσης, το φάσμα δράσης, τις δηλώσεις προφύλαξης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή»

#### ΑΠΟΦΑΣΗ

#### Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις:
  - Του ν. 4036/2012 (Α'8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις,
  - Του ν. 2690/1999 (Α'45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
  - Του ν. 4622/2019 (Α'133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
- Τους κανονισμούς όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν:
  - Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα τα άρθρα 45 & 33 αυτού.
  - (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006
  - (ΕΕ) αριθ. 547/2011 της Επιτροπής της 8<sup>ης</sup> Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
- Την από 11/2023 Έκθεση Αξιολόγησης της Αρμόδιας Αρχής Αξιολόγησης (ΕΜΠ 2602/02.11.2023).
- Το αριθμ. 79/27.06.2023 Π.Δ. «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.» (Α'131/27.06.2023).

5. Την αριθμ. 1881/286212/13.10.2020 Απόφαση Υπουργού “Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση” (Β’ 4612/19.10.20).
6. Την αριθμ. 11879/313968/07.12.2020 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμ. 14762/ΕΡ άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) SANIUM SPRAY (δ.ο. fluopyradifurone 0,0080 % β/ο).
7. Τις αριθμ. 447/10909/12.01.2024, 2287/57063/26.02.2024 και 3553/90683/28.03.2024 αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- I. Τροποποιούμε την αριθ. **14762/ΕΡ** άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (**εντομοκτόνο**) **SANIUM SPRAY (δ.ο. fluopyradifurone 0,0080 % β/ο) για ερασιτεχνική χρήση**, η οποία χορηγήθηκε με την αριθμ. 11879/313968/07.12.2020 απόφασή μας, ως προς τη κατηγορία και τρόπο δράσης, το φάσμα δράσης, τις δηλώσεις προφύλαξης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή.

Τα σημεία **4, 5, 11** και **13** διαμορφώνονται ως εξής:

- 4** Κατηγορία και τρόπος δράσης

Ετοιμόχρηστο διασυστηματικό εντομοκτόνο επαφής, για ερασιτεχνική χρήση σε σολανώδη, κολοκυνθοειδή και καλλωπιστικά φυτά θερμοκηπίου και **πατάτα, φρέσκα φασόλια/μπιζέλια και καλλωπιστικά φυτά αγρού**.  
Δρα δεσμεύοντας τους υποδοχείς της ακετυλοχολίνης στις συνάψεις του περιφερειακού νευρικού συστήματος του εντόμου με αποτέλεσμα την διατάραξη του νευρικού συστήματος και τον θάνατο του εντόμου.  
Παρουσιάζει ταχύτατη αρχική δράση (knockdown effect) η οποία οδηγεί σε άμεση διακοπή της απομύζησης χυμών από τα έντομα.  
Το σκεύασμα έχει δράση στα διάφορα στάδια του βιολογικού κύκλου των εντόμων (προνύμφες, νύμφες, ακμαία).

5 Φάσμα δράσης				
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις του ετοιμόχρηστου σκευάσματος σε κυβικά εκατοστά/ τετραγωνικό μέτρο (κ.εκ/τ.μ.)	Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε Ημέρες
Τομάτα (Θ) LYPES Μελιτζάνα (Θ) SOLME Πιπεριά (Θ) CP SAN Αγγούρι (Θ) CUMSA Κολοκύθι (Θ) CUUPG	Αφίδες <i>Myzus persicae</i> (MYZUPE),  <i>Macrosiphum euphorbiae</i> (MACSEU)  <i>Aphis gossypii</i> (APHIGO)	90 κ.εκ./ m <sup>2</sup>	Ψεκασμοί με την εμφάνιση της προβολής από την εμφάνιση του δεύτερου πραγματικού φύλλου μέχρι την πλήρη ωρίμανση των καρπών (BBCH 12-89).	<b>3/ 4-10</b>
	<b>Αλευρώδεις:</b> <i>Bemisia tabaci</i> , (BEMITA) <i>Trialeurodes vaporariorum</i> (TRIAVA)	90 κ.εκ. / m <sup>2</sup>		
Μπιζέλια με ή χωρίς λοβό (Υ) PIBSX  Φασόλι χλωρό με ή χωρίς λοβό (Υ) PHSVX	Αφίδες <i>Acyrtosiphon pisum</i> (ACYRON)  <i>Aphids sp</i> (APHIFA)	90 κ.εκ. / m <sup>2</sup>	Ψεκασμοί με την εμφάνιση της προσβολής από την έναρξη ανάπτυξης του φυτού έως την πλήρη καρποφορία (BBCH 20-79).	<b>1</b>
Πατάτα SOLTU	Δορυφόρος <i>Leptinotarsa decemlineata</i> (LPTNDE)	120 κ.εκ. / m <sup>2</sup>	Ψεκασμοί με την εμφάνιση της προσβολής από την έναρξη βλάστησης 10% έως την πλήρη ωρίμανση του κονδύλου (BBCH 31-49)	<b>1</b>
<b>ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ</b> <b>Υπαίθρου</b>	<b>Κοκκοειδή:</b> <b>Κόκκινη ψώρα</b> <i>Aonidiella aurantii</i> (AONDAU)	90 κ.εκ./ m <sup>2</sup> όταν το φυτό έχει μέγεθος 50 εκ.  120 κ.εκ./ m <sup>2</sup> όταν	Ψεκασμοί με την εμφάνιση της προσβολής από την έναρξη ανάπτυξης του φυτού	<b>2/7</b>

	<p><i>Saissetia coffeae</i> (SAISHE) <i>Abgrallaspis cyanophylli</i> (ABGRCY)</p> <p>Λεκάνιο <i>Saissetia oleae</i> (SAISOL)</p> <p>Παρλατόρια <i>Parlatoria oleae</i> (PARLOL)</p>	<p>το φυτό έχει μέγεθος 50 – 125 εκ.</p> <p>150 κ.εκ./ m<sup>2</sup> όταν το φυτό έχει μέγεθος μεγαλύτερο από 125 εκ.</p>	BBCH >30	
ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ Θερμοκηπίου	<p>Αφίδες <i>Aulacorthum solani</i> (AULASO), <i>Aphis fabae</i> (APHIFA), <i>Macrosiphum euphorbiae</i> (MACSEU), <i>Macrosiphum rosae</i> (MACSRO), <i>Myzus persicae</i> (MYZUPE), <i>Myzus ascalonicus</i> (MYZUAS), <i>Brachycaudus helichrysi</i> (ANURHE)</p> <p>Αλευρώδεις <i>Trialeurodes vaporariorum</i> (TRIAVA)</p> <p>Κοκκοειδή: <i>Saissetia coffeae</i> (SAISHE) <i>Abgrallaspis cyanophylli</i> (ABGRCY)</p> <p>Λεκάνιο <i>Saissetia oleae</i> (SAISOL)</p> <p>Παρλατόρια <i>Parlatoria oleae</i> (PARLOL)</p>	<p>90 κ.εκ./ m<sup>2</sup> όταν το φυτό έχει μέγεθος 50 εκ.</p> <p>120 κ.εκ. / m<sup>2</sup> όταν το φυτό έχει μέγεθος 50 – 125 εκ.</p> <p>150 κ.εκ./ m<sup>2</sup> όταν το φυτό έχει μέγεθος</p>	Ψεκασμοί με την εμφάνιση της προσβολής από το πρώτο πραγματικό φύλλο/ζεύγος φύλλων ( BBCH > 10).	2
<b>Παρατηρήσεις:</b>				
1. Πριν την εφαρμογή του σκευάσματος στα καλλωπιστικά να προηγείται δοκιμαστική εφαρμογή του σε μικρή κλίμακα.				

**11** Δηλώσεις  
Προφύλαξης:

P102+405: Φυλάσσεται κλειδωμένο μακριά από παιδιά.  
 P264: Πλύνετε σχολαστικά μετά το χειρισμό.  
 P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν  
 P501: Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.  
 SP1: Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

**Συστήνεται η χρήση γαντιών κατά την εφαρμογή.**

**Σε περίπτωση επανεισόδου μετά τον ψεκάσμό φοράτε μακρύ παντελόνι, και πουκάμισο με μακριά μανίκια. Συστήνεται η χρήση γαντιών.**

**SPe3: Για να προστατέψετε τα αρθρώποδα μη στόχους αφήστε μία αφέκαστη ζώνη προστασίας: 5 m για καλλωπιστικά φυτά αγρού.**

Μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις σε ωφέλιμα έντομα.

**SPe8: Επικίνδυνο για τις μέλισσες/Για την προστασία των μελισσών και άλλων εντόμων επικονίασης μην εφαρμόζετε σε καλλιέργειες που ανθίζουν. Μην το χρησιμοποιείτε όπου οι μέλισσες αναζητούν ενεργά τροφή/Μην το εφαρμόζετε όταν ανθίζουν.**

**13** Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Πεδίο Εφαρμογής	ΡΗΙ (σε ημέρες)
Τομάτα (Θ), Πιπεριά(Θ), Μελιτζάνα(Θ), Αγγούρι(Θ), Κολοκύθι (Θ), <b>Μπιζέλια χωρίς λοβό (Υ) (0260040), Φασόλια χωρίς λοβό(Υ) (0260020),</b>	3
<b>Πατάτα (0211000), Μπιζέλια με λοβό (Υ) (0260030), Φασόλια με λοβό(Υ) (0260010)</b>	7
Καλλωπιστικά (Υ, Θ)	Δεν ορίζονται

- II. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 11879/313968/07.12.2020 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Γεωργίας»  
 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

**Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ**