



## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 11.04.2024  
Αριθ. πρωτ: 3878/99462

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Αθήνα  
Πληροφορίες: Κ. Τσαρνά  
Α. Μπρατίδου Παρλαπάνη  
Τηλέφωνο: 210 9287238  
210 9287228  
e-mail: [ktsarna@minagric.gr](mailto:ktsarna@minagric.gr)  
[abratidou@minagric.gr](mailto:abratidou@minagric.gr)

Προς: Albaugh TKI d.o.o, Σλοβενίας  
(δια του υπεύθυνου επικοινωνίας της  
εταιρείας Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και  
ΣΙΑ Ε.Ε. «Agribiz»  
Μιχαλακοπούλου 157, 115 27, Αθήνα)  
e-mail: [info@agribiz.gr](mailto:info@agribiz.gr)

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθμ. 7920 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) VERDYS CLEAN 360 SL [δ.ο. Glyphosate 36% β/ο (υπό μορφή άλατος ισοπροπυλαμίνης 48,3%)] ως προς τα στοιχεία του υπεύθυνου επικοινωνίας, τα εργοστάσια παρασκευής και συσκευασίας του σκευάσματος, το μέγεθος των συσκευασιών και το φάσμα δράσης του σκευάσματος»

## ΑΠΟΦΑΣΗ

## Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις:
  - Του ν. 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  - Του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
  - του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
- Τον κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 45 αυτού.
- Την αριθμ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β' 4612/19-10-20).
- Το αριθμ. 12862/330936/07.12.2020 έγγραφο της Υπηρεσίας με θέμα «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά».
- Το αριθμ. 79/2023 Π.Δ. «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (Α' 131/27.06.2023)».
- Την αριθμ. 129360/03.06.2009 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμ. 7920 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) VERDYS CLEAN 360 SL [δ.ο. Glyphosate 36% β/ο (υπό μορφή άλατος ισοπροπυλαμίνης 48,3%)], όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
- Την αριθμ. 3878/99462/04.04.2024 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- Τροποποιούμε την αριθμ. 7920 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) VERDYS CLEAN 360 SL [δ.ο. Glyphosate 36% β/ο (υπό μορφή άλατος ισοπροπυλαμίνης 48,3%)], που χορηγήθηκε με την αριθμ. 129360/03.06.2009 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και

ισχύει, ως προς τα στοιχεία του υπεύθυνου επικοινωνίας, τα εργοστάσια παρασκευής και συσκευασίας του σκευάσματος, το μέγεθος των συσκευασιών και το φάσμα δράσης του σκευάσματος.

Τα σημεία **1.4α, δ, ε, 2 και 5** διαμορφώνονται ως εξής:

#### 1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

Albaugh TKI d.o.o.  
Grajski trg 21, SI-2327 RACE, Σλοβενία

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε. **"Agribiz"**  
**Μιχαλακοπούλου 157**, 115 27, Αθήνα  
Τηλ.: 210 7471000  
E-mail: [info@agribiz.gr](mailto:info@agribiz.gr)

δ) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις **των επιχειρήσεων:**

1. Albaugh TKI d.o.o.  
Grajski trg 21,  
SI-2327 RACE,  
Σλοβενία
2. **INDUSTRIAS AFRASA S.A.**  
**C/ Ciudad de Sevilla, 53, 46988,**  
**Polígono Industrial Fuente del Jarro,**  
**Paterna, Valencia, Ισπανία**
3. **Chemark Zrt.**  
**H-8182 Berhida,**  
**Peremarton gyártelep 06/75. hrsz.,**  
**Ουγγαρία**
4. **Agrokémia Sellye Zrt.**  
**H-7960 Sellye, Sósvertikei út 1.,**  
**Ουγγαρία**

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος:

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις **των επιχειρήσεων:**

1. Albaugh TKI d.o.o.  
Grajski trg 21,  
SI-2327 RACE,  
Σλοβενία
2. **INDUSTRIAS AFRASA S.A.**  
**C/ Ciudad de Sevilla, 53, 46988,**  
**Polígono Industrial Fuente del Jarro,**  
**Paterna, Valencia, Ισπανία**
3. **Chemark Zrt.**  
**H-8182 Berhida,**  
**Peremarton gyártelep 06/75. hrsz.,**  
**Ουγγαρία**
4. **Agrokémia Sellye Zrt.**  
**H-7960 Sellye, Sósvertikei út 1.,**  
**Ουγγαρία**

**2** Συσκευασίες:

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1.	Φιάλες	100 κ. εκ. έως 3 λίτρων	Υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE) ή PET
2.	Δοχεία	5 έως 50 λίτρων	Υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE) ή PET

**5** Φάσμα δράσης:

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		κ. εκ. σκ./στρ.	Όγκος ψεκ. Υγρού λίτρα/στρ.		
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ: Πορτοκαλιά CIDSΙ, Μανταρινιά CIDRE, Λεμονιά CIDLI Γκρέιπ φρουτ CIDPA , Κίτρα CIDME	Ετήσια ζιζάνια * (αγρωστώδη και πλατύφυλλα)	150-200	20-40	Όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο της ζωηρής τους ανάπτυξης	2
	Μολόχα ( <i>Malva</i> sp., MALSS)	400-600	20-40		
	Τσουκνίδα ( <i>Urtica</i> sp., URTSS)				
ΑΚΡΟΔΡΥΑ: Αμυγδαλιά PRNDU	Πολυκόμπι ( <i>Polygonum</i> sp., POLSS)				
ΜΗΛΟΕΙΔΗ: Μηλιά MABSD Αχλαδιά PYUCO	Αντράκλα ( <i>Portulaca oleracea</i> , POROL)				
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ Βερικοκιά PRNAR Κερασιά PRNAV Ροδακινιά PRNPS Νεκταρινιά <b>PRNPN</b>					
ΑΜΠΕΛΙΑ VITVI Επιτραπέζια και Οιν/μα					
ΕΛΙΕΣ OLVEU					

	<p>Πολυετή ζιζάνια**</p> <p>Αγριάδα (<i>Cynodon dactylon</i>, CYNDA)</p> <p>Βέλιουρας (<i>Sorghum halepense</i>, SORHA)</p> <p>Φτέρη (<i>Pteridium aquilinum</i>, PTEAQ)</p> <p>Περικοκλάδα (<i>Convolvulus arvensis</i>, CONAR)</p> <p>Κίρσιο (<i>Cirsium arvense</i>, CIRAR)</p> <p>Κύπερη (<i>Cyperus sp.</i>, CYPSS)</p>	<p>750-1000</p> <p>500</p> <p>500</p> <p>1000</p> <p>1000</p> <p>600 (1<sup>η</sup> εφαρμογή)</p> <p>500 (2<sup>η</sup> εφαρμογή)</p>	<p>20-40</p> <p>20-40</p> <p>20-40</p> <p>20-40</p> <p>20-40</p> <p>20-40</p>	<p>Όταν τα ζιζάνια βρίσκονται κοντά στην άνθηση, κατά την άνθηση ή λίγο μετά από αυτή</p> <p>α) 1<sup>η</sup> εφαρμογή κατά την άνθηση β) 2<sup>η</sup> εφαρμογή σε περίπτωση αναβλάστησης</p>	<p>1</p> <p>2 εφαρμογές για την κύπερη</p>
Βαμβάκι (***) GOSBA	<p>Ετήσια ζιζάνια * (αγρωστώδη και πλατύφυλλα)</p> <p>Πολυετή ζιζάνια</p> <p>Βέλιουρας (<i>Sorghum halepense</i>, SORHA)</p>	<p>150-200</p> <p>500</p>	<p>20-40</p> <p>20-40</p>	<p>Κατευθυνόμενος ψεκασμός μεταξύ των γραμμών πριν την έναρξη της άνθησης.</p>	<p>1</p>
Καπνός ΝΙΟΤΑ	<p>Οροβάγχη (<i>Orobancha Ramosa</i>, ORARA)</p>	<p>α) 40 β) 60</p>	<p>30-40</p>	<p>Ψεκασμοί καλύψεως: α) 40 μέρες μετά τη μεταφύτευση β) 60 μέρες μετά τη μεταφύτευση</p>	<p>2</p>

Αγροί μετά τη συγκομιδή της καλλιέργειας ή πριν την κατεργασία του εδάφους για σπορά	<p>Ετήσια ζιζάνια * (αγρωστώδη και πλατύφυλλα)</p> <p>Μολόχα (<i>Malva</i> sp., MALSS)</p> <p>Τσουκνίδα (<i>Urtica</i> sp., URTSS)</p> <p>Πολυκόμπι (<i>Polygonum</i> sp., POLSS)</p> <p>Αντράκλα (<i>Portulaca oleracea</i>, POROL)</p> <p>Πολυετή ζιζάνια** (ως ανωτέρω)</p>	<p>150-200</p> <p>400-600</p> <p>500-1000 (ανάλογα με το είδος του πολυετούς ζιζανίου ως ανωτέρω)</p>	<p>20-40</p> <p>20-40</p> <p>20-40</p>	<p>Όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο της ζωηρής τους ανάπτυξης</p> <p>Όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στην άνθηση κατά την άνθηση ή λίγο μετά από αυτή.</p>	<p>1</p>
Ακαλλιέργητες εκτάσεις	<p>Ετήσια ζιζάνια (*) (αγρωστώδη &amp; πλατύφυλλα)</p> <p>Μολόχα (<i>Malva</i> sp., MALSS)</p> <p>Τσουκνίδα (<i>Urtica</i> sp., URTSS)</p> <p>Πολυκόμπι (<i>Polygonum</i> sp., POLSS)</p> <p>Αντράκλα (<i>Portulaca oleracea</i>, POROL)</p> <p>Πολυετή ζιζάνια** (ως ανωτέρω)</p> <p>Ξυλώδεις θάμνοι, δένδρα, βάτα (<i>Rubus</i> sp., RUBSS)</p>	<p>150-200</p> <p>400-600</p> <p>500-1000 (ανάλογα με το είδος του πολυετούς ζιζανίου ως ανωτέρω)</p> <p>500-1000</p>	<p>20-40</p> <p>20-40</p> <p>20-40</p> <p>20-40</p>	<p>Όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο της ζωηρής τους ανάπτυξης.</p> <p>Όταν τα ζιζάνια βρίσκονται κοντά στην άνθηση, κατά την άνθηση ή λίγο μετά από αυτή.</p> <p>Όταν βρίσκονται σε πλήρη ανάπτυξη</p>	<p>2</p> <p>1</p> <p>1</p>

Κατά μήκος αρδευτικών & στραγγιστικών καναλιών	Υδροχαρή ζιζάνια	800-1000	20-40	Κοντά ή κατά την άνθιση των ζιζανίων	1
--	------------------	----------	-------	--------------------------------------	---

(\*) Για την καταπολέμηση ετησίων ζιζανίων απαιτούνται συνήθως μία με δύο εφαρμογές (χειμώνα –άνοιξη) ή /και (καλοκαίρι-φθινόπωρο) ανάλογα με την εποχή εμφάνισης των ζιζανίων και την καλλιέργεια, όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο της ζωηρής τους ανάπτυξης.

(\*\*) Για την καταπολέμηση πολυετών ζιζανίων απαιτείται συνήθως μία εφαρμογή, όταν τα ζιζάνια βρίσκονται κοντά στην άνθιση, κατά την άνθιση ή λίγο μετά από αυτή.

(\*\*\*) Στο βαμβάκι ο ψεκασμός πρέπει να είναι κατευθυνόμενος μεταξύ των γραμμών πριν την έναρξη της άνθισης της καλλιέργειας. Τα σταγονίδια του ψεκαστικού διαλύματος δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με τα στελέχη και το φύλλωμα των φυτών. Προτείνεται η χρήση προστατευτικών καλυμμάτων (καλυπτρών) γύρω από τα μπεκ.

#### ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1) Στις δενδρώδεις καλλιέργειες και στα αμπέλια ο ψεκασμός των ζιζανίων πρέπει να είναι κατευθυνόμενος αποφεύγοντας επαφή των σταγονιδίων του ψεκαστικού διαλύματος με φύλλωμα, τρυφερούς βλαστούς, παραφυάδες και μη επουλωμένες πληγές κλαδέματος. Ο ψεκασμός επιτρέπεται μόνο σε εγκατεστημένους σπαρώνες ή αμπελώνες από το 3<sup>ο</sup> έτος από την φύτευσή τους και μετά, ανάλογα με την ανάπτυξη των φυτών.

2) Για τα πλατύφυλλα ζιζάνια *Malva spp.* (μολόχα), *Urtica spp.* (τσουκνίδα), *Polygonum spp.* (πολυκόμμι, λαπάτσα) *Portulaca oleraceae* (αντράκλα) η δόση κυμαίνεται από 400-600 κ.εκ. /στρέμμα ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξής τους.

3) Για την αγριάδα η εφαρμογή να γίνεται όταν έχει ύψος 15-30 εκ.

4) Για τη φτέρη η εφαρμογή να γίνεται μετά το ξεδίπλωμα της κορυφής.

5) Να μη γίνεται ψεκασμός εάν αναμένεται βροχή σε 6 ώρες.

6) Να μη χρησιμοποιείται σε καλλιέργειες που προορίζονται για σποροπαραγωγή.

7) Μην ψεκάζετε όταν φυσάει.

8) Να μην χρησιμοποιείται σε καλλιέργειες που παράγουν υπόγειο βρώσιμο προϊόν, πριν τη συγκομιδή τους.

9) Για τις επιτραπέζιες ελιές επιτρέπεται η συλλογή τους μόνο από το δένδρο.

10) Η εφαρμογή να γίνεται όταν δεν υπάρχει νερό στα στραγγιστικά κανάλια.

#### II. Διάθεση αποθεμάτων

1. Η ετικέτα του σκευάσματος να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
2. Για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, επιτρέπεται η τοποθέτηση στις συσκευασίες του σκευάσματος της μέχρι σήμερα ισχύουσας ετικέτας.
3. Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις συσκευασίες του σκευάσματος θα τοποθετείται υποχρεωτικά η νέα τροποποιημένη ετικέτα.

III. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 129360/03.06.2009 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Γεωργίας»  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

**Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ**