



## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 17.07.2024  
Αριθ. πρωτ: 7205/185501

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Αθήνα  
Πληροφορίες: Κ. Τσαρνά  
Τηλέφωνο: 210 9287214

Προς: **Barclay Chemicals (R&D) Ltd, Ιρλανδίας**  
(δια του υπεύθυνου επικοινωνίας της  
εταιρείας **Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και**  
**ΣΙΑ Ε.Ε. «Agribiz»**  
Μιχαλακοπούλου 157, 115 27, Αθήνα)  
e-mail: [info@agribiz.gr](mailto:info@agribiz.gr)

e-mail: [ktsarna@minagric.gr](mailto:ktsarna@minagric.gr)

**ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθμ. 70178 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) GALLUP SUPER 360 [δ.ο. glyphosate 36% β/ο (υπό μορφή άλατος ισοπροπυλαμίνης 48,6 % β/ο)] ως προς το φάσμα δράσης του σκευάσματος»**

## ΑΠΟΦΑΣΗ

## Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις:
  - Του ν. 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  - Του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
  - του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
- Τον κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 45 αυτού.
- Την αριθμ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β' 4612/19-10-20).
- Το αριθμ. 12862/330936/07.12.2020 έγγραφο της Υπηρεσίας με θέμα «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά».
- Το αριθμ. 32/2024 Π.Δ. «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 91/14.06.2024).
- Την αριθμ. 10237/292601/08.12.2023 απόφασή μας, με την οποία ανανεώθηκε η με αριθμ. 70178 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) GALLUP SUPER 360 [δ.ο. glyphosate 36% β/ο (υπό μορφή άλατος ισοπροπυλαμίνης 48,6 % β/ο)].
- Την αριθμ. 7205/185501/27.06.2024 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- Τροποποιούμε την αριθμ. **70178** άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) GALLUP SUPER 360 [δ.ο. glyphosate 36% β/ο (υπό μορφή άλατος ισοπροπυλαμίνης

48,6 % β/ο]], που ανανεώθηκε με την αριθμ. 10237/292601/08.12.2023 απόφασή μας, ως προς το φάσμα δράσης του σκευάσματος.

Το σημείο 5 διαμορφώνεται ως εξής:

5 Φάσμα δράσης:					
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιερ. περίοδο / μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες
		κ.εκ. σκ./στρ.	Όγκος ψεκ. Υγρού λίτρα / στρ.		
Εσπεριδοειδή: Πορτοκαλιά CIDSI Μανταρινιά CIDRE Λεμονιά CIDLI Γκρέιπφρουτ CIDPA Κιτριά CIDME	Ετήσια ζιζάνια <sup>3</sup> (αγρωστώδη και πλατύφυλλα)	150-200	20-40	Κατευθυνόμενος ψεκάσμος επί της γραμμής της δεντροστοιχίας, όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο της ζωηρής τους ανάπτυξης.	1-3/28
	Μολόχα ( <i>Malva</i> sp. - MALSS)	400-600	20-40		
	Τσουκνίδα ( <i>Urtica</i> sp. - URTSS)				
Ακρόδρυα: Αμυγδαλιά PRNDU	Πολυκόμπι ( <i>Polygonum</i> sp. - POLSS)				
Μηλοειδή: Μηλιά MABSD	Αντράκλα ( <i>Portulaca Oleracea</i> - POROL)				
Αχλαδιά PYUCO	Πολυετή ζιζάνια <sup>4</sup>	500-800	20-40	Κατευθυνόμενος ψεκάσμος επί της γραμμής της δεντροστοιχίας, όταν τα ζιζάνια βρίσκονται κοντά στην άνθηση, κατά την άνθηση ή λίγο μετά από αυτή.	
Πυρηνόκαρπα: Βερικοκιά PRNAR Ροδακινιά PRNPS Κερασιά PRNAV	Αγριάδα ( <i>Cynodon Dactylon</i> - CYNDA)	750-800	20-40		
	Βέλιουρας ( <i>Sorghum Halepense</i> - SORHA)	500	20-40		
Ελιά (επιτραπέζιες, ελαιοποιήσιμες) OLVEU	Φτέρη ( <i>Pteridium aquilinum</i> - PTEAQ)	500	20-40	Όταν η εφαρμοζόμενη δόση είναι μεγαλύτερη των 633 κεκ. σκευάσματος/στρ να πραγματοποιείται	

	Περικοκλάδα ( <i>Convolvulus arvensis</i> - CONAR)	800	20-40	εφαρμογή μόνο στο 10% της έκτασης του αγρού δηλαδή spot εφαρμογή.	
	Κίρσιο ( <i>Cirsium arvense</i> - CIRAR)	800	20-40		
	Κύπερη ( <i>Cyperus sp.</i> - CYPSS)	600 (1η εφαρμογή) 500 (2η εφαρμογή)	20-40 20-40	α) 1η εφαρμογή κατά την άνθηση β) 2η εφαρμογή σε περίπτωση αναβλάστησης  Όταν η εφαρμοζόμενη δόση είναι μεγαλύτερη των 600 κεκ. σκευάσματος/στρ να πραγματοποιείται εφαρμογή μόνο στο 10% της έκτασης του αγρού.	
Καπνός	Οροβάγχη ( <i>Orobancha Ramosa</i> - ORARA)	α) 40 β) 60	30-40	Ψεκασμοί καλύψεως: α) 40 μέρες μετά τη μεταφύτευση β) 60 μέρες μετά τη μεταφύτευση	2
Αγροί μετά τη συγκομιδή της καλλιέργειας ή πριν την κατεργασία του εδάφους για σπορά	Ετήσια ζιζάνια <sup>3</sup> (αγρωστώδη και πλατύφυλλα)  Μολόχα ( <i>Malva sp.</i> - MALSS)  Τσουκνίδα ( <i>Urtica sp.</i> - URTSS)  Πολυκόμπι ( <i>Polygonum sp.</i> - POLSS)  Αντράκλα ( <i>Portulaca Oleracea</i> - POROL)	150-200  400-600	20-40  20-40	Όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο της ζωηρής τους ανάπτυξης.	1
	Πολυετή ζιζάνια <sup>4</sup> (ως ανωτέρω)	500-600  (ανάλογα με το είδος του πολυετούς ζιζανίου ως ανωτέρω)	20-40	Όταν τα ζιζάνια βρίσκονται κοντά στην άνθηση, κατά την άνθηση ή λίγο μετά από αυτή.	

Ακαλλιέργητες εκτάσεις  (βιομηχανικές περιοχές, αρχαιολογικοί χώροι, νεκροταφεία, πλατείες, πλάι σε δρόμους και εθνικές οδούς, σε χώρους με φωτοβολταϊκά πάνελ, σε αστικές και αγροτικές περιοχές)	Ετήσια ζιζάνια <sup>3</sup> (αγρωστώδη και πλατύφυλλα)	150-200	20-40	Όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο της ζωηρής τους ανάπτυξης.	1-3 /21
	Μολόχα ( <i>Malva</i> sp. - MALSS)	400-600	20-40		
	Τσουκνίδα ( <i>Urtica</i> sp. - URTSS)  Πολυκόμπι ( <i>Polygonum</i> sp. - POLSS)  Αντράκλα ( <i>Portulaca Oleracea</i> - POROL)				
	Πολυετή ζιζάνια <sup>4</sup> (ως ανωτέρω)	500-1000  (ανάλογα με το είδος του πολυετούς ζιζανίου ως ανωτέρω)	20-40	Όταν τα ζιζάνια βρίσκονται κοντά στην άνθηση, κατά την άνθηση ή λίγο μετά από αυτή. Όταν η εφαρμοζόμενη δόση είναι μεγαλύτερη των 633 κεκ. σκευάσματος/στρ να πραγματοποιείται εφαρμογή μόνο στο 10% της έκτασης του αγρού δηλαδή spot εφαρμογή.	
	Ξυλώδεις θάμνοι, βάτα ( <i>Rubus</i> sp. - RUBSS)	500-1000	20-40		
Κατά μήκος αρδευτικών & στραγγιστικών καναλιών	Υδροχαρή ζιζάνια	800-1000	20-40	Κοντά ή κατά την άνθηση των ζιζανίων. Να πραγματοποιείται εφαρμογή μόνο στο 10% της έκτασης του αγρού δηλαδή spot εφαρμογή.	1

-Μέγιστη δόση στο σύνολο των εφαρμογών/12 μήνες: 432 γρ. glyphosate/στρέμμα.

Παρατηρήσεις:

1. Στις δενδρώδεις καλλιέργειες ο ψεκασμός των ζιζανίων πρέπει να είναι κατευθυνόμενος αποφεύγοντας επαφή των σταγονιδίων του ψεκαστικού διαλύματος με φύλλωμα, τρυφερούς βλαστούς, παραφυάδες και μη επουλωμένες πληγές κλαδέματος. Ο ψεκασμός επιτρέπεται μόνο σε εγκατεστημένους οπωρώνες από το τρίτο (3<sup>ο</sup>) έτος από την φύτευσή τους και μετά, ανάλογα με την ανάπτυξη των φυτών.
2. Για τα πλατύφυλλα ζιζάνια *Malva* spp. (μολόχα), *Urtica* spp. (τσουκνίδα), *Polygonum* spp., *Portulaca oleracea* (αντράκλα), η δόση κυμαίνεται από 400-600 κ. εκ./στρέμμα, ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης τους.
3. Για την καταπολέμηση των ετήσιων ζιζανίων απαιτούνται συνήθως μία με δύο εφαρμογές (χειμώνα-άνοιξη) ή/και (καλοκαίρι-φθινόπωρο) ανάλογα με την εποχή εμφάνισης των ζιζανίων και την καλλιέργεια, όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο της ζωηρής τους ανάπτυξης.
4. Για την καταπολέμηση πολυετών ζιζανίων απαιτείται συνήθως μία εφαρμογή όταν τα ζιζάνια βρίσκονται κοντά στην άνθηση κατά την άνθηση ή λίγο μετά από αυτή.
5. Επιβάλλεται η χρήση προστατευτικών καλυμμάτων (καλυπτρών) γύρω από τα μπεκ για την αποφυγή φυτοτοξικότητας στις καλλιέργειες.
6. Η χρήση στη ροδακινιά περιλαμβάνει τη νεκταρινιά.
7. Για την αγριάδα, η εφαρμογή να γίνεται όταν έχει ύψος 15 – 30 εκατοστά.
8. Για την φτέρη η εφαρμογή να γίνεται μετά το ξεδίπλωμα της κορυφής.
9. Να μην γίνεται ψεκασμός, αν αναμένεται βροχή σε 6 ώρες.
10. Να μην χρησιμοποιείται σε καλλιέργειες, που προορίζονται για σποροπαραγωγή.
11. Για τις επιτραπέζιες ελιές επιτρέπεται η συλλογή τους μόνο από το δένδρο.
12. Δεν επιτρέπεται η εφαρμογή στις πεσμένες στο έδαφος ελιές.
13. Να μη συλλέγονται ελιές από το έδαφος προκειμένου να αποφευχθούν υπολείμματα.
14. Μην ψεκάζετε όταν φυσάει.

II. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 10237/292601/08.12.2023 απόφασή μας.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας»  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

**Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ**