



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 10.09.2024
Αριθ. πρωτ: 3643/94386

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Δ. Μακρογιάννη
Τηλέφωνο: 210 9287160
e-mail: dmakrogianni@minagric.gr

Προς: SIPCAM OXON S.p.A, Ιταλίας
(Δια της SIPCAM ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ. Α.Ε.)
e-mail: info@sipcam.gr

ΘΕΜΑ: «Διεύρυνση της αριθμ. 70505 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) BRIXTON (clethodim 18% β/ο) σε ήσσονος σημασίας χρήσεις»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις:
 - Του ν. 4036/2012 (Α'8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - Του ν. 2690/1999 (Α'45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 - Του ν. 4622/2019 (Α'133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
- Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 51 αυτού.
- Το αριθμ. 32/2024 Π.Δ. «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών.» (Α'91/14.06.2024).
- Την αριθμ. 10088/115732/26.09.2013 Υπουργική απόφαση (Β'2587) σχετικά με την «Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσονος σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσονος σημασίας».
- Την αριθμ. 1881/286212/13.10.2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β'4612/19.10.20).
- Το αριθμ. 12862/330936/07.12.2020 έγγραφο της Υπηρεσίας με θέμα «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά».
- Την αριθμ. 11520/326563/03.11.2023 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η αριθμ. 70505 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) BRIXTON (clethodim 18% β/ο), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
- Την αριθμ. 3643/94386/01.04.2024 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- Διευρύνουμε την αριθμ. 70505 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) BRIXTON (clethodim 18% β/ο), που χορηγήθηκε με την αριθμ.

11520/326563/03.11.2023 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε ήσσονος σημασίας χρήσεις.

Τα σημεία **5**, **11** και **13** διαμορφώνονται ως εξής:

5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής	Μεγ. αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/ Μεσοδιάστημα (ημέρες)
		κ.εκ./ στρέμμα	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ.		
Ρύζι ¹ ORYSA	Ετήσια ζιζάνια* Πολυετή ζιζάνια*	100-160	15-40	Μεταφυτρωτικά των ζιζανίων - Προσπαρτικά της καλλιέργειας. (BBCH00)	1
Ελαιοκράμβη BRSNN	Ετήσια ζιζάνια* Από 2-3 φύλλα έως και πριν το αδελφωμα Από την αρχή έως το τέλος του αδελφώματος	70 100	15-40	Μεταφυτρωτικά των ζιζανίων, πριν την εμφάνιση των πλάγιων βλαστών έως την έναρξη επιμήκυνσης του κύριου βλαστού της καλλιέργειας. (BBCH 20-30)	1
Ζαχαρότευτλα ⁶ BEAVA	Ετήσια ζιζάνια* Από 2-3 φύλλα έως και πριν το αδελφωμα Από την αρχή έως το τέλος του αδελφώματος	70 100	15-40	Μεταφυτρωτικά των ζιζανίων, από το στάδιο του 2 ^{ου} πραγματικού φύλλου έως το στάδιο κλεισίματος των γραμμών της καλλιέργειας. (BBCH 12-39)	1
	Πολυετή ζιζάνια* Επιθυμητό ύψος ζιζανίων 20-30cm	140	15-40	Μεταφυτρωτικά των ζιζανίων, από το στάδιο του 2 ^{ου} πραγματικού φύλλου έως το στάδιο κλεισίματος των γραμμών της καλλιέργειας. (BBCH 12-39)	1 εφαρμογή ανά 2 έτη
Φινόκιο (Μαραθόριζα) FOEVA	Ετήσια ζιζάνια* Από 2-3 φύλλα έως και πριν το αδελφωμα Από την αρχή έως το τέλος του αδελφώματος	70 100-140	15-40	Μεταφυτρωτικά των ζιζανίων, από το στάδιο του 2 ^{ου} πραγματικού φύλλου έως την έκπτυξη του 6 ^{ου} πραγματικού φύλλου της καλλιέργειας. (BBCH 12-16)	1 εφαρμογή ανά έτος
	Πολυετή ζιζάνια* Επιθυμητό ύψος ζιζανίων 20-30cm	140			

Τομάτα LYPES Μελιτζάνα SOLME	Ετήσια ζιζάνια* Από 2-3 φύλλα έως και πριν το αδελφωμα	70	15-40	Μεταφυτρωτικά των ζιζανίων, από το στάδιο του 2 ^{ου} πραγματικού φύλλου έως πριν την άνθηση της καλλιέργειας. (BBCH 12-59)	1
	Από την αρχή έως το τέλος του αδελφώματος	100-140			
	Πολυετή ζιζάνια* Επιθυμητό ύψος ζιζανίων 20-30cm	140			
Βαμβάκι GOSHI	Ετήσια ζιζάνια*	100-140	15-40	Μεταφυτρωτικά των ζιζανίων, από το στάδιο 2 ^{ου} φύλλου έως την πλήρη κάλυψη της καλλιέργειας (Περίπου 90% της κάλυψης των σειρών). (BBCH 12-49)	1
	Αγριάδα <i>Cynodon dactylon</i>	200			
Ηλιάνθος HELAN	Ετήσια ζιζάνια* Από 2-3 φύλλα έως και πριν το αδελφωμα	70	15-40	Μεταφυτρωτικά των ζιζανίων, από το στάδιο του 2ου πραγματικού φύλλου μέχρι να κλείσει το 30% της γραμμής της καλλιέργειας. (BBCH 12-33)	1
	Από την αρχή έως το τέλος του αδελφώματος	100			
	Πολυετή ζιζάνια* Επιθυμητό ύψος ζιζανίων 20-30cm	140			
Πατάτα SOLTU	Ετήσια ζιζάνια* Από 2-3 φύλλα έως και πριν το αδελφωμα	70	15-40	Μεταφυτρωτικά των ζιζανίων, από το στάδιο του 2 ^{ου} πραγματικού φύλλου έως την ολοκλήρωση της βλαστικής ανάπτυξης/ κάλυψη των σειρών της καλλιέργειας. (BBCH 12-39)	1
	Από την αρχή έως το τέλος του αδελφώματος	100			
	Πολυετή ζιζάνια* Επιθυμητό ύψος ζιζανίων 20-30cm	140			
Μηδική MEDSA	Ετήσια ζιζάνια* Από 2-3 φύλλα έως και πριν το αδελφωμα	70	15-40	Μεταφυτρωτικά των ζιζανίων, από το στάδιο του 2 ^{ου} πραγματικού φύλλου έως ότου το προς συγκομιδή μέρος φθάσει στο τυπικό του μέγεθος της καλλιέργειας. (BBCH 12-49)	1
	Από την αρχή έως το τέλος του αδελφώματος	100			
	Πολυετή ζιζάνια* Επιθυμητό ύψος ζιζανίων 20-30cm	140			
Καρότο DAUCS	Ετήσια ζιζάνια* Από 2-3 φύλλα έως και πριν το αδελφωμα	70	15-40	Μεταφυτρωτικά των ζιζανίων, από το στάδιο του 2 ^{ου} πραγματικού φύλλου μέχρι το εδώδιμο τμήμα του φυτού να	1 εφαρμογή ανά έτος
	Από την αρχή έως το τέλος του αδελφώματος	100-140			

	Πολυετή ζιζάνια* Επιθυμητό ύψος ζιζανίων 20-30cm	140		φτάσει στο 50% της τελικής της διαμέτρου. (BBCH 12-45)	
Αγκινάρα CYUSC	Ετήσια ζιζάνια* Από 2-3 φύλλα έως και πριν το αδελφωμα	70	15-40	Μεταφυτρωτικά των ζιζανίων, από το στάδιο του 2 ^{ου} πραγματικού φύλλου έως την έναρξη της επιμήκυνσης του κύριου βλαστού της καλλιέργειας. (BBCH 12-51)	1 εφαρμογή ανά έτος
	Από την αρχή έως το τέλος του αδελφώματος	100-140			
	Πολυετή ζιζάνια* Επιθυμητό ύψος ζιζανίων 20-30cm	140			
Κρεμμύδι ALLCE Σκόρδο ALLSA Ασκαλώνια ALLAS	Ετήσια ζιζάνια* Από 2-3 φύλλα έως και πριν το αδελφωμα	70	15-40	Μεταφυτρωτικά των ζιζανίων, από το στάδιο του 2 ^{ου} πραγματικού φύλλου της καλλιέργειας έως ότου ο βολβός έχει φθάσει στο 50% του τελικού του μεγέθους (BBCH 12-45)	1
	Από την αρχή έως το τέλος του αδελφώματος	100-140			
	Πολυετή ζιζάνια* Επιθυμητό ύψος ζιζανίων 20-30cm	140			
Αμπέλι VITVI	Ετήσια ζιζάνια* Από 2-3 φύλλα έως και πριν το αδελφωμα	70	15-40	Μεταφυτρωτικά των ζιζανίων. Εφαρμογή μέχρι την πλήρη ανάπτυξη των καρπών, σε λωρίδες κάτω από την κόμη στο 30% της συνολικής επιφάνειας του αγρού. (BBCH 00-79)	1
	Από την αρχή έως το τέλος του αδελφώματος	100-133			
	Πολυετή ζιζάνια* Επιθυμητό ύψος ζιζανίων 20-30cm	133			
Ελιά ² OLVEU	Ετήσια ζιζάνια* Από 2-3 φύλλα έως και πριν το αδελφωμα	70	15-40	Μεταφυτρωτικά των ζιζανίων. Εφαρμογή μέχρι την έναρξη της ωρίμανσης, σε λωρίδες κάτω από την κόμη στο 30% της συνολικής επιφάνειας του αγρού. (BBCH 00-87)	2/20
	Από την αρχή έως το τέλος του αδελφώματος	100-133			
	Πολυετή ζιζάνια* Επιθυμητό ύψος ζιζανίων 20-30cm	133			
Ροδιά ⁵ PUNGR	Ετήσια ζιζάνια* Από 2-3 φύλλα έως και πριν το αδελφωμα	70	15-40	Μεταφυτρωτικά των ζιζανίων. Εφαρμογή μέχρι την έναρξη της ωρίμανσης, σε λωρίδες κάτω από την κόμη στο 30% της συνολικής επιφάνειας του αγρού. (BBCH 00-87)	1
	Από την αρχή έως το τέλος του αδελφώματος	100-133			
	Πολυετή ζιζάνια* Επιθυμητό ύψος ζιζανίων 20-30cm	133			
Λωτός ⁶ DOSCA	Ετήσια ζιζάνια* Από 2-3 φύλλα έως και πριν το αδελφωμα Από την αρχή έως το	70	15-40	Μεταφυτρωτικά των ζιζανίων. Εφαρμογή μέχρι την έναρξη της ωρίμανσης, σε λωρίδες κάτω από	1

	τέλος του αδελφώματος	100-133		την κόμη στο 30% της συνολικής επιφάνειας του αγρού. (BBCH 00-87)	
	Πολυετή ζιζάνια* Επιθυμητό ύψος ζιζανίων 20-30cm	133			
Μηλιά MABSD Αχλαδιά PYUCO Κυδωνιά CYDOB Μουσμουλιά MSPGE Ιαπωνικά μούσμουλα ΕΙΟJA	Ετήσια ζιζάνια* Από 2-3 φύλλα έως και πριν το αδελφωμα	70	15-40	Μεταφυτρωτικά των ζιζανίων. Εφαρμογή μέχρι την έναρξη της ωρίμανσης, σε λωρίδες κάτω από την κόμη στο 30% της συνολικής επιφάνειας του αγρού. (BBCH 00-87)	1
	Από την αρχή έως το τέλος του αδελφώματος	100-133			
	Πολυετή ζιζάνια* Επιθυμητό ύψος ζιζανίων 20-30cm	133			
Βερυκοκιά PRNAR Ροδακινιά PRNPS Δαμασκηλιά PRNDO Κερασιά PRNCE	Ετήσια ζιζάνια* Από 2-3 φύλλα έως και πριν το αδελφωμα	70	15-40	Μεταφυτρωτικά των ζιζανίων. Εφαρμογή μέχρι την έναρξη της ωρίμανσης, σε λωρίδες κάτω από την κόμη στο 30% της συνολικής επιφάνειας του αγρού. (BBCH 00-87)	1
	Από την αρχή έως το τέλος του αδελφώματος	100-133			
	Πολυετή ζιζάνια* Επιθυμητό ύψος ζιζανίων 20-30cm	133			
Πορτοκαλιά CIDSΙ Γκρέιπφρούτ CIDPA Λεμονιά CIDLI Μανταρινιά CIDRE Λιμμετία (Πράσινα λεμόνια) CIDAΦ	Ετήσια ζιζάνια* Από 2-3 φύλλα έως και πριν το αδελφωμα	70	15-40	Μεταφυτρωτικά των ζιζανίων. Εφαρμογή μέχρι την πλήρη ωρίμανση του καρπού, σε λωρίδες κάτω από την κόμη στο 30% της συνολικής επιφάνειας του αγρού (BBCH 00-89)	2/20
	Από την αρχή έως το τέλος του αδελφώματος	100-133			
	Πολυετή ζιζάνια* Επιθυμητό ύψος ζιζανίων 20-30cm	133			
Ακτινιδιά ⁶ ΑΤΙCH	Ετήσια ζιζάνια* Από 2-3 φύλλα έως και πριν το αδελφωμα	70	15-40	Μεταφυτρωτικά των ζιζανίων. Εφαρμογή μέχρι την πλήρη ανάπτυξη των καρπών, σε λωρίδες κάτω από την κόμη στο 30% της συνολικής επιφάνειας του αγρού (BBCH 00-79)	1
	Από την αρχή έως το τέλος του αδελφώματος	100-133			
	Πολυετή ζιζάνια* Επιθυμητό ύψος ζιζανίων 20-30cm	133			
Αμυγδαλιά PRNDU	Ετήσια ζιζάνια* Από 2-3 φύλλα έως και πριν το αδελφωμα	70	15-40	Μεταφυτρωτικά των ζιζανίων. Εφαρμογή μέχρι την έναρξη της ωρίμανσης, σε λωρίδες κάτω από την κόμη στο 30% της	2/20
	Από την αρχή έως το τέλος του αδελφώματος	100-133			

	Πολυετή ζιζάνια* Επιθυμητό ύψος ζιζανίων 20-30cm	133		συνολικής επιφάνειας του αγρού. (BBCH 00-87)	
Φουντουκιά CYLAV	Ετήσια ζιζάνια* Από 2-3 φύλλα έως και πριν το αδελφωμα	70	15-40	Μεταφυτρωτικά των ζιζανίων. Εφαρμογή μέχρι την έναρξη της ωρίμανσης, σε λωρίδες κάτω από την κόμη στο 30% της συνολικής επιφάνειας του αγρού. (BBCH 00-87)	1
	Από την αρχή έως το τέλος του αδελφώματος	100-133			
	Πολυετή ζιζάνια* Επιθυμητό ύψος ζιζανίων 20-30cm	133			
Καλλωπιστικά ⁶ NNNZZ	Ετήσια ζιζάνια* Από 2-3 φύλλα έως και πριν το αδελφωμα	70	15-40	Μεταφυτρωτικά των ζιζανίων. Εφαρμογή ανάλογα με την ανάπτυξη των ζιζανίων. (BBCH 12-71)	1 εφαρμογή ανά έτος
	Από την αρχή έως το τέλος του αδελφώματος	100-140			
	Πολυετή ζιζάνια* Επιθυμητό ύψος ζιζανίων 20-30cm	140			
Σπαράγγι ⁶ ASPOF	Ετήσια ζιζάνια* Από 2-3 φύλλα έως και πριν το αδελφωμα	70	15-40	Μεταφυτρωτικά των ζιζανίων. Εφαρμογή πριν από την εμφάνιση των εδώδιμων βλαστών ή μετά τη συγκομιδή.	1 εφαρμογή ανά έτος
	Από την αρχή έως το τέλος του αδελφώματος	100-140			
	Πολυετή ζιζάνια* Επιθυμητό ύψος ζιζανίων 20-30cm	140			
Ραπάνια/ Ραφανίδες RAPRA Χρένα ARWLA Γογγύλια BRSRR Κοκκινογούλια BEAVD	Ετήσια ζιζάνια* Από 2-3 φύλλα έως και πριν το αδελφωμα	70	15-40	Μεταφυτρωτικά των ζιζανίων, από το στάδιο του 2 ^{ου} πραγματικού φύλλου μέχρι η ρίζα να φτάσει στο 50% της τελικής της διαμέτρου (BBCH 12-45)	1 εφαρμογή ανά έτος
	Από την αρχή έως το τέλος του αδελφώματος	100-140			
	Πολυετή ζιζάνια* Επιθυμητό ύψος ζιζανίων 20-30cm	140			
Φυτόρια οπωρώνων και αμπέλου	Ετήσια ζιζάνια* Από 2-3 φύλλα έως και πριν το αδελφωμα	70	15-40	Μεταφυτρωτικά των ζιζανίων. Εφαρμογή ανάλογα με την ανάπτυξη των ζιζανίων επί των γραμμών φύτευσης με μέγιστη κάλυψη το 30% της επιφάνειας του αγρού (BBCH 00-87)	1
	Από την αρχή έως το τέλος του αδελφώματος	100-133			
	Πολυετή ζιζάνια* Επιθυμητό ύψος ζιζανίων 20-30cm	133			
Σουσαμί ⁷ SEGIN Χρήση Ήσσανος	Ετήσια ζιζάνια* Από 2-3 φύλλα έως και πριν το αδελφωμα	70	15-40	Μεταφυτρωτικά των ζιζανίων, από το στάδιο 2 ^{ου} φύλλου έως την πλήρη κάλυψη της	1

Σημασία	Από την αρχή έως το τέλος του αδελφώματος	100-140		καλλιέργειας (Περίπου 90% της κάλυψης των σειρών). (BBCH 12-49)	
	Πολυετή ζιζάνια* Επιθυμητό ύψος ζιζανίων 20-30cm	140			
Φιστικιά⁷ ΡΙΑΒΕ Χρήση Ήσσοнос Σημασία	Ετήσια ζιζάνια* Από 2-3 φύλλα έως και πριν το αδελφωμα	70	15-40	Μεταφυτρωτικά των ζιζανίων. Εφαρμογή μέχρι την έναρξη της ωρίμανσης, σε λωρίδες κάτω από την κόμη στο 30% της συνολικής επιφάνειας του αγρού. (BBCH 00-87)	2/20
	Από την αρχή έως το τέλος του αδελφώματος	100-133			
	Πολυετή ζιζάνια* Επιθυμητό ύψος ζιζανίων 20-30cm	133			
Σέλερι⁷ ΑΡΥΓΔ Χρήση Ήσσοнос Σημασία	Ετήσια ζιζάνια* Από 2-3 φύλλα έως και πριν το αδελφωμα	70	15-40	Μεταφυτρωτικά των ζιζανίων, από το στάδιο του 2 ^{ου} πραγματικού φύλλου έως την έκπτυξη του 6 ^{ου} πραγματικού φύλλου της καλλιέργειας. (BBCH 12-16)	1 εφαρμογή ανά έτος
	Από την αρχή έως το τέλος του αδελφώματος	100-140			
	Πολυετή ζιζάνια* Επιθυμητό ύψος ζιζανίων 20-30cm	140			
Σελινόριζα⁷ (Ραπανοσέλινο) ΒΡΣΡΡ Γουλί⁷ ΒΡΣΝΝ Χρήσεις Ήσσοнос Σημασία	Ετήσια ζιζάνια* Από 2-3 φύλλα έως και πριν το αδελφωμα	70	15-40	Μεταφυτρωτικά των ζιζανίων, από το στάδιο του 2 ^{ου} πραγματικού φύλλου έως το στάδιο κλεισίματος των γραμμών της καλλιέργειας. (BBCH 12-39)	1
	Από την αρχή έως το τέλος του αδελφώματος	100-140			
	Πολυετή ζιζάνια* Επιθυμητό ύψος ζιζανίων 20-30cm	140	15-40		1 εφαρμογή ανά 2 έτη

Παρατηρήσεις:

1. Για το ρύζι η εφαρμογή να γίνεται σε στεγνά τηγάνια πριν μπει το νερό και με ήδη φυτρωμένα τα ζιζάνια. Μετά την εφαρμογή περιμένετε τουλάχιστον 2 ημέρες πριν την εισαγωγή του νερού. Γεμίστε το τηγάνι με νερό για τουλάχιστον 48 ώρες πριν τη σπορά του ρυζιού.
2. Για τις επιτραπέζιες ελιές επιτρέπεται η συλλογή τους μόνο από το δένδρο.
3. Δεν επιτρέπεται η εφαρμογή στις πεσμένες στο έδαφος ελιές.
4. Η χρήση στη ροδακινιά περιλαμβάνει και την νεκταρινιά.
5. Κατά τη χρήση του σκευάσματος στις ανωτέρω ετήσιες καλλιέργειες οι οποίες προορίζονται για σποροπαραγωγή, η τελευταία εφαρμογή να πραγματοποιείται πριν από το σχηματισμό των ανθοφόρων οφθαλμών.
6. Δεν έχει ελεγχθεί η φυτοτοξικότητα στις καλλιέργειες σπαραγγιού, λωτού, ακτινιδίου, ροδιάς, ζαχαροτεύτλων και καλλωπιστικών φυτών. Να προηγείται δοκιμαστική εφαρμογή σε μικρή κλίμακα.
7. Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες σουσαμιού, φιστικιάς, σέλερι, σελινόριζας και γουλιού από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.

*Καταπολεμούμενα ζιζάνια:

- Πατάτα, ζαχαρότευτλα, ηλιάνθος, μηδική, **σουσάμι:**

Ετήσια ζιζάνια

Πριν το αδελφωμα των ζιζανίων(δόση 70 κ.εκ/στρ)

Ευαίσθητα ζιζάνια:
Αλεπονουρά (*Alopecurus myosuroides*-ALOMY),
Ήρα (*Lolium* sp.- LOLSS)
Αγριοβρώμη (*Avena* sp. - AVESS),

Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια:
Αιματόχορτο (*Digitaria sanguinalis*- DIGSA),
Μουχρίτσα (*Echinochloa crus-galli*- ECHCG),
Σετάρια (*Setaria* sp. -SETSS)

Πολυετή ζιζάνια (140 κ.εκ/στρ) :

Ευαίσθητα ζιζάνια
Αγριάδα (*Cynodon dactylon*- CYNDA),
Βέλιουρας (*Sorghum halepense* –SORHA)
Πολυετής Ήρα (*Lolium perenne*- LOLPE),

Μετά το αδελφωμα των ζιζανίων (δόση 100 κ.εκ/στρ)

Ευαίσθητα ζιζάνια:
Βρώμος (*Bromus* sp. - BROSS),
Σετάρια (*Setaria* sp. -SETSS)

Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια:
Αλεπονουρά (*Alopecurus myosuroides*- ALOMY),
Αιματόχορτο (*Digitaria sanguinalis* - DIGSA),
Μουχρίτσα (*Echinochloa crus-galli* - ECHCG),
Αγριοβρώμη (*Avena* sp. - AVESS)

- Ελαιοκράμβη:

Ετήσια ζιζάνια

Πριν το αδελφωμα των ζιζανίων(δόση 70 κ.εκ/στρ)

Ευαίσθητα ζιζάνια:
Αλεπονουρά (*Alopecurus myosuroides*-ALOMY),
Ήρα (*Lolium* sp.- LOLSS)
Αγριοβρώμη (*Avena* sp. - AVESS),

Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια:
Αιματόχορτο (*Digitaria sanguinalis*- DIGSA),
Μουχρίτσα (*Echinochloa crus-galli*- ECHCG),
Σετάρια (*Setaria* sp. -SETSS)

Μετά το αδελφωμα των ζιζανίων(δόση 100 κ.εκ/στρ)

Ευαίσθητα ζιζάνια:
Βρώμος (*Bromus* sp. - BROSS),
Σετάρια (*Setaria* sp. -SETSS)

Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια:
Αλεπονουρά (*Alopecurus myosuroides*- ALOMY),
Αιματόχορτο (*Digitaria sanguinalis* - DIGSA),
Μουχρίτσα (*Echinochloa crus-galli* - ECHCG),
Αγριοβρώμη (*Avena* sp. - AVESS)

- Αγκινάρα, σπαράγγι, κρεμμύδι, σκόρδο, ασκαλώνια, καρότο, μάραθος, τομάτα, μελιτζάνα, ραπάνια/ραφανίδες, χρένα, γογγύλια, κοκκινογούλια, καλλωπιστικά, **σέλερι, σελινόριζα, γουλί:**

Ετήσια ζιζάνια

Πριν το αδελφωμα (δόση 70 κ.εκ/στρ)

Ευαίσθητα ζιζάνια:
Μουχρίτσα (*Echinochloa crus-galli* - ECHCG),
Αιματόχορτο (*Digitaria sanguinalis* - DIGSA),
Σετάρια (*Setaria* sp. -SETSS)
Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια:
Αγριοβρώμη (*Avena* sp. - AVESS),
Ήρα (*Lolium* sp. - LOLSS)

Πολυετή ζιζάνια (140 κ.εκ/στρ) :

Ευαίσθητα ζιζάνια:
Αγριάδα (*Cynodon dactylon* - CYNDA),
Τραχεία λειβαδοπόα (*Poa trivialis*- POATR),
Πολυετής Ήρα (*Lolium perenne*- LOLPE),
Βέλιουρας (*Sorghum halepense* -SORHA)
Φεστούκα (*Festuca* sp. - FESSS)

Μετά το αδελφωμα (δόση 100-140 κ.εκ/στρ)

Ευαίσθητα ζιζάνια:
Αγριοβρώμη (*Avena* spp -AVESS),
Αιματόχορτο (*Digitaria sanguinalis* - DIGSA),
Μουχρίτσα (*Echinochloa crus-galli* - ECHCG),
Σετάρια (*Setaria* sp. -SETSS)

Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια:
Ήρα (*Lolium* sp.- LOLSS)

- Αμπέλι, ελιά, εσπεριδοειδή, λωτός, ρόδι, μηλοειδή, πυρηνόκαρπα, ακρόδρυα, ακτινιδιά, φυτώρια οπωρώνων και αμπέλου:

Ετήσια ζιζάνια

<u>Πριν το αδελφωμα (δόση 70 κ.εκ/στρ)</u>	<u>Μετά το αδελφωμα (δόση 100-133 κ.εκ/στρ)</u>
Ευαίσθητα ζιζάνια: Αγριοβρώμη (<i>Avena</i> sp. - AVESS), Μουχρίτσα (<i>Echinochloa crus-galli</i> - ECHCG), Σετάρια (<i>Setaria</i> sp. -SETSS)	Ευαίσθητα ζιζάνια Αγριοβρώμη (<i>Avena</i> spp -AVESS) Βρώμος (<i>Bromus</i> sp. - BROSS), Αιματόχορτο (<i>Digitaria sanguinalis</i> -DIGSA), Μουχρίτσα (<i>Echinochloa crus-galli</i> - ECHCG) Ήρα (<i>Lolium</i> sp.- LOLSS) Σετάρια (<i>Setaria</i> sp. -SETSS) Αγριοκρίθαρο (<i>Hordeum</i> sp. - HORSS)

Πολυετή ζιζάνια (δόση 133 κ.εκ/στρ)

Ευαίσθητα ζιζάνια:
Αγριάδα (*Cynodon dactylon* - CYNDA),
Πολυετής Ήρα (*Lolium perenne*- LOLPE),
Βέλιουρας (*Sorghum halepense* -SORHA)
Φεστούκα (*Festuca* sp. - FESSS)
Τραχεία λειβαδοπόα (*Poa trivialis* - POATR),

- Βαμβάκι

Ετήσια ζιζάνια (δόση 100-140 κ.εκ/στρ)

Ευαίσθητα ζιζάνια:
Αιματόχορτο (*Digitaria sanguinalis*-DIGSA),
Μουχρίτσα (*Echinochloa crus-galli*- ECHCG)
Βέλιουρας από σπόρο (*Sorghum halepense* -SORHA)

Πολυετή ζιζάνια (δόση 200 κ.εκ/στρ)

Μετρίως Ευαίσθητα ζιζάνια: Αγριάδα (*Cynodon dactylon* - CYNDA)

- Ρύζι

Ετήσια ζιζάνια (δόση 100-160 κ.εκ/στρ)

Ευαίσθητα ζιζάνια:
Μουχρίτσα (*Echinochloa crus-galli*- ECHCG)

Πολυετή ζιζάνια (δόση 100-160 κ.εκ/στρ)

Ευαίσθητα ζιζάνια:
Κόκκινο ρύζι (*Oryza rufipogon* - ORYRU)

13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Καλλιέργεια	Ημέρες
Ζαχαρότευτλο (0900010), Σελινόριζα (0213030), Γουλί (0213100)	60
Φινόκιο (0270040), Σέλερι (0270030)	50
Μηδική, Πατάτα (0211000), Καρότο (0213020), Αγκινάρα (0270050), Ραπάνια/ Ραφανίδες (0213080), Χρένα (0213040), Γογγύλια (0213110),	40

Κοκκινογούλια (0213010)	
Κρεμμύδι (0220020), Σκόρδο (0220010), Ασκαλώνια (0220030)	35
Σπαράγγι (0270010)	30
Τομάτα (0231010), Μελιτζάνα (0231030)	28
Φουντουκιά (0120060), Αμυγδαλιά (0120010), Φιστικιά (0120100)	20
Βερικοκιά (0140010), Ροδακινιά-Νεκταρινιά (0140030), Δαμασκηνιά (0140040)	14
Μηλιά (0130010), Αχλαδιά (0130020), Κυδωνιά (0130030), Μουσμουλιά (0130040), Ιαπωνικά μούσμουλα (0130050), Λωτός (0161060)	10
Ελιά (0402010), Πορτοκαλιά (0110020), Μανταρινιά (0110050), Γκρέιπφρουτ (0110010), Λεμονιά (0110030), Λιμμετία (0110040), Κερασιά (0140020), Ακτινιδιά (0162010), Ροδιά (0163050)	7
Αμπέλι (0151000)	3
Ρύζι (0500060), Ελαιοκράμβη (0401060), Βαμβάκι (0401090), Ηλίανθος (0401050), Φυτώρια οπωρώνων και αμπέλου, Καλλωπιστικά, Σουσάμι (0401040)	Μη εφαρμόσιμο

II. Διάθεση αποθεμάτων

1. Η ετικέτα του σκευάσματος να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
2. Για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, επιτρέπεται η τοποθέτηση στις συσκευασίες του σκευάσματος της μέχρι σήμερα ισχύουσας ετικέτας.
3. Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις συσκευασίες του σκευάσματος θα τοποθετείται υποχρεωτικά η νέα τροποποιημένη ετικέτα.

- III. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 11520/326563/03.11.2023 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

**«Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Δ/σης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ