



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 20.09.2024
Αριθ. πρωτ: 10143/280108

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Αθήνα
Πληροφορίες: Σ.Ολοκτσίδου
Τηλέφωνο: 210 9287256
e-mail: soloktsidou@minagric.gr

Προς: **SINON EU GmbH, Γερμανίας**
(διά του υπεύθυνου επικοινωνίας της εταιρείας **Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε. «Agribiz»**)
Μιχαλακοπούλου 157, 115 27 Αθήνα
Τηλ.: 210 7471000
email: info@agribiz.gr

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθμ. 61087 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) CALIZI (δ.ο azoxystrobin 25% β/ο) ως προς τον υπεύθυνο επικοινωνίας, το φάσμα δράσης, τις ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτουγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί, τις δηλώσεις προφύλαξης και την προστασία των καταναλωτών»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις:
 - Του ν. 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - Του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 - του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
- Τον (ΕΚ) αριθμ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα τα άρθρα 44 και 45 αυτού.
- Το αριθμ. 32/20224 Π.Δ. «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 91/14.06.2024).
- Την αριθμ. 1881/286212/13.10.2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β' 4612/19.10.20).
- Το αριθμ. 12862/330936/07.12.2020 έγγραφο της Υπηρεσίας με θέμα «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά».
- Την αριθμ. 6527/187194/24.10.2022 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμ. 61087 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) CALIZI (δ.ο azoxystrobin 25% β/ο), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
- Την αριθμ. 5645/66835/03.12.2015 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμ. 60485 άδεια διάθεσης στην αγορά του προϊόντος αναφοράς (μυκητοκτόνο) SINSTAR 250 SC (δ.ο azoxystrobin 25% β/ο), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
- Τις αριθμ. 9415/258752/30.08.204 και 10143/280108/18.09.2024 αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- I. Τροποποιούμε την αριθμ. 61087 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) CALIZI (δ.ο azoxystrobin 25% β/ο) που χορηγήθηκε με την αριθμ. 6527/187194/24.10.2022 απόφαση μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς τον υπεύθυνο επικοινωνίας, το φάσμα δράσης, τις ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί, τις δηλώσεις προφύλαξης και την προστασία των καταναλωτών.

Τα σημεία **1.4α), 5, 6, 11 και 13** διαμορφώνονται ως εξής:

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

SINON EU GmbH
ImAltenDorfe 37 (Volksdorf),
D-22359 Hamburg Γερμανία
Τηλ.: +49-406599 5039
Fax: +49-406599 5158
e-mail: sinoneu@aol.com
Contact: Mr Hans Brandt

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε. «Agribiz»
Μιχαλακοπούλου 157, 115 27 Αθήνα
Τηλ.: 210 7471000
e-mail: info@agribiz.gr

5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο. Μεσοδιάστημα εφαρμογών
		κ.εκ. /στρ.	κ.εκ. /100 λίτρα ψ.υ.	Όγκος ψεκ. Υγρού λίτρα /στρ.		
ΑΜΠΕΛΙ (VITVI)	Ωίδιο (<i>Uncinula necator</i> - UNCINE) Περονόσπορος (<i>Plasmopara viticola</i> - PLASVI)	100	100 – 500	20 – 100	Ψεκασμοί φυλλώματος προστατευτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων.	2 / 10 – 12
ΤΟΜΑΤΑ (LYPES)	Ωίδιο (<i>Leveillula taurica</i> - LEVETA) Περονόσπορος (<i>Phytophthora infestans</i> - PHYTIN) Αλτερνάρια (<i>Alternaria</i> sp. - ALTESP)	70 – 80	87.5 – 400	20 – 80	Ψεκασμοί φυλλώματος προστατευτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων.	2 / 7 – 10
Ρύζι (ORYSA)	Πυρρικουλάρια (<i>Pyricularia oryzae</i> – PYRIOR)	100	--	20 – 40	Ψεκασμοί φυλλώματος. Από την έναρξη της έκπτυξης του	2 / 14

	<p>Ελμινθοσπόριο <i>Helminthosporium</i> <i>Oryzae</i> - COCHMI)</p>			<p>φύλλου σημαίας έως την έναρξη της άνθησης. BBCH 45-61</p> <p>Η 1^η εφαρμογή γίνεται από την έναρξη της έκπτυξης του φύλλου σημαίας έως την έναρξη της έκπτυξης της ταξιανθίας (BBCH 45-51), και η 2^η εφαρμογή, εάν κρίνεται απαραίτητη, από το στάδιο όπου το 70% της ταξιανθίας έχει εμφανισθεί έως και την έναρξη της άνθησης (BBCH 57-61)</p>	
<p>Παρατηρήσεις:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Να μην χρησιμοποιείται σε σπορεία και φυτώρια. 2. Το εύρος των δόσεων εξαρτάται από την ένταση της προσβολής. Χρησιμοποιήστε την υψηλότερη δόση ή το συντομότερο διάστημα εφαρμογής εφόσον υπάρχουν συνθήκες ιδιαίτερα ευνοϊκές για την ανάπτυξη παθογένειας. 					

6 Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

Διαχείριση Ανθεκτικότητας

- Μην πραγματοποιείτε περισσότερες από 2 εφαρμογές ανά καλλιεργητική περίοδο, εναλλάσσοντας κάθε εφαρμογή του CALIZI με τουλάχιστον μία εφαρμογή με προϊόντα διαφορετικής δραστικής ουσίας και μηχανισμού δράσης.
- Μην αυξάνετε τις δόσεις

Στην καλλιέργεια του ρυζιού να μην εφαρμόζεται σε εδάφη με περιεκτικότητα σε άργιλο μικρότερη από 30%.

11 Δηλώσεις προφύλαξης

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.
P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

«Φοράτε γάντια, μακρυμάνικο πουκάμισο και μακρύ παντελόνι κατά την ανάμιξη, φόρτωση και εφαρμογή του σκευάσματος».

Σε περίπτωση επανεισόδου μετά τον ψεκασμό στην καλλιέργεια του ρυζιού, φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας.

Sp1: Μη ρυπαίνεται τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.

SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια αφέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα για την καλλιέργεια του αμπελιού και μία φυτική ζώνη ανάσχεσης 10 μέτρων από την καλλιέργεια της τομάτας, σιταριού, βρώμης, σίκαλης και κριθαριού.

SPe3: Για να προστατέψετε τα υπόγεια ύδατα μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε εδάφη με ποσοστό άμμου πάνω από 80% καθώς και σε αλκαλικά εδάφη.

13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Αμπέλι (0151010, 0151020)	21
Τομάτα (0231010)	3
Ρύζι (0500060)	28

- II. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 6527/187194/24.10.2022 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Γεωργίας»
 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ